


農業資材審議会
種苗分科会資料

重要な形質の見直しについて

品種保護制度（種苗法）の概要


新品種の育成者への権利付与を通じて新品種の育成を振興し、農林水産業の発展に寄与



(独)種苗管理センターの農場等の配置状況

(平成21年4月1日現在 役職員数:306名)

※再雇用職員は0.5人としてカウント



保護対象植物

〔種苗法第2条第1項
種苗法施行令第1条〕

農林水産物の生産のために栽培される**全植物**

- ・種子植物
 - ・しだ類
 - ・せんたい類
 - ・多細胞の藻類
 - ・政令で指定された植物(きのこ32種)
- ・UPOV91年条約では、締約国はすべての植物を保護対象とすることが義務付けられている(78年条約では24種類以上)。

品種登録の要件

(種苗法第3条、第4条)

①区別性(Distinctness)

- 国内外の公然知られた他の品種と重要な形質(形状、色、耐病性等)に係る特性(丸い、赤い、強い等)の全部又は一部によって明確に区別できること

②均一性(Uniformity)

- 同一世代でその重要な形質に係る特性の全部が十分類似していること(播いた種子から同じものができる)

③安定性(Stability)

- 増殖後も重要な形質に係る特性の全部が安定していること(何世代増殖を繰り返しても同じものができる)

④未譲渡性(Novelty)

- 日本国内において出願日から1年遡った日(外国においては、日本での出願日から4年(果樹等の永年性植物は6年)遡った日)より前に出願品種の種苗や収穫物を業として譲渡していないこと

⑤名称の適切性(Suitability of denomination)

- 品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等。

重要な形質とは

(法第2条第2項、第7項)


1. 重要な形質は、**品種登録の要件である区別性、均一性、安定性の審査に用いられ**、品種登録の適否を判定するための重要な要素。
2. 重要な形質以外の形質で差異があっても区別性は認められない。
3. 我が国では、UPOVの指針に基づき、「重要な形質」を具体化したものを「審査基準」として使用。

○UPOVの特性審査(区別性、均一性、安定性)のための一般指針 ＜特性審査に用いる形質の要件＞


- ①一定の遺伝子型又はその組合せの結果発現するもの
- ②ある環境条件の下で、十分な一貫性と再現性があるもの
- ③品種間で区別性を確定できる十分な違いがあるもの
- ④詳細な定義及び認識が可能なもの
- ⑤均一性の要件を満たすもの
- ⑥安定性の要件を満たすもの

新品種の出願・登録の状況


【年間品種登録出願件数の推移】



【年間品種登録件数の推移】




作物分野別の登録割合



出願者の業種別登録状況

(S53～H20年度)

累計: 18,154



注:①登録件数については、登録時点の区分であり、登録後の業種間の権利移転は反映していない。

②食品会社等には、その他業種を含む。

③都道府県等には、市町村、公立学校を含む。


④国等には、国立学校法人、独立行政法人を含む。

作物分野別・業種別の登録状況

(S53～H20年度)

	個人	種苗会社	都道府県 等	国等	食品会社 等	農協等	合 計
花き・鑑賞樹	3,988	8,679	551	79	574	140	14,011(77%)
食用作物	74	32	527	245	82	17	977(5%)
野菜	194	419	327	89	188	36	1,253(7%)
果樹	467	143	237	128	31	48	1,054(6%)
その他	49	244	187	186	181	12	859(5%)
合 計	4,772 (26%)	9,517 (52%)	1,829 (10%)	727 (4%)	1,056 (6%)	253 (1%)	18,154(100%)

平均審査期間の推移



政策目標：26年度に平均2.3年に短縮

UPOV(ユポフ)条約について

正式名称: 植物の新品種の保護に関する国際条約(1968年発効)

内

容: 植物の新品種の保護に関する国際的枠組を規定

- ・締約国は、条約の枠組みに沿って国内制度を整備
- ・91年条約の締約国は、10年以内に全植物を保護対象とする義務

締

約 国: 現在68カ国(EUを含む)
(WTO加盟国は153カ国)

組織体制:

理事会(C) 評議会(CC)

管理法律委員会(CAJ)

技術委員会(TC)


技術作業部会

- ・農作物(TWA)
- ・果樹(TWF)
- ・観賞植物及び林木(TWO)
- ・野菜(TWV)
- ・コンピュータ及び自動化(TWC)
- ・生化学及び分子技術(BMT)

各国の審査官等によりテスト
ガイドラインを検討



UPOV同盟国における出願・登録の状況



■ 出願数 ■ 登録数 ■ 存続中の権利数


出願数上位国（2008年）

① EU	3,014
② 米国	1,634
③ 日本	1,384
④ 中国	945
⑤ オランダ	751
⑥ ロシア	718
⑦ 韓国	490
⑧ オーストラリア	374
⑨ カナダ	348
⑩ アルゼンチン	342

：
UPOV合計 12,632

注：EU(27カ国)は域内共通の品種保護制度を有する。

海外からの出願状況(育成地別)



■ 合計 ■ うち外国育成

(20年度)


出願合計: 1,246(100%)

うち外国育成: 463(37%)

外国育成品種の登録状況

S53～H20年度

累計: 5,232



17年度上位国		18年度上位国		19年度上位国		20年度上位国	
①オランダ	119	①オランダ	142	①オランダ	165	①オランダ	130
②ドイツ	82	②ドイツ	75	②アメリカ	85	②ドイツ	63
③デンマーク	66	③イスラエル	46	③ドイツ	71	③イスラエル	51
④アメリカ	55	④アメリカ	30	④デンマーク	39	④アメリカ	45
⑤イスラエル	41	⑤デンマーク	23	⑤イギリス	31	⑤デンマーク	22
総数	463	総数	474	総数	476	総数	365

国際的な審査協力の推進

1. 目的

審査・登録事務の合理化、審査期間の短縮等のため、先願国の栽培試験結果を後願国が利用できるよう、審査基準、栽培試験方法等の調和を図る。

2. 審査協力の実施状況

(1) EU(18年11月に合意)

対象植物: バラ(切り花)、ペチュニア、カリブラコア、キク(スプレータイプ)、バーベナ

今後、カーネーション、カランコエ等順次拡大を検討

(2) ベトナム(19年10月に合意)

対象植物: キク、バラ、(当面は、審査体制の整備、人材育成等に協力)

(3) 韓国、中国、オーストラリアとは、審査協力の可能性について、協議、検討中。

3. 東アジア品種保護フォーラムの設置(20年7月)

アジア地域における品種保護システムの共通基盤の構築を目指し、多様な協力活動を展開

東アジアにおける植物新品種保護制度

	制度の状況(UPOV加盟時期)	保護対象植物
日本	91年条約締結(1982年)	全植物
中国	78年条約締結(1999年)	稲、りんご、かんきつ、菊等157属種
韓国	91年条約締結(2002年)	いちご、きいちご、温州みかん、ブルーベリー、おうとう、海草を除く全植物(2009.5～)
シンガポール	91年条約締結(2004年)	らん類、水生植物、タイサイ等15属種
ベトナム	91年条約締結(2006年)	稲、トウモロコシ、菊等63属種
フィリピン	UPOVと協議中	全植物(実質17属種)
マレーシア	UPOVと協議中	全植物(実質7属種)
タイ	制度あり	48属種
インドネシア	制度あり	全植物(実質?)
ミャンマー	制度検討中	
カンボジア	法令はあるが制度運営なし	
ラオス	法令はあるが制度運営なし	
ブルネイ	制度なし	

注1: 91年条約締約国は、加盟後10年以内に全植物を保護対象とする義務があり、韓国等は対象植物を拡大中。

注2: 台湾においても品種保護制度があり、124種類の植物を保護(2010年2月現在)。

諮問についての説明

重要な形質とは

(法第2条第2項、第7項)


1. 重要な形質は、**品種登録の要件である区別性、均一性、安定性の審査に用いられ、品種登録の適否を判定するための重要な要素。**
2. 重要な形質以外の形質で差異があっても区別性は認められない。
3. 我が国では、UPOVの指針に基づき、「重要な形質」を具体化したものを「審査基準」として使用。

○UPOVの特性審査(区別性、均一性、安定性)のための一般指針 ＜特性審査に用いる形質の要件＞

- ①一定の遺伝子型又はその組合せの結果発現するもの
- ②ある環境条件の下で、十分な一貫性と再現性があるもの
- ③品種間で区別性を確定できる十分な違いがあるもの
- ④詳細な定義及び認識が可能なもの
- ⑤均一性の要件を満たすもの
- ⑥安定性の要件を満たすもの

重要な形質の見直しの考え方

1. 審査基準の国際調和を進めるため、原則として、**UPOVテストガイドラインに準拠**して順次見直す。(20年4月61種類、21年4月18種類、**今回17種類**)
 - ① EU等との審査協力に当たって、UPOVテストガイドラインにない形質の追加を調整する。
 - ② 病虫害抵抗性等、国によって必要性の異なる形質等については、実態に即して追加する。
2. UPOVテストガイドラインが未だ作成されていない植物(417種類)については、**UPOVの「特性審査のための一般指針」に沿って見直し、UPOV技術作業部会に審査基準を提案**していく。



(H22年2月末現在)

バーベナの新たな審査基準(一部抜粋)

VII. 特性表(Table of characteristics)

形質番号	UP OV 形質	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1	1 (*)	PQ G	草姿	Plant : growth habit	茎の伸び方と株全体の草型	観察	1 2 3	直立 斜上 匍匐	upright semi-upright creeping	Survivapa Sunmariba Sunmarinho Sunvop	
2	2 (*)	QN	株の幅	Plant : width just after the start of flowering	開花始期の株の直径	測定 cm	3 5 7	小 中 大	small medium large	Kieversil Sunver Sunvop Wynena	
3	3 (*)	QL	茎のアントシアニンの着色の有無	Stem : anthocyanin coloration (on middle third of actively growing stem)	生育盛期の茎中間部 3 分の 1 のアントシアニンの着色の有無	観察	1 9	無 有	absent present	Sunmarinho Wynena	
4	4 (*)	QN	葉身の長さ	Leaf blade : length	葉身の長さ (主な 1 次分枝の最大葉、以下同様)	測定 cm	3 5 7	短 中 長	short medium long	Sunvop Sunmaribisu Scarlana	
5	5 (*)	QN	葉身の幅	Leaf blade: width	葉身の幅	測定 cm	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	Sunmaribisu Wynena	
6	6 (*)	PQ	葉身の形	Leaf blade : shape	葉身の形	観察	1 2 3 4 5	披針形 狭楕円形 楕円形 卵形 広卵形	lanceolate narrow elliptic elliptic ovate broad ovate	Wesverdank Kieversil Lan Pureye	

G : グループ分けに使用する形質、* : 必須形質、QL : 質的形質、QN : 量的形質、PQ : 疑似の質的形質、+ : 説明図あり

形質番号	UPOV形質	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
14	14 (*)	QN	花序の直径	Inflorescence : diameter	開花盛期の花序の直径	測定 cm	3 5 7	小 中 大	small medium large	Blancena Scarlena	
15	15 (*)	PQ (+)	花序の形	Inflorescence : shape in profile	側面から見た開花中の花で形成されている花序の形	観察	1 2 3 4	広卵形 倒広卵形 広円筒形 狭円筒形	broad ovate broad obovate broad cylindrical narrow cylindrical	Wynena Sunmarisu Verbena hastata	
16			花らしいの色	Flower bud colour (just before opening)	開花直前の花らしいの色	測定		RHSカラーチャートによる	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
17		G	花型	Flower type	一重八重の別	観察	1 2	一重 八重	single double		
18	16 (*)	QN (+)	花冠裂片の重なり	Flower : arrangement of corolla lobes	花冠裂片の重なり	観察	1 2 3	離れる 接する 重なる	free touching overlapping	Scarlena Sunmarisu Blancena	
19	17 (*)	QN	花冠の直径	Flower : diameter of corolla	花冠の直径	測定 mm	3 5 7	小 中 大	small medium large	Sunvop Blancena Sunmarisu Scarlena	
20	18 (*)	QL	がくのアントシアニン着色の有無	Calyx : anthocyanin coloration	がくのアントシアニン着色の有無	観察	1 9	無 有	absent present	Kieversil Lobena Scarlena	

赤枠部分の形質は、UPOV・TGには無いがEUとの調整の上、加えたもの。

形質 番号	UPOV 形質	記号	形質 (Characteristics)		定義	調査 方法	階級	状態 (State)		標準品種 (Ex. Var)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
33	31 (*)	PQ	花冠の目の色	Corolla : colour of eye	花冠の目の色	観察	1 2 3 4 5	緑白 黄緑 ピンク 赤 紫	whitish green green yellow pink red purple	Survivaripi Balazlavi Vertis Balazpima QuiHa237V Balazdapi	
34	32	QN	花冠の色の变化	Corolla : change of colour with age	花冠展開後の花色の時間経過による変化	観察	1 2 3 4 5	かなり薄くなる やや薄くなる 無変化 やや濃くなる かなり濃くなる る	strongly fading weakly fading no change weakly intensifying strongly intensifying	Blancena Lobena	

形質数は、現行の53を34(UPOV形質32+EUとの調整2)に整理

1. これまでに出願のなかった植物種類について、審査の必要上から審査基準を作成するため、新たに重要な形質を定めるもの

- ① グレコマ ヘデラケア
- ② ザミオクルカス ザミーフォリア
- ③ じゃのひげ
- ④ デロスペルマ

	改 正 案	現 行
グレコマ ヘ デラケア	株の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、花の長さ、花の幅、花の色、花冠における着色部の色、下唇における斑紋の有無、下唇における斑紋の色	なし 
ザミオкул カス ザミー フォリア	葉の長さ、葉の幅、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄又は葉軸の斑紋の有無、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の数、葉の色、葉の斑の有無、葉の斑の種類、葉の斑の色	なし 
じゃのひげ	草型、草丈、株の幅、葉序、葉の形、葉の先端の形、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉の表面の光沢の有無、葉の湾曲の程度、葉の周縁部の鋸歯の有無、葉の裏面のすじの有無、葉の斑の有無、葉の斑の型、葉の斑の色	なし 
デロスperl マ	樹型、樹高、株の幅、枝の長さ、枝の太さ、節間長、葉の形、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の色、葉の表面の突起の有無、葉の表面の突起の形、花の形、花の大きさ、花柄の長さ、花の中心部の色、花弁の幅、花弁の表面の主な色、花弁の表面の複色の有無、花弁の表面の二次色、花弁の数、花の香りの有無、開花習性	なし 

2. UPOVテストガイドラインに準拠し全面的に見直すもの

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ① いちご | ⑩ ネメシア |
| ② グズマニア | ⑪ ぶどう |
| ③ けいとう | ⑫ ペラルゴニウム グランディフロラム |
| ④ さとうきび | ⑬ ペンタス |
| ⑤ シュルンベルゲラ
(旧ジゴカクタス) | ⑭ ポインセチア |
| ⑥ ゼラニウム | ⑮ マーガレット |
| ⑦ ダリア | ⑯ りんご |
| ⑧ とうもろこし | ⑰ ロードデンドロン |
| ⑨ トルコギキョウ | |

	改 正 案	現 行
いちご	草姿、葉の粗密、草勢、分けつの多少、開花位置、ランナーの数、ランナーのアントシアニン着色の強弱、ランナーの毛の粗密、葉の大きさ、葉の表面の色、葉の表面の凹凸の強弱、葉の表面の光沢の強弱、葉の表面の斑の有無、頂小葉の大きさ、頂小葉の縦横比、頂小葉の基部の形、頂小葉の鋸歯の形、頂小葉の横断面の形、葉柄の長さ、葉柄の毛じの向き、たく葉のアントシアニン着色の強弱、花の数、果柄の長さ、小果柄の毛じの向き、花の直径、花弁の重なり、花冠に対するがく片の大きさ、雄しべの有無、花弁の縦横比、花弁の表面の色、花弁の表面の主な色(観賞用品種に限る。)、花弁の表面基部の色の濃淡(観賞用品種に限る。)、花糸のアントシアニン着色の強弱(観賞用品種に限る。)、花柱のアントシアニン着色の強弱(観賞用品種に限る。)、果実の大きさ、果実の縦横比、果実の形、第一番果と第二番果の果形の差、果皮の色、果皮の着色のむらの強弱、果実の光沢の強弱、果実の表面の凹凸の強弱、果実の無種子帯、果実のネックの有無、そう果の落ち込み、そう果の密度、そう果のアントシアニン着色の強弱、果実のがくの着生位置、果実のがく片の付き方、果径に対するがく片の大きさ、果実からのへた離れの難易、果実の硬さ、果肉の色、果心の色、果実の空洞、開花始期、果実の成熟期、季性、可溶性固形物含量、酸度、果実の香りの強弱、休眠性、炭そ病抵抗性、萎黄病抵抗性	一 草姿、草勢、草丈、分けつ性、ランナーの形状、葉色その他葉の形状、葉数、葉柄の形状、果皮の色、果実の断面の形状その他果実の形状、花の形状、花柄の形状、果実の硬さ、無種子帯、そう果の落ち込み、そう果数、へた離れ性、がくの形状及び果房当たり果数 二 季性、早晩性、開花位置、耐高低温性、耐干性、休眠性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 三 品質、成分、日持ち及び輸送性



	改 正 案	現 行
グズマニア	草丈、株の幅、葉の数、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の有無、葉身の表面の二次色の模様、葉身の表面の二次色の主な色、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無、葉身の裏面のアントシアニン着色の分布、花序の型、花序の位置、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の着花部の直径、花序のほうの数、花序の一ほう内の小花の数、花序の一ほう内の小花の数（一ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）、ほうの長さ、ほうの幅、ほうの先端の幅、ほうの先端の形、ほうの表面の色、ほうの裏面の色、前出葉の長さ、前出葉の幅、前出葉の色、がくの色、花冠の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色	一 草型及び草丈 二 葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉質、葉の硬さ、葉面の白粉の程度、葉縁のとげの形状及び吸枝の発生程度 三 花穂の形、花穂の大きさ、花穂の色、ほうの毛の多少、ほうのとげの有無、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の色、一花ほうの花数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色及び花柄の毛の多少 四 開花期、花柄の分岐性、耐寒性、繁殖性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
けいとう	草丈、茎の太さ、茎の基部のアントシアニン着色の有無、茎の基部のアントシアニン着色の強弱、茎の基部の色、茎の上部の色、茎の横断面の形、茎の稜の有無、開花側枝の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の色、葉脈のアントシアニン着色の有無、葉身の表面の凹凸の強弱、葉身の周縁の波打ちの有無、葉身の縦軸の曲がり、花序の形、主枝の花序の長さ、主枝の花序の幅、花序の色(とさか状品種を除く。)、とさか頂部の縁の色(とさか状品種に限る。)、とさか先端部の色(とさか状品種に限る。)、花序のうねりの強弱(とさか状品種に限る。)、花被片の形、花被片の中央部の色、花糸の色、花柱の色、柱頭の色、開花の早晩性	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の横断面の形、茎の色、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉脈の色及び葉の着生角度 三 花穂の形、花穂の大きさ、花穂の色、花首の長さ、花首の太さ及び花首の色 四 開花期、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
さとうきび	草型、葉しょうの包合度、発芽性、ほう芽性、初期伸長性、分けつ性、遅発莖数、葉群の疎密、葉群の緑色の濃淡、仮茎長、節間長、節間部の長径、節間部の形、節間部の横断面の形、節間部のずい孔率、節間部の複合色、節間部の基本色、節間部の生長亀裂の深さ、節間部の稲妻屈曲の強弱、節間部の茎皮硬度、節間部の茎皮表面の粗滑、節間部のろう質物の多少、根帯の幅、根帯の色、ろう帯の幅、芽子の形 (芽翼を除く。)、芽子の大きさ (芽翼を除く。)、芽子の突出度 (第二老化葉着生節)、芽溝の深さ、芽溝の長さ、芽子先端部の生長帯に対する位置、芽子の毛の有無、芽子の毛の位置、芽子基部と葉しょう痕の間の広さ、芽翼の幅、葉しょうの長さ、葉しょうの毛群の多少、葉しょうの毛群の長さ、葉しょうの毛群の分布、葉舌の形、葉舌の幅、葉舌の毛群の長さ、葉舌の毛群の粗密、葉しょうの包合部下面の葉耳の形、葉しょうの包合部下面の葉耳の大きさ、葉しょうの包合部上面の葉耳の形、葉しょうの包合部上面の葉耳の大きさ、肥厚帯の色、葉身の反り、葉身の幅、中肋の幅、葉身の幅に対する中肋の幅の比、葉身の長さ、葉身の周縁の毛の疎密、葉身の周縁の鋸歯の有無、しょう頭部の長さ、しょう頭部の横断面の形、しょう頭部の色、しょう頭部のろう質物の多少、原料茎の長さ、茎径、一茎重、原料茎の多少、脱葉性、出穂性、登熟の早晩性、糖分含量、耐干性、黒穂病抵抗性	一 草型 二 葉の形状、しょ茎の形状及び原料茎の形状 三 発芽性、分けつ性、地域適応性、出穂性、登熟性、環境耐性、耐倒伏性、脱葉性、収量性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
シュルン ベルゲラ (旧ジゴカ クタス)	草姿、三次葉状茎の数、葉状茎の長さ、葉状茎の最大幅、葉状茎の色、葉状茎の周縁部の鋸歯の形、葉状茎の鋸歯の深さ、葉状茎の横断面の湾曲の強弱、葉状茎の周縁部の波打ちの強弱、1cm長のつぼみの先端の色、1cm長のつぼみの色の濃淡、1.5cm長のつぼみの先端の形、花の形、花の直径、花の長さ、花被片の花筒開口部に対する姿勢、花被片の幅、花被片の基部の淡色部の大きさ、花被片の基部の淡色部の色(花被片の基部に淡色部がある品種に限る。)、花被片の中間部の色の違いの有無、花被片の中間部の色、花被片の色の境界の明瞭度(花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。)、花被片の周縁部の色が占める割合(花被片の中間部に色の違いのある品種に限る。)、花被片の周縁部の色、花筒の開口部の形、花筒の開口部の輪状着色の有無、花筒の開口部の輪状着色部の幅、花筒の外面の色、雄ずいの長さ、花糸の色、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、子房の色、開花始期、開花期間	一 草型 二 葉状茎の形、葉状茎の大きさ、葉状茎の色、葉状茎数、葉状茎の毛の多少及び分枝性 三 花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉の大きさ、雌雄ずいの形、雌雄ずいの大きさ、雌雄ずいの色、一葉状茎当たりの着花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、日長感応性、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
ゼ ラ ニ ウ ム	草姿、茎葉部の高さ(草姿が直立又は斜上の品種に限る。)、茎の長さ(草姿がほふくの品種に限る。)、株の幅(草姿が直立又は斜上の品種に限る。)、茎の色(アントシアニンを除く。)、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の切れ込みの深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の基部の重なり、葉身の斑の有無、葉身の主な色(環状紋を除く。)、葉身の二次色(環状紋を除く。)、葉身の光沢の強弱(草姿がほふくの品種に限る。)、葉身の表面の環状紋の明瞭度、葉身の環状紋の位置、葉身の環状紋の相対的な大きさ、花柄の長さ、花柄の中央部のアントシアニン着色の強弱、花序の長さ、花序の幅、一花序の開花数、最大花の長さ、最大花の幅、小花柄の長さ、小花柄上部のアントシアニン着色の強弱、小花柄の突起の有無、花型、下部花弁の上部花弁に対する配置(一重品種に限る。)、花弁の数(八重品種に限る。)、横から見た花の断面の形、花弁の不規則な条や斑点の有無、花の主な色(不規則な条や斑点のある品種に限る。)、花弁の条や斑点の色(不規則な条や斑点のある品種に限る。)、がくの反転の強弱、最も幅広のがくの中央部のアントシアニン着色の強弱、上部花弁の幅、上部花弁の形、上部花弁の先端の形、上部花弁の表面の周縁部の色、上部花弁の表面の中央部の色、上部花弁の裏面の色、上部花弁の模様の明瞭度、上部花弁の模様の形、上部花弁の最大の斑点の大きさ、上部花弁の斑点の色、上部花弁の基部の複色部の有無、上部花弁の基部の複色部の大きさ、上部花弁の基部の複色部の色、下部花弁の表面の周縁部の色、下部花弁の表面の中央部の色、下部花弁の裏面の色、下部花弁の模様の明瞭度、下部花弁の模様の形、下部花弁の最大の斑点の大きさ、下部花弁の基部の複色部の有無、下部花弁の基部の複色部の大きさ、下部花弁の基部の複色部の色、内部花弁の表面の中央部の色(八重品種に限る。)、開花始期	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、茎の白粉の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、たく葉の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の毛の多少及び葉の香り 三 花房の形、花の向き、花形、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の厚さ、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がく片の距の大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花房の花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
ダリア	草姿、草丈、茎の色、葉の型、葉軸の翼の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の色、葉の光沢の強弱、葉の表面のしわの強弱、葉脈の隆起の高低、小葉の形、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の基部の形、小葉の周縁の鋸歯の数(裂片を除く。)、小葉の周縁の鋸歯の深さ(裂片を除く。)、花柄の長さ、花柄の色、葉群に対する頭花の位置、頭花の向き、頭花の型、頭花の花盤の型(一重品種及び半八重品種に限る。)、頭花の副弁の有無、副弁の頭花に対する長さ、頭花の直径、頭花の高さ(八重品種及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花の数(一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。)、頭花の舌状花の粗密(八重品種に限る。)、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の形状、舌状花のキールの数(キール状品種に限る。)、舌状花の中間部の横断面の形、舌状花の基部から四分の三地点の横断面の形(中間部の横断面の形と異なる場合に限る。)、舌状花の周縁部の巻き方、舌状花の周縁が巻く部分の位置、舌状花の縦断面の形、舌状花の縦方向の湾曲する位置、舌状花の湾曲の強弱、舌状花のねじれの強弱、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色数、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の分布位置、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布位置、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色、舌状花の裏面の色(舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。)、頭花の直径に対する花盤の大きさ(一重品種及び半八重品種に限る。)、花盤の開やく前の色(デージー型の一重品種及び半八重品種に限る。)、花盤の開やく時の色(デージー型の一重品種及び半八重品種に限る。)、管状花の色(アネモネ型品種に限る。)、副弁の色(コラレット型品種に限る。)、頭花の花色の变化	一 草型及び草丈 二 塊根の形、塊根の大きさ、塊根の色、茎の太さ、茎の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少及び葉の着生角度 三 花の向き、花形、花の大きさ、舌状花の重ねの程度、舌状花数、管状花部の大きさ、管状花の分布、管状花の形、管状花数、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花の中心部の色、花盤の色、花たくの形、花たくの大きさ、総ほうの大きさ、花首の長さ及び花首の太さ 四 発芽期、開花期、耐暑性、繁殖性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

	改 正 案	現 行
とうもろこし	第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱、第一葉の先端の形、葉の数、葉の緑色の濃淡、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉の着生角度、葉身の反り、茎の屈曲の強弱、雄穂の開花時期、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱、雄穂のアントシアニン着色の強弱（穎苞基部を除く。）、やくのアントシアニン着色の強弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度、雄穂の一次枝梗の反り、雄穂の一次枝梗の数、絹糸の抽出期、絹糸のアントシアニン着色の強弱、絹糸の色、仮根のアントシアニン着色の強弱、雄穂の小穂の粗密、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、節間のアントシアニン着色の強弱、雄穂の最下枝梗着生部からの主軸の長さ、雄穂の最上枝梗着生部からの主軸の長さ、雄穂の一次枝梗の長さ、草丈、草丈と雌穂着生位置の比、葉身の幅、穂柄の長さ、雌穂の長さ、雌穂の直径、雌穂の芯の直径、雌穂の数、雌穂の重さ、雌穂の形、雌穂の粒列数、雌穂の粒の色数（スイートコーン及びワキシコーン品種に限る。）、粒の黄色の濃淡（スイートコーン品種に限る。）、粒の長さ（スイートコーン品種に限る。）、粒の幅（スイートコーン品種に限る。）、雌穂の粒の型、雌穂の粒の縮みの強弱、雌穂の粒の先端部の主な色、雌穂の粒の側面の色（スイートコーン品種を除く。）、ポップコーンの形（ポップコーン品種に限る。）、雌穂のほう葉のアントシアニン着色の強弱、粒の甘味、倒伏抵抗性	一 かの形状、葉の形状、仮根発生の程度、雌穂の形状、雄穂の形状、穀粒の形状、穀粒の粒重及び穀粒の品質 二 初期の生育性、分けつ性、熟性、ねん性、密植条件下での不ねん個体発生程度、耐倒伏性、耐折損性、収量性、乾物率、養分割合、食味、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
トルコギキョウ	草丈、茎の節数、分枝の位置、葉の着き方、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉のろう粉の多少、葉の表面の緑色の濃淡、花らいの数、花型、花弁の数(八重品種に限る。)、花の直径、花の形、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の先端の形、花弁の周縁の波打ちの強弱、花弁の周縁のフリンジ、花弁の色数、花弁の表面の色(単色品種に限る。)、花弁の表面の色(複色品種に限る。)、花弁の表面の二次色(複色品種に限る。)、花弁の二次色の面積の大きさ(複色品種に限る。)、花弁の模様(複色品種に限る。)、花弁の裏面の色、花弁の表面の基部の色、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柄の長さ、雌ずいの形、開花始期	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の長さ、茎の色、茎の強さ、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉のろう質の程度及び葉の着生角度 三 花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、花柄の太さ、花柄の長さ、花柄の折れの難易、一花茎の花数及び花の香り 四 開花の間隔、開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

	改 正 案	現 行
ネメシア	草姿、草丈、株の幅、分枝の粗密、茎の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の欠刻の数、葉身の周縁の欠刻の深さ、葉身の斑の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、花序の花の着生の粗密、花の香りの強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の長さ／幅、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さ、上唇弁の中央裂片の重なり、上唇弁の側裂片の向き、上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置、上唇弁の側裂片の先端の形、上唇弁の主な色、上唇弁の条の長さ、上唇弁の脈の明瞭度、上唇弁の脈の色、上唇弁の基部のブロッチの大きさ、上唇弁の基部のブロッチの明瞭度、上唇弁の基部のブロッチの色、上唇弁の裏面の色、下唇弁の反りの強弱、下唇弁の横断面の湾曲の強弱、下唇弁の波打ちの強弱、下唇弁の切れ込みの強弱、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色、下唇弁の二次色の分布、下唇弁の裏面の色、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさ、下唇弁の基部の突起の色、下唇弁の基部の突起の毛の有無、下唇弁の基部の突起の毛の粗密、距の下唇弁に対する相対的な長さ、花色の変化、花序のさく果の結実の粗密	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性



ぶどう

ほう芽期、幼しょうの先端の葉の開度、幼しょうの先端の綿毛の密度、幼しょう先端の綿毛のアントシアニン着色の強弱、幼しょう先端の絨毛の密度、若葉の表面の色、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度、若葉裏面の主脈上の絨毛の密度、新しょうの向き、新しょうの節間の上面の色、新しょうの節間の下面の色、新しょうの節の上面の色、新しょうの節の下面の色、新しょうの節間の絨毛の密度、新しょうの巻きひげの長さ、花穂の長さ、花性、成葉の大きさ、成葉の形、成葉の表面の凹凸の強弱、成葉の裂片数、成葉の上裂刻の深さ、成葉の上裂片の重なり(裂刻のある品種に限る。)、成葉の葉柄側裂刻の重なり、成葉の鋸歯の長さ、成葉の鋸歯の長さ／基部幅、成葉の鋸歯の形、成葉表面の主脈のアントシアニン着色の強弱、成葉裏面の主脈間の綿毛の密度、成葉裏面の主脈上の絨毛の密度、成葉の主脈に対する葉柄の長さ、成熟始期、果房の大きさ、果房の着粒密度、穂梗の長さ、穂梗の色、果粒の大きさ、果粒の形、果皮の色、果粉の多少、脱粒の難易、果皮の厚さ、果皮と果肉の分離性、果肉のアントシアニン着色の強弱、果肉の硬さ、肉質、果汁の甘味、果汁の多少、果実の香り、種子の有無、熟しょうの色、花振るいの多少



- 一 樹の大きさ及び樹勢
- 二 枝しょうの太さ、枝しょうの色、枝しょうの毛じの多少、節間断面の形、着房数、巻きひげの着生、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛じの多少、葉柄の長さ及び葉柄の太さ
- 三 花房の形、花房の大きさ、穂こうの長さ、穂こうの色、つぼみの大きさ、子房の形、雄ずいの形及び花粉の多少
- 四 果房の形、果房の大きさ、粒着の粗密、果こうの色、小果こうの太さ、果粒の形、果粒の大きさ、果皮の色、果粉の多少、果皮の厚さ、果肉分離の難易、果肉の色、肉質、甘味、酸味、渋味、香氣、果汁の多少、種子の形、種子の大きさ及び種子数
- 五 発芽期、展葉期、開花期、落葉期、成熟期、結果性、果実の着色の難易、裂果性、脱粒性、日持ち、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
- 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木の難易、栄養繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の発育、耐干性及び耐湿性

	改 正 案	現 行
ペラルゴニウム グランディフロラム	植物体の高さ、植物体の幅、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の基部の重なり、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの長さ、葉の周縁の欠刻の深さ、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、小花柄の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片外側のアントシアニン着色の有無、花の直径、花卉の波打ちの有無、花卉の波打ちの強弱、上部花卉の幅、上部花卉の模様の有無、上部花卉の模様の形、上部花卉の模様の大きさ、上部花卉の表面の周縁部の色、上部花卉の表面の周縁部と模様の間の色、上部花卉の表面の中間部の色(模様のない品種に限る。)、上部花卉の模様の色、上部花卉の裏面の色、下部花卉の模様の有無、下部花卉の模様の形、下部花卉の模様の大きさ、下部花卉の表面の周縁部の色、下部花卉の表面の周縁部と模様の間の色、下部花卉の表面の中間部の色、下部花卉の模様の色、下部花卉の裏面の色、開花始期	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、茎の白粉の多少、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、たく葉の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色、葉柄の毛の多少及び葉の香り 三 花房の形、花の向き、花形、花色、花卉の形、花卉の大きさ、花卉の厚さ、花卉数、がくの形、がくの大きさ、がく片の距の大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花房の花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
ペンタス (区分名を「くささんだんか」から変更)	草姿、草丈、茎の節間長、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の毛の粗密、葉身の波打ちの強弱、花序の花の数、花序の長径、花序の短径、花序の高さ、花序の上部の形、花型、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の色、花喉部の内面の毛の色、花冠裂片の向き、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色(単色品種を除く。)、花冠裂片の表面の二次色の分布(単色品種を除く。)、やくの花喉部上部に対する位置、花粉の色、花柱の長さ、柱頭の大きさ、柱頭の色	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、とげの有無、分枝性 、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、 葉柄の太さ及び葉柄の長さ 三 花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
ポインセチア	分枝の有無、分枝の数、樹高、樹の幅、茎の中間部の緑色の濃淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱、茎の上部のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色数、葉身の緑色の濃淡(単色葉品種に限る。)、葉身の主な色(複色葉品種に限る。)、葉身の二次色(複色葉品種に限る。)、葉身の三次色(複色葉品種に限る。)、葉身の表面の主脈の色、葉身の切れ込みの数、葉身の切れ込みの深さ、葉身の主脈の曲がりの強弱、葉柄の長さ、葉柄の表面の緑色の濃淡、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱、部分着色葉の数、完全着色葉の数、着色葉の切れ込みの強弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱、ほうの数、最大ほうの長さ(葉柄を含む。)、最大ほうの幅、最大ほうの形、ほうの表面の色数、ほうの表面の色(単色品種に限る。)、ほうの表面の大理石模様の有無(複色品種に限る。)、ほうの表面の主な色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの表面の二次色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの表面の三次色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの表面の斑点の強弱、ほうの表面の斑点の色、ほうの裏面の色(単色品種に限る。)、ほうの裏面の主な色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの裏面の二次色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの裏面の三次色(大理石模様のある品種に限る。)、ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)、ほうの主脈の巻き込みの有無、ほうのねじれの有無、ほうの葉脈間の縮れの強弱、集散花序の幅、蜜腺の大きさ、蜜腺の色、蜜線の変形の有無、開花の早晩	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ、葉柄の長さ及び葉柄の色 三 花房の大きさ、花形、ほうの形、ほうの大きさ、ほうの色、ほうの数、花の大きさ、雌雄ずいの色、花柄の長さ、花柄の色、一花房当たりの花数及び花の香り 四 開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
マーガレット	草型、草丈、分枝の粗密、茎のアントシアニンの着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉柄の長さ、葉の周縁の鋸歯の形、葉の周縁の鋸歯の粗密、葉の表面の色、葉片の長さ、葉片の幅、葉片の欠刻の深さ、花柄の長さ、花型、頭花の直径、舌状花の数(一重品種を除く。)、舌状花の向き、舌状花の形、舌状花の反り、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の色数、舌状花の表面の色の分布状態、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の複色の色、舌状花の裏面の主な色、花盤の直径(一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。)、花盤の主な色(一重品種及び半八重品種に限る。)、丁字状花の色(丁字状品種に限る。)、花の中心部の色(八重品種及びポンポン咲品種に限る。)、花の芳香の有無、開花期(秋植)、開花期(夏植)	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花形、花の大きさ、舌状花数、管状花部の大きさ、管状花数、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花の中心部の色、総ほうの大きさ、一花茎の花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

	改 正 案	現 行
りんご	樹勢、樹の型(生食用品種に限る。)、枝の数(台木用品種に限る。)、樹姿(生食用の分枝型品種に限る。)、結実の型(生食用品種に限る。)、新しょうの姿勢(台木用品種に限る。)、新しょうの伸長状態(台木用品種に限る。)、枝の毛じの多少(台木用品種に限る。)、枝の表面の光沢の強弱(台木用品種に限る。)、えき花芽の着生(台木用品種に限る。)、枝の太さ、節間長、枝の色(生食用品種に限る。)、枝の毛じの粗密、皮目の多少、皮目の大きさ(台木用品種に限る。)、皮目の形(台木用品種に限る。)、枝の陽光面の色(台木用品種に限る。)、芽の大きさ(台木用品種に限る。)、芽の先端の形(台木用品種に限る。)、芽の姿勢(台木用品種に限る。)、芽の支持部の大きさ(台木用品種に限る。)、枝の先端の色(台木用品種に限る。)、若葉のアントシアニン着色の有無(台木用品種に限る。)、若葉の着色の色相(台木用品種に限る。)、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の横断面の形(台木用品種に限る。)、葉身の先端突起の長さ(台木用品種に限る。)、葉身の緑色の濃淡(生食用品種に限る。)、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の裏面の毛じの粗密、葉脈のアントシアニン着色の程度(台木用品種に限る。)、葉柄の長さ、	一 樹姿、樹の大きさ及び樹勢 二 枝しょうの太さ、節間長、皮目の大きさ、皮目の多少、枝しょうの毛じの多少、短花枝の着生、えき花芽の着生、芽の形、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛じの多少、たく葉の形、たく葉の大きさ、葉柄の長さ及び葉柄の太さ 三 一花そうの花数、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉の色、花卉の数、雄ずいの数、やくの色及び花粉の多少 四 果形、果実の大きさ、果皮の色、果面毛じの多少、果点の形、果点の大きさ、果点の密度、果面の粗滑、果面のさびの発生、スカーフスキンの多少、果こうの長さ、果こうの太さ、肉こうの有無、果心の形、果心の大きさ、心室の数、果肉の色、肉質、甘味、酸味、渋味、香気、果汁の多少、種子の形、種子の大きさ及び種子数 五 発芽期、開花期、落葉期、収穫期、結果性、果実着色の難易、生理落果の多少、果実の生理障害の多少、果実の貯蔵性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては接ぎ木の難易、実生のそろい、栄養繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の発育、耐干性及び耐湿性

	改 正 案	現 行
りんご (続き)	葉柄のアントシアニン着色の広がり(生食用品種に限る。)、葉身の長さ／葉柄の長さ(台木用品種に限る。)、たく葉の大きさ(台木用品種に限る。)、つぼみの色(生食用品種に限る。)、花の大きさ(生食用品種に限る。)、花弁の重なり(生食用品種に限る。)、花柱の位置(生食用品種に限る。)、幼果のアントシアニン着色の広がり(生食用品種に限る。)、果実の大きさ(生食用品種に限る。)、果実の長さ(生食用品種に限る。)、果実の幅(生食用品種に限る。)、果実の長さ／幅(生食用品種に限る。)、果実の形(生食用品種に限る。)、果実の角張りの強弱(生食用品種に限る。)、果実の王冠の強弱(生食用品種に限る。)、果実のがくの開閉(生食用品種に限る。)、果実のがくの長さ(生食用品種に限る。)、果粉の多少(生食用品種に限る。)、果皮のろう質の多少(生食用品種に限る。)、果面の粗滑(生食用品種に限る。)、果皮の地色(生食用品種に限る。)、果皮を被う色の面積(生食用品種に限る。)、果皮を被う色(生食用品種に限る。)、果皮を被う色の濃淡(生食用品種に限る。)、果皮を被う色の型(生食用品種に限る。)、果皮のしまの幅(生食用品種に限る。)、果皮のしま模様の明瞭度(生食用品種に限る。)、梗あ周辺のさびの量(生食用品種に限る。)、果実側面のさびの量(生食用品種に限る。)、がくあ周辺のさびの量(生食用品種に限る。)、果点の数(生食用品種に限る。)、果点の大きさ(生食用品種に限る。)、スカーフスキンの多少(生食用品種に限る。)、果柄の長さ(生食用品種に限る。)、果柄の太さ(生食用品種に限る。)、梗あの深さ(生食用品種に限る。)、梗あの幅(生食用品種に限る。)、がくあの深さ(生食用品種に限る。)、がくあの幅(生食用品種に限る。)、果肉の硬さ(生食用品種に限る。)、果肉の色(生食用品種に限る。)、果実の甘味(生食用品種に限る。)、果実の酸味(生食用品種に限る。)、果実の蜜の多少(生食用品種に限る。)、果実の果心の形(生食用品種に限る。)、果実の子室の型(生食用品種に限る。)、ほう芽期(台木用品種に限る。)、開花始期(生食用品種に限る。)、収穫期(生食用品種に限る。)、普通貯蔵の貯蔵性(生食用品種に限る。)、冷蔵貯蔵の貯蔵性(生食用品種に限る。)、斑点落葉病抵抗性(生食用品種に限る。)	

	改 正 案	現 行
ロードデンドロン	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形(一花序当たりの着花数が六以上の品種に限る。)、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数(八重品種に限る。)、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉(秋葉)の表面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の裏面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の長さ(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の幅(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の形(常緑の品種に限る。)、成葉(秋葉)の表面の毛じの粗密(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の横断面の形(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の表面の光沢の強弱(常緑品種に限る。)	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉の毛の多少、葉の毛の色、葉質及び葉の着生角度 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花冠片数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの長さ、雌雄ずいの色、雄ずいの数、やくの色、がくの有無、がくの形、がくの色、がくの毛の多少、花柄の長さ、花柄の太さ、一花房の花数及び花の香り 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

3. 今般我が国審査基準を作成・改正したことに伴い、これまでの重要な形質を見直すもの

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ① あきにれ | ⑬ バジル |
| ② アルクトティス | ⑭ はすのはぎり |
| ③ アロエ ノビリス | ⑮ はなびらたけ |
| ④ イレシネ リンデニー | ⑯ パパイヤ |
| ⑤ エオニウム | ⑰ ヒロケレウス ウンダツス(ドラゴンフルーツ) |
| ⑥ グラプトペタルム | ⑱ フォルミウム |
| ⑦ クリサンセマム ムルチ
コーレ | ⑲ ほんしめじ |
| ⑧ グロキシニア シルバ
ティカ | ⑳ まいたけ |
| ⑨ しろクローバ | ㉑ まさき |
| ⑩ せいようわさび | ㉒ ユーホルビア ヒペリシフォリア(おとぎり
ばにしきそう) |
| ⑪ そよご | ㉓ ライティア アンチディセンテリ
カ |
| ⑫ ちぢみざさ | |

	改 正 案	現 行
あきにれ	樹形、樹冠の形、樹高、枝の翼の有無、分枝の粗密、葉の形、葉の先端の形、葉の基部の形、葉の鋸歯の形、葉身の長さ、葉身の幅、若葉の春季の色、成葉の夏季の色、成葉の秋季(紅葉)の色、成葉の斑の有無、成葉の斑の模様、斑のある葉の割合、成葉の斑の色 	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
アルクト ティス	草型、草丈、株の幅、葉の形、葉の周縁の鋸歯の深さ、葉の長さ、葉の幅、葉の表面の色、花弁の重なり、強弱、花弁の開度、頭花の最大径、舌状花の形、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の色、舌状花の表面の脈の色、舌状花の表裏の色の違いの有無、舌状花の裏面の色、舌状花の裏面の脈の色、舌状花の数、花芯部の大きさ、花芯部の色、柱頭の色、やくの色、花柄の長さ、花柄の太さ、花の香りの有無、ねん性の有無 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
アロエ ノ ビリス	草丈、株の幅、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、新葉の色、葉の色、葉の斑の有無、葉の斑の色 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
イレシネ リンデニー	草丈、茎の太さ、茎の色、茎の毛の有無、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の斑の位置、葉身の斑の色数、葉身の斑の主な色、葉身の光沢の強弱、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉柄の長さ、葉柄の色 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
エオニウム	草丈、ロゼットの径、ロゼットの葉の数、ロゼットの側面の形、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の先端の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の光沢の強弱、葉の表面の毛の有無、葉の周縁の毛の有無、葉の白粉の有無、葉の表面の主な色、葉の表面の覆輪の有無、葉の表面の条状の有無、葉の表面の先端爪の有無、葉の表面の中斑の有無、葉の表面の斑の色、花の色 	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
グラプトペ タルム	草型、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の縦断面の形、葉の横断面上面の形、葉の横断面下面の形、葉の先端の形、葉の緑色部の有無、葉の緑色部の色、葉の白粉の強弱、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色部位、葉のアントシアニン着色の強弱、葉の模様の有無、葉の先端の芒(剛毛)の有無、葉の先端の芒(剛毛)の色、花序の型、つぼみの形、がくの長さ、花の直径、花の形、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花の地色、花の模様の有無、花の模様、花の模様の色 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンブ源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
クリサンセ マム ムル チコーレ	草型、草丈、株の幅、茎の太さ、花茎の長さ、茎のアントシアニン着色の有無、葉の毛の有無、一次分枝の数、二次分枝の数、節間長、茎の節数、葉の形、葉の周縁部の欠刻の形、葉の長さ、葉の幅、葉の数、変形葉の数、葉序、着らいの形、着らいの数、花の形、花の直径、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の数、舌状花の全体の形、舌状花の先端の形、舌状花の表面の色、舌状花の裏面の色、管状花部の大きさ、管状花部の色、花柄の長さ、花柄の太さ、総ほうの大きさ、花柄のアントシアニン着色の有無、花の香りの有無、開花の早晩	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性



	改 正 案	現 行
グロキシニア シルバティカ	草丈、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の有無、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、一茎当たりの花の数、花柄の長さ、花冠の長さ、花冠筒の直径、花冠先端の直径、花冠裂片の色、花冠外面の色、花冠内面の色、花冠内面の模様（斑点）の明瞭度、開花始期 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四 品質特性 五 早晚性、ねん性（不ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
しろクローバ (区分名を「しろクローバー」から変更)	草高、株張り、草姿、節間長、茎の太さ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の大きさ、小葉の長さ／幅、小葉の形、小葉の先端の形、変葉の多少、平均小葉数、葉の密度、葉の緑色の濃淡、葉の主な色(複色品種に限る。)、葉の二次色(複色品種に限る。)、葉の三次色(複色品種に限る。)、葉の斑の型、葉の斑の鮮明度、花の色、花柄の長さ、花柄の太さ、頭花の数、頭花の直径、開花性、開花期、青酸配糖体含有個体割合(飼料用品種に限る。)	一 茎の形状、葉の形状、頭花数及び植物体の広がり 二 ほう芽性、開花期、越冬性、越夏性及び病害抵抗性 三 乾物率 

	改 正 案	現 行
せいようわさび	草丈、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の先端のよじれの強弱、葉身の白粉の多少、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の鋸歯の粗密、葉身の中ろくの色、中ろくの緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の幅、葉柄の基部のアントシアニン着色の有無、鋭裂葉の発生時期、鋭裂葉の周縁の切れ込みの強弱、根茎の縦断面の形、根茎の曲り、根茎の上部の太さ、根茎の下部の太さ、根茎の重さ、根茎の表面の粗滑、根茎の内部の色、根茎の肉色の褐変の強弱、根茎の上部における側根の発生密度、根茎の下部における根の発生密度、根茎のほう芽数	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状 

	改 正 案	現 行
そよご	樹姿、樹高、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の基部の形、当年葉の反りの強弱、前年葉の反りの強弱、当年葉の波打ちの強弱、前年葉の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、当年葉の表面の緑色の濃淡、前年葉の表面の緑色の濃淡、新葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、花の直径、花弁の形、花柄の長さ、房成りの有無、果実の形、果実の大きさ、果実の色 	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
ちぢみざさ	草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の色、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の表面のアントシアニン着色の有無、葉の表面のアントシアニン着色の強弱、葉の表面の斑の有無、新葉の表面の緑色の濃淡、成葉の表面の緑色の濃淡、新葉の表面の斑の色、成葉の表面の斑の色、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の毛の有無、葉しょうの長さ、葉しょうの毛の多少、花序の形 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
バジル	草姿、草丈、分枝性、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の有無、花茎の数、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面のアントシアニン着色の有無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン分布の程度、葉身の緑色の濃淡(アントシアニン着色のない品種に限る。)、葉身の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉身の横断面の形、葉身の周縁部の鋸歯の有無、葉身の周縁部の鋸歯の深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、花茎の平均節間長、花茎の長さ、ほう葉の毛の有無、花冠の色、花柱の色、開花期 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
はすのは ぎり	樹姿、樹高、枝の色、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色数、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の最も濃い色、葉身の斑の二番目に濃い色、葉身の斑の三番目に濃い色、葉身のアントシアニン着色の有無 	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
はなびらたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の裏面の着色の有無、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度(15℃/30日)、菌糸体の温度別生長速度(20℃/30日)、菌糸体の温度別生長速度(25℃/30日)、子実体の径、子実体の高さ、菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、子実体の枝の多少、子実体の花弁状片の形、子実体の枝の色、子実体の枝の厚さ、子実体の枝の肉質、子実体の発生型、原基形成発生最適温度、子実体の生育最適温度、発生最盛期までの期間(種菌接種から収穫適期までの期間)、発生操作から収穫期までの期間、収量、対峙培養(帯線形成)	一 菌糸の性状及び子実体の大きさ 二 菌柄の色、菌柄の厚さ、菌柄の肉質、菌柄の枝の多少、菌柄の枝の形、菌柄の枝の色、菌柄の枝の厚さ及び菌柄の枝の肉質 三 子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性 四 乾物率及び収量性 

	改 正 案	現 行
パパイヤ	幼木の幹の色、花序、一番果結実部位の高さ、分枝の有無、幹の直径、一番果までの幹の節数、幹の中央部の節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の三次裂片の有無、葉身のろう質の有無、葉身の裏面の毛じの有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉柄のアントシアニン着色の強弱、一花序当たりの花の数、花序の主軸の長さ、花序の主軸の色、両性花の花冠の長さ、両性花の花冠の色、花柄の長さ、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の形、果梗部の形、果頂部の形、果皮の色、果実の表面の粗滑、果実の稜線の有無、果実の稜線の強弱、果皮の厚さ、果肉の色、果実の硬さ、果実の甘味、果実の香りの強弱、果実の胎座組織の粗密、果実の空洞の最大径、果実の赤道面の空洞断面の形、種子の数、種子の色、種子の長さ、種子の幅、種子の長さ／幅、種子の形、種子の表面のゼラチン状物質の多少	一 樹姿、樹の大きさ及び樹勢 二 幹の太さ、幹の節間長、幹の色、葉形、葉の大きさ、葉色、着葉数、葉柄の長さ及び葉柄の太さ 三 花らいの大きさ、花形、花の大きさ、花色、花卉の数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雄ずいの数及び初着花位置 四 果形、果実の大きさ、果皮の色、果肉の厚さ、果肉の色、肉質、甘味、酸味、香気、種子の形、種子の色及び種子の多少 五 開花期、成熟期、着花習性、結果性、雌雄異株性、ねん性、貯蔵性、果実の生理障害の多少、耐寒性、耐風性、病害抵抗性及び虫害抵抗性



	改 正 案	現 行
ヒロケレウス ウンダツス(ドラゴンフルーツ)	葉状茎の長さ、葉状茎の幅、葉状茎の横断面の形、葉状茎の色、葉状茎の周縁の起伏、とげの長さ、とげの主な色、とげ座の間隔、とげの多少、つぼみのりん片先端の着色の有無、一葉状茎当たりの着花数、花の長径、花披の色、自家結実性、果実の重さ、果実の縦断面の形、果実のりん片の大きさ、果実のりん片の数、果実のりん片の先端の形、果実のりん片の先端の向き、果皮の厚さ、果実の表面の色の均一性、果実の表面の主な色、果実の表面のとげの有無、果肉の色の均一性、果肉の色、果実の糖度、成熟種子の数、種子の大きさ、開花始期、開花の回数、収穫始期	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンブ源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性



	改 正 案	現 行
フォルミウム (区分名を「ニューサイラン」から変更)	草姿、草丈、分枝の数、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の反り、葉身の横断面の形、葉身のねじれの有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色の模様の形、葉身の表面の二次色、葉身の表面の三次色の模様の形、葉身の表面の三次色、葉身の表面の色の安定度、葉身の裏面の色数、葉身の裏面の主な色、葉身の裏面の二次色、葉身の裏面の三次色、葉身の表面の光沢の有無 	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性

	改 正 案	現 行
ほんしめじ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の表面の色、菌叢の裏面中央部の色、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度(10℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(15℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(20℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(25℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(30℃/日)、菌さんの断面の形、菌さんの表面のいぼの有無、菌さんの大きさ、菌さんの中央部の色、菌さんの周縁部の色、菌さんの表面の模様の有無、菌さんの厚さ、菌さんの直径/菌柄の長さ、子実層たくの色、子実層たくの並び方、子実層たくの密度、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の肉質、菌柄の最大直径/菌さん下の菌柄の直径、子実体の発生型、最適培養期間(種菌接種後覆土までの培養期間)、覆土の必要性の有無、発生最盛期までの期間(発生処理後から収穫適期までの期間)、原基形成最適温度、子実体の生育最適温度、収量、有効茎数、対峙培養(帯線形成)	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの紋様、菌さんの肉質、子実層たくの形状及び子実層たくの色 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色及び菌柄の肉質 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性



	改 正 案	現 行
まいたけ	菌糸密度、気中菌糸の発達状態、菌叢の周縁部の形状、菌叢の厚さ、菌叢の表面の着色の有無、菌叢の表面の形状、菌糸体の生長最適温度、菌糸体の温度別生長速度(10℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(15℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(20℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(25℃/日)、菌糸体の温度別生長速度(30℃/日)、子実体株の径、菌さんの大きさ、菌さんの厚さ、菌さんの形状、菌さんの縁部の切れ込み、菌さんの断面の形、菌さんの表面の色、菌さんの肉質、菌さんの表面の環紋の形状、管孔発達の部位、子実体株基部の形、培養菌床の表面被(皮)膜の形成、培養菌床の表面被(皮)膜の色の有無、原基形成までの期間、発生最盛期までの期間(種菌接種から収穫適期までの期間)、子実体の生育最適温度、収量性、対峙培養(帯線形成)	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たくの形状、子実層たくの色及び子実層たくの菌柄へのつき方 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の菌さんへのつき方、菌柄の肉質、菌柄の毛の色及び菌柄の毛の多少 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性 

	改 正 案	現 行
まさき	樹姿、樹高(無摘心)、樹高(摘心)、新しょうの太さ、枝の帯化性の有無、新しょうの色、節間長、葉身の全体の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の周縁の形状、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、幼葉の表面の色、幼葉の斑の有無、幼葉の斑の模様、幼葉の斑の色、幼葉の斑の色の割合、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の模様、葉の斑の色、葉の斑の模様の色の割合、葉の斑の模様の色の移行性、葉の斑の模様の色の移行後の色、ほう芽期	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

	改 正 案	現 行
ユーホル ビア ヒペ リシフォリ ア(おとぎり ばにしきそ う)	草型、草丈、分枝の数、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニン着色の強弱、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉柄の長さ、葉柄の色、花房の幅、小花房の幅、花序の幅、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉の形、ほう葉の色 	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

	改 正 案	現 行
ライティア アンチディ センテリカ	樹姿、樹高、幹の太さ、幹の色、節間長、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様、葉身の斑の色、葉身の光沢の強弱、葉身の表面の毛の有無、葉身の裏面の毛の有無、つぼみの色、つぼみの巻き方、花の直径、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の重なり、花冠裂片の湾曲の程度、花冠裂片のねじれの強弱、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の表面の色、花の数、花筒の長さ、花筒の外面の色、副花冠の有無、副花冠の形、小花の向き、花冠裂片の数、雄ずいの色、がく裂片の色、花柄の長さ、花柄の色、花の香りの有無、開花始期	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては、接ぎ木特性



4. 形質の追加、用語等の適正化のため見直すもの

- ① ソルガム
- ② ディアスキア
- ③ とうがらし
- ④ なす(ばれいしょを除く。)
- ⑤ ひまわり
- ⑥ らっきょう
- ⑦ レタス

	改 正 案	現 行
ソルガム	幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、 幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の 強弱、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニ ン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強 弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の葉身 の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈の変色 の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡(出穂期 に変色しない場合。)、出穂期の止め葉の主脈 の黄着色の濃淡、<u>開花時の苞穎の色、開花時 の穎のアントシアニン着色の強弱、開花時の穎 の毛じのアントシアニン着色の強弱、開花時の 護穎の芒の着生の強弱、開花時の柱頭のアン トシアニン着色の強弱、開花時の柱頭の黄色 の着色の強弱、柱頭の長さ、小花の小花柄を 含む長さ、開花終期の穂の粒着の粗密、開花 終期の雄ずいの色、成熟期の草丈、稈の直径、 成熟期の先端から三番目の葉の長さ、成熟期 の葉の幅、成熟期の穂の長さ、成熟期の穂の 分枝の長さ、成熟期の穂の粗密、成熟期の穂 の形、成熟期の穂首の長さ、<u>成熟期の穎の色、 成熟期の穎の長さ、脱穀後の穎果の色、子実 の千粒重、正面から見た子実の形、側面から 見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実の 種皮によって覆われた割合、子実のタンニン含 量、胚乳の質(縦断面)、胚乳のガラス質の色、 茎の甘味、紫斑点病抵抗性</u> </u>	幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、 幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の 強弱、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニ ン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強 弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の 葉身の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈 の変色の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡 (出穂期に変色しない場合。)、出穂期の止め 葉の主脈の黄着色の濃淡、<u>開花時の苞えい の色、開花時のえいのアントシアニン着色の 強弱、開花時のえいの毛じのアントシアニン着 色の強弱、開花時の護えいののぎの着生の強 弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強 弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱、柱頭 の長さ、小花の小花柄を含む長さ、開花終期 の穂の粒着の粗密、開花終期の雄ずいの色、 成熟期の草丈、稈の直径、成熟期の先端から 三番目の葉の長さ、成熟期の葉の幅、成熟期 の穂の長さ、成熟期の穂の分枝の長さ、成熟 期の穂の粗密、成熟期の穂の形、成熟期の穂 首の長さ、<u>成熟期のえいの色、成熟期のえい の長さ、脱穀後のえい果の色、子実の千粒重、 正面から見た子実の形、側面から見た子実の 形、子実の胚痕の大きさ、子実の種皮によって 覆われた割合、子実のタンニン含量、胚乳の 質(縦断面)、胚乳のガラス質の色</u> </u>

	改 正 案	現 行
ディアスキア	草型、草丈、<u>株の幅</u>、分枝の粗密、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の光沢の強弱、葉身の斑の有無、葉身の色、葉身の斑の色、花序の粗密、小花柄の長さ、小花柄の着生角度、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の主な色、上唇弁の切れ込みの深さ、<u>下唇弁の側弁の反りの強弱</u>、下唇弁の下弁の縦横比、下唇弁の下弁の湾曲の強弱、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱、<u>下唇弁の腺状突起の有無、腺状突起の密度、花冠の中央部の目の色</u>、距の長さ、距の色、距の湾曲の強弱、距の先端の向き 	草型、草丈、<u>株幅</u>、分枝の粗密、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の光沢の強弱、葉身の斑の有無、葉身の色、葉身の斑の色、花序の粗密、小花柄の長さ、小花柄の着生角度、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の主な色、上唇弁の切れ込みの深さ、<u>下唇弁の側弁の反り</u>、下唇弁の下弁の縦横比、下唇弁の下弁の湾曲の強弱、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱、<u>下唇弁の線状突起分泌腺の有無、線状突起分泌腺の密度、上唇弁の中央部の目の色</u>、距の長さ、距の色、距の湾曲の強弱、距の先端の向き

	改 正 案	現 行
とうがらし	胚軸の着色の有無、子葉の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、短節間の有無、短節間と第一花までの節間数(短節間のある品種に限る。)、節間長(短節間のない品種に限る。)、節のアントシアニン着色の有無、節のアントシアニン着色の強弱、節の毛の強弱、草丈、葉身の長さ、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の凹凸の強弱、葉の横断面の反り、葉の光沢の強弱、花の色、花柄の向き、やくのアントシアニン着色の有無、未熟果の色、未熟果の色の濃淡、果実のアントシアニン着色の有無、果実の着生、果実の着生の向き、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果実基部の果皮の波打ちの強弱、果皮の波打ちの強弱、果実の表面の粗滑、成熟果の色、成熟果の色の濃淡、果実の光沢の強弱、果実のこうあの有無、果実のこうあの深さ、果実の先端の形、果実の条溝の深さ、果実の心室数、果肉の厚さ、果柄の長さ、果柄の太さ、がくの形、一果当たり種子数、胎座のカプサイシンの有無、辛味の強弱、開花期、成熟期、<u>トバモウ</u> <u>イルス抵抗性</u>、ジャガイモYウイルス抵抗性、疫病抵抗性、キュウリモザイクウイルス抵抗性、トマト黄化えそウイルス抵抗性、斑点細菌病抵抗性、<u>青枯病抵抗性</u>	胚軸の着色の有無、子葉の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、短節間の有無、短節間と第一花までの節間数(短節間のある品種に限る。)、節間長(短節間のない品種に限る。)、節のアントシアニン着色の有無、節のアントシアニン着色の強弱、節の毛の強弱、草丈、葉身の長さ、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の形、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の凹凸の強弱、葉の横断面の反り、葉の光沢の強弱、花の色、花柄の向き、やくのアントシアニン着色の有無、未熟果の色、未熟果の色の濃淡、果実のアントシアニン着色の有無、果実の着生、果実の着生の向き、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果実基部の果皮の波打ちの強弱、果皮の波打ちの強弱、果実の表面の粗滑、成熟果の色、成熟果の色の濃淡、果実の光沢の強弱、果実のこうあの有無、果実のこうあの深さ、果実の先端の形、果実の条溝の深さ、果実の心室数、果肉の厚さ、果柄の長さ、果柄の太さ、がくの形、一果当たり種子数、胎座のカプサイシンの有無、辛味の強弱、開花期、成熟期、<u>タバコモザイクウイルス抵抗性</u>、<u>トウガラシマイルドモットルウイルス抵抗性</u>、ジャガイモYウイルス抵抗性、疫病抵抗性、キュウリモザイクウイルス抵抗性、トマト黄化えそウイルス抵抗性、斑点細菌病抵抗性

	改 正 案	現 行
なす (ばれいしょを除く。)	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、<u>茎のとげの有無</u>、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、<u>葉身のとげの有無</u>、葉身の緑色の濃淡(<u>観賞用品種を除く。</u>)、<u>葉身の色数(観賞用品種に限る。)</u>、<u>葉身の主な色(観賞用品種に限る。)</u>、<u>葉身の二次色(観賞用品種に限る。)</u>、<u>葉身の三次色(観賞用品種に限る。)</u>、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱(円筒形の品種に限る。)、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡(果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。)、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果梗の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、<u>単為結果性の有無</u>	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身の緑色の濃淡、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱(円筒形の品種に限る。)、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡(果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。)、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果梗の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期

	改 正 案	現 行
ひまわり	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、葉の大きさ、<u>葉の緑色の濃淡</u>、葉の表面の凹凸の強弱、葉の鋸歯の粗密、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の葉耳の大きさ、葉の翼の発達の強弱、葉の最下位側脈の角度、葉柄の基部に対する葉身先端の位置、茎の先端の毛の粗密、開花期、<u>花型</u>、舌状花の粗密、舌状花の形、舌状花の形状、舌状花の長さ、舌状花の主な色、筒状花の色、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱、筒状花の花粉の有無、ほう葉の形、ほう葉の先端の長さ、ほう葉の外面の緑色の濃淡、ほう葉の頭花に対する抱えの強さ、草丈、分枝の有無、株の分枝の型(栽培条件による分枝を除く。)、主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置、頭花の向き、頭花の直径、頭花の成熟種子が着生した面の形、種子の大きさ、種子の形、種子の厚さ、種子の主な色、種子の周縁のしま模様、種子の胴部のしま模様、種子のしま模様の色	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、葉の大きさ、<u>葉の色</u>、葉の表面の凹凸の強弱、葉の鋸歯の粗密、葉の横断面の形、葉の先端の形、葉の葉耳の大きさ、葉の翼の発達の強弱、葉の最下位側脈の角度、葉柄の基部に対する葉身先端の位置、茎の先端の毛の粗密、開花期、舌状花の粗密、舌状花の形、舌状花の形状、舌状花の長さ、舌状花の主な色、筒状花の色、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の有無、筒状花の柱頭のアントシアニン着色の強弱、筒状花の花粉の有無、ほう葉の形、ほう葉の先端の長さ、ほう葉の外面の緑色の濃淡、ほう葉の頭花に対する抱えの強さ、草丈、分枝の有無、株の分枝の型(栽培条件による分枝を除く。)、主茎頂花に対する最上側枝の頂花の位置、頭花の向き、頭花の直径、頭花の成熟種子着生した面の形、種子の大きさ、種子の形、種子の厚さ、種子の主な色、種子の周縁のしま模様、種子の胴部のしま模様、種子のしま模様の色



	改 正 案	現 行
らっきょう	草姿、草丈、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の形、葉のねじれの強弱、葉の緑色の濃淡、葉のろう質の多少、葉しょう部の長さ、葉しょう部の太さ、葉しょう部のアントシアニン着色の強弱、花茎の数、花茎の長さ、花房の直径(観賞用品種に限る。)、小花の数(観賞用品種に限る。)、小花の色(観賞用品種に限る。)、分球数(食用品種に限る。)、一株球重、りん茎の縦径、りん茎の横径、りん茎の首の太さ、りん茎の縦断面の形、りん茎の内部分球の数、りん茎の一球重、りん茎の外皮の色、りん茎の辛味の強弱、りん片の数、りん片の表皮の色、ほう芽期、開花期(観賞用品種に限る。)、葉の枯れ上がりの早晩、収穫期(食用品種に限る。)、抽だいの早晩	草姿、草丈、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の形、葉のねじれの強弱、葉の緑色の濃淡、葉のろう質の多少、葉しょう部の長さ、葉しょう部の太さ、葉しょう部のアントシアニン着色の強弱、花茎の数、花茎の長さ、花房の直径、小花の数、小花の色、分球数、一株球重、りん茎の縦径、りん茎の横径、りん茎の首の太さ、りん茎の縦断面の形、りん茎の内部分球の数、りん茎の一球重、りん茎の外皮の色、りん茎の辛味の強弱、りん片の数、りん片の表皮の色、ほう芽期、開花期、葉の枯れ上がりの早晩、収穫期、抽だいの早晩 

	改 正 案	現 行
レタス	種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、幼苗のアントシアニン着色の有無、草姿、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る。）、球のしまり、球の大きさ、球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）、球の縦断面の形、葉の厚さ、収穫期の草姿、葉の形、葉身の先端の形、葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、<u>レタスビッグベイン病抵抗性</u>、アブラムシ耐性 	種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、幼苗のアントシアニン着色の有無、草姿、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る。）、球のしまり、球の大きさ、球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）、球の縦断面の形、葉の厚さ、収穫期の草姿、葉の形、葉身の先端の形、葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、アブラムシ耐性

5. 区分名を適正化のため見直すもの

- ① くろみのうぐいすかずら(ハスカップ) → くろみのうぐいすかぐら(ハスカップ)
- ② くささんだんか → ペンタス (種から属へ変更)
- ③ ニューサイラン → フォルミウム (種から属へ変更)
- ④ あかクローバ二 → あかクローバ
- ⑤ しろクローバ二 → しろクローバ