

(記載)

	限る。)、副弁の色(コラレット型品種に限る。)、頭花の花 色の変化
かき き	樹勢、樹姿、枝の長さ、枝の太さ、節間長、皮目の数、皮目の 大きさ、皮目の形、枝の色、芽の形、葉身の長さ、葉身の幅、 葉の形、葉身の基部の形、葉身の先端の形、雌雄性、雌花の花 冠の大きさ、雌花のがくの形、雌花の花冠裂片の数、果実の大 きさ、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果頂部の形、 <u>果 頂の溝の明瞭度、果頂の条紋の明瞭度、果頂の裂果性、果実の 縦溝の深さ、へた部のしわの多少、ていあの側面の形、へた部 の溝の有無、へたすき性、果実に対するへたの大きさ、へたの 姿勢、へた片の幅、果柄の長さ、果柄の太さ、果皮の色、果肉 の粗密、果肉の硬さ、果肉の色、果肉の褐斑の有無、果肉の褐 斑の大きさ、種子の大きさ、種子の形、種子の色、雌花の開 花期、ほう芽期、成熟期、甘渋性、脱渋の難易</u>
そば	<u>倍数性、子葉のアントシアニン着色の強弱、茎のアントシア ニン着色の強弱、花芽のアントシアニン着色の強弱、伸育性、草 丈、葉身の基部の形、葉の緑色の濃淡、花の大きさ、花弁の色 、小花柄の長さ、花房の数、分枝の数、茎の長さ、茎の節数、 茎の直径、子実の長さ、子実の長幅比、子実の形、乳熟後期の 果皮の色、完熟粒の果皮の色、丸抜きの色、千粒重、容積重、 子実の外観品質、生態型、開花始期、開花最盛期、成熟期、耐 倒伏性、穂発芽性、脱粒性、ルチン含量</u>
ファツ ヘデラ	<u>茎の長さ、茎の太さ、分枝性、節間長、茎の色、葉の形、葉の 切れ込みの数、葉の切れ込みの深さ、葉の基部裂片全体の形、 葉の側裂片全体の形、葉の頂裂片全体の形、葉の側裂片先端の 形、葉の頂裂片先端の形、葉の基部の形、葉の周縁の形、葉の よじれの強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、葉身の長さ、葉身の 幅、葉の厚さ、新葉の表面の色、葉の表面の色、葉の裏面の色 、葉脈の色、葉の斑の有無、葉の斑の模様(斑のある品種に限 る。)、葉の斑の色数(斑のある品種に限る。)、葉の斑の主</u>

かき	樹勢、樹姿、枝の長さ、枝の太さ、節間長、皮目の数、皮目の 大きさ、皮目の形、枝の色、芽の形、葉身の長さ、葉身の幅、 葉の形、葉身の基部の形、葉身の先端の形、雌雄性、雌花の花 冠の大きさ、雌花のがくの形、雌花の花冠裂片の数、果実の大 きさ、果実の縦断面の形、果実の横断面の形、果頂部の形、 <u>果 頂の溝の明瞭度、果頂の条紋の明瞭度、果頂の裂果性、果実 の縦溝の深さ、へた部のしわの多少、ていあの側面の形、へた 部の溝の有無、へたすき性、へたの果実に対する大きさ、へた の姿勢、へた片の幅、果柄の長さ、果柄の太さ、果皮の色、果 肉の色、果肉の褐斑の有無、果肉の褐斑の大きさ、種子の大 きさ、種子の形、種子の色、雌花の開花期、ほう芽期、成熟期、 果実の渋味</u>
そば	一 草型及び草丈、茎の形状、葉の形状、花の形状、子実の形 状、子実の粒重及び子実の品質 二 生態型、熟性、分枝性、耐倒伏性、脱粒性、収量性、加工 適性、製粉歩留り、食味、病害抵抗性及び虫害抵抗性 三 成分
ファツ ヘデラ	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識 別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食 用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ

(記載)

	<u>な色（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉の斑の二次色（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉の斑の色の变化性（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉の光沢の強弱</u> 、 <u>葉の毛の有無</u> 、 <u>葉柄の長さ</u> 、 <u>葉柄の上面の色</u> 、 <u>葉柄の下面の色</u> 、 <u>葉柄の毛の有無</u>
--	--

やまも もそう	<u>草丈、株幅、草丈／株幅、茎の粗密、花数、茎の傾き、分枝数</u> 、 <u>葉数、葉の着生位置、新しょうのアントシアニン着色の強弱</u> 、 <u>葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の分布（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉の斑の割合（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉の斑の色（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン着色の分布、葉のアントシアニン着色の割合、花柄のアントシアニン着色の強弱、花柄のアントシアニン着色の分布、つぼみの色、花の幅、上弁の形、上弁の長さ、上弁の幅、上弁の長さ／幅、上弁の表面の主な色、上弁の表面の二次色（脈を除く。）</u> 、 <u>上弁の表面の二次色の分布（脈を除く。）</u> 、 <u>上弁の脈の明瞭度、花柱の色</u> 、 <u>花糸の色、花色の変化</u>
------------	--

レタス	<u>種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、胚軸のアントシアニン着色の有無、幼苗のアントシアニン着色の有無、葉の姿勢、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球のしまり（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球重（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）</u> 、 <u>総採葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>葉の長さ、葉の幅、葉柄の基部の幅、葉の厚さ、収穫期の葉の姿勢、葉の形、葉身の先端の形、外葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシ</u>
-----	--

木特性

やまも もそう	<u>一 草姿及び草丈</u> <u>二 茎の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）</u> <u>四 品質特性</u> <u>五 早晩性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）</u> 、 <u>環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにおいて</u> <u>は根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにおいて</u> <u>は収量性、台木用品種にあっては接ぎ木特性</u>
------------	--

レタス	<u>種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、胚軸のアントシアニン着色の有無、幼苗のアントシアニン着色の有無、葉の姿勢、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（結球品種に限る。）</u> 、 <u>球のしまり（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球重（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球の基部のしまり（温室栽培のバターヘッドタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）</u> 、 <u>球葉数（カッティングタイプの品種を除く。）</u> 、 <u>総採葉数（カッティングタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>茎の長さ（ステムタイプの品種に限る。）</u> 、 <u>葉の長さ、葉の幅、葉柄の基部の幅、葉の厚さ、収穫期の葉の姿勢、葉の形、葉身の先端の形、外葉の色相、外葉の色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニン</u>
-----	--

(記載)

	アニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、芯の大きさ、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、開花期の草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、根腐病菌レース1抵抗性、根腐病菌レース2抵抗性、レタスビッグベイン病抵抗性、アブラムシ耐性	の分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）、葉脈の型、芯の大きさ、腋芽の発生の強弱、収穫期、抽だい始期、開花期の草丈、帯化の有無、帯化発生の強弱、べと病抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、根腐病菌レース1抵抗性、根腐病菌レース2抵抗性、レタスビッグベイン病抵抗性、アブラムシ耐性
ゆり	<u>草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、葉の数、葉序、葉の長さ、葉の幅、葉の斑の有無、葉の表面の光沢の強弱、葉の横断面の形、つぼみの主な色、花序の型、花序の花数、花序の毛の強弱、花型、花被の向き（小花柄を除く。）、花被の形（小花柄を除く。）、花の香り、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の肋状組織の強弱、花被片の周縁の波打ちの強弱、花被片の周縁の波打ちの型、花被片の外反の強弱、花被片の中央部の主な色、花被片の基部の主な色、花被片の蜜腺に接する部分の色、花被片の先端部分の主な色、花被片の縁部の主な色、花被片の外面の主な色、花被片の蜜腺の色、花被片の乳頭突起又は斑点の数、花被片の乳頭突起又は斑点の範囲の大きさ、花被片の乳頭突起又は斑点の色、雄ずいの長さ、花糸の主な色、やくの色、花粉の色、花柱の主な色、柱頭の色、開花期</u>	ゆり 一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉数、葉の着生角度、葉の毛じの多少、葉の白粉の有無、球根の形、球根の大きさ、りん片の形、りん片の色、りん片数、分球性及び珠芽着生の有無 三 つぼみの形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉数、雄ずいの数、花糸色、やくの大きさ、やくの色、花粉の色、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花柄の毛の多少、一花茎の花数及び花の香り 四 開花期、地上部枯死期、病害抵抗性及び虫害抵抗性
リナリア	[略]	リナリア [略]
やぶら	<u>草姿、葉群の高さ、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の先端の形、葉の外曲の強弱、葉の緑色の濃淡、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉の表面の斑の分布（斑のある品種に限る。）、花茎の長さ、花茎の色、葉に対する花序の位置、花序の形、花序の長さ、花序の幅、花序の花</u>	[新設]

(記載)

	<u>の粗密、小花柄の長さ、つぼみの色、花被片の表面の色、開花期</u>
ロマン ドラ ロンギ フォリ ア	<u>草姿、葉部の高さ、葉群の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉のろう質の強弱、葉の硬さ、葉の横断面の形、葉の先端の中央突起の位置、葉の基部の縁の褐色の濃淡、花序の長さ、花穂の位置、花柄の色、花穂の長さ、ほう葉の長さ、がくの色、花冠の色</u>
アセロ ラ	<u>樹姿、樹勢、枝の発生密度、節間長、枝の太さ、新しょうの毛じの粗密、葉身の長さ、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端の形、葉身の表面の緑色の濃淡、やくに対する柱頭の位置、花柱の湾曲、花卉の周縁の波打ちの強弱、花卉の桃色の濃淡、果実の長さ、果実の幅、果実の長さ／幅、果実の重さ、果実の形、果実の条溝の深さ、果頂部のくぼみの深さ、果頂部のくぼみの幅、梗あ部の深さ、梗あ部の幅、果柄の長さ、果皮の主な色、果肉の色、果実の酸味、果汁の多少、核の大きさ、核の褐色の濃淡</u>
ストック	[略]
はりつ るまさ	<u>樹姿、枝の長さ、枝の太さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁</u>

ロマン ドラ ロンギ フォリ ア	<u>一 草姿及び草丈</u> <u>二 茎の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）</u> <u>四 品質特性</u> <u>五 早晩性、ねん性（不ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにおいて根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにおいては収量性、台木用品種においては接ぎ木特性</u>
アセロ ラ	<u>一 樹姿及び樹高</u> <u>二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）</u> <u>四 品質特性</u> <u>五 早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種においては、接ぎ木特性</u>
ストック	[略]
	[新設]

(記載)

き	<u>の形、葉身の横断面の形、新葉の表面の主な色、新葉の表面の斑の有無、新葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、新葉の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の主な色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の表面の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉柄の長さ</u>
---	--

おしろ いばな	[略]
すすき	<u>草姿、草丈、葉群の高さ、茎の数、稈の長さ、節数、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身の形、葉身の反りの位置、葉身の横断面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）、中肋の色、穂の形、穂の長さ、穂の一次枝梗の数、穂の一次枝梗の長さ、小穂の長さ（毛、芒を除く。）、小穂の毛の長さ、小穂の毛の色、ほう穎の色、芒の有無、芒の長さ、出穂期</u>

まつよ いぐさ	<u>草丈、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の基部のアントシアニン着色の有無、茎の毛の基部のアントシアニン着色の強弱、ロゼット葉の長さ、ロゼット葉の幅、ロゼット葉の緑色の濃淡、ロゼット葉の葉縁の波打ちの強弱、ロゼット葉の表面の凹凸の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、花らいの大きさ、花らいのアントシアニン着色の有無、花の大きさ、花卉の有無、花卉の先端の形、花卉の地色、花卉の模様、花卉の模様の色、花卉のしぼんだ時の地色の变化の有無、柱頭の位置、花糸の色、さく果の長さ、さく果のアントシアニン着色の有無、さく果の着生密度、抽だいの早晚、開花の早晚、昼咲き性の有無</u>
------------	--

おしろ いばな	[略]
------------	-----

[新設]

まつよ いぐさ	<u>一 草姿及び草丈</u> <u>二 茎の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）</u> <u>四 品質特性</u> <u>五 早晚性、ねん性（ねん現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあつては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあつては収量性、台木用品種にあつては接ぎ木特性</u>
------------	---

稲	しょう葉のアントシアニン着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じの粗密、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じの粗密、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、護穎の長さ、護穎の色、穎の千粒重、穎の長さ、穎の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性
稲	しょう葉のアントシアニンの着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じの粗密、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎キールのアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じの粗密、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲の程度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎キールのアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、護穎の長さ、護穎の色、穎の千粒重、穎の長さ、穎の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡（フェノール反応のある品種に限る。）、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもちほ場抵抗性、穂いもちほ場抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病ほ場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現の程度（酒米品種に限る。）、グルテリン含量