

(記載)

しゃく やく	<u>ほう芽期、芽の形、芽の色、草型、草丈、茎の数、茎の太さ、節間長、分枝の多少、茎葉の毛の多少、葉の大きさ、複葉の形、頂小葉の形、葉の緑色の濃淡、葉縁の波打ちの有無、葉の光沢の強弱、葉の厚さ、葉の垂れ、抽だいの難易（薬用品種に限る。）、花首の長さ、花首の太さ、花首のアントシアニン着色の強弱、開花始めの花色、満開時の花色、花の大きさ、花の形、内弁の色（翁咲品種に限る。）、花弁数（一重・金しべ・翁咲品種を除く。）、花弁のぼかしの有無、花弁の絞りの多少、花弁先端の形、花弁の長さ、花弁の幅、雄しべの多少、雌しべの多少、雌しべの状態、柱頭の先端の形、柱頭の色、子房の毛の多少、開花期、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）、乾燥根の横断面の色（薬用品種に限る。）、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）、</u>
-----------	---

あかま つ	[略]
ごよう まつ	<u>樹型、樹冠の形、樹高、枝の太さ、枝の着生角度、枝の着生密度、針葉束当たりの針葉の数、針葉の長さ、針葉の幅、針葉の先端の形、針葉の先端の屈曲の有無、針葉のねじれの多少、針葉の曲りの強弱、針葉の夏の主な色、針葉の斑の有無、針葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、針葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、針葉の冬の主な色、針葉の色の季節変化、雄花の色、雌花の色、球果の長さ、球果の幅、球果の形、球果の色、種子の長さ、種子の幅、種子の形、種子の色、種子に対する種翼の長さ、種翼の色</u>

ピティ ロディ ア テ ルミナ リス	<u>草姿、草丈、開花枝の長さ、開花枝の太さ、節数、節間長、開花枝の毛の多少、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の縦断面の形、葉の横断面の形、葉の毛の多少、着花節部の長さ、着花節数、花数、花冠の縦径、花冠の横径、花冠筒部の長さ、花冠筒部の外面の色、花冠筒部の内面の斑点の有無、花</u>
--------------------------------	---

しゃく やく	<u>一 樹姿又は草型及び樹高又は草丈</u> <u>二 枝又は茎の太さ、枝又は茎の色、新しょう又は茎の毛の多少、発芽期の芽の形、発芽期の芽の色、芽立ち数、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉の毛の多少及び葉の着生角度</u> <u>三 花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、やくの色、花首の長さ、花首の太さ及び花の香り</u> <u>四 発芽期、開花期、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u>
-----------	--

あかま つ	[略]
	[新設]

ピティ ロディ ア テ ルミナ リス	<u>一 樹姿及び樹高</u> <u>二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）、</u>
--------------------------------	--

(記載)

	<u>冠筒部の内面の斑点の色、花冠裂片の色、花冠裂片の模様の有無、花冠裂片の毛の多少、がくの長さ、がくのアントシアニン着色の有無、がくの毛の多少</u>
--	--

すべり ひゆ	<u>草姿、草丈（草姿が半直立の品種に限る。）</u> 、 <u>株の幅、茎の数、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）</u> 、 <u>葉身の周縁のアントシアニン着色の有無、葉柄の有無、仮雄ずいの弁化の有無、弁化した仮雄ずいの主な色、花の側面の形（弁化した仮雄ずいのない品種に限る。）</u> 、 <u>花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の目の有無、花弁の目の色、花弁の色数（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の主な色（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の二次色（目を除く。）</u> （ <u>2色以上の品種に限る。）</u> 、 <u>花弁の二次色の分布（目を除く。）</u> （ <u>2色以上の品種に限る。）</u> 、 <u>花弁の三次色の分布（目を除く。）</u> （ <u>3色以上の品種に限る。）</u> 、 <u>花弁の先端の切れ込みの深さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柱のアントシアニン着色の強弱、開花始期</u>
-----------	---

さくら	[略]
すもも (日本 すもも を除 く。)	一 <u>樹姿、樹の大きさ及び樹勢</u> 二 <u>枝しょうの太さ、節間長、枝しょうの色、芽の形、葉形、葉の毛じの多少、葉の大きさ、葉色及び蜜腺の形</u> 三 <u>花形、花の大きさ、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の数、雌ずいの数、雌ずいの健否、雄ずいの色、花粉の多少、がく筒内壁の色、がくの形、がくの色及び花柄の長さ</u> 四 <u>果形、果実の大きさ、果皮の色、果粉の多少、果肉の色、肉質、果汁の多少、甘味、酸味、渋味、苦味、香気、核と果肉の粘離、核の形、核の大きさ、核の色及び核の紋</u>

	） 四 <u>品質特性</u> 五 <u>早晩性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> 六 <u>前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性</u>
--	--

すべり ひゆ	<u>草姿、草丈（草姿が半直立の品種に限る。）</u> 、 <u>株の幅、株の茎の数、茎のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色（斑入り品種に限る。）</u> 、 <u>葉身の周縁のアントシアニン着色の有無、葉柄の有無、花の仮雄ずいの弁化の有無、弁化した仮雄ずいの主な色、花の側面の形（仮雄ずいのない品種に限る。）</u> 、 <u>花の大きさ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の目の有無、花弁の目の色、花弁の色数（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の主な色（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の二次色（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の二次色の分布（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の三次色の分布（目を除く。）</u> 、 <u>花弁の先端の切れ込みの深さ、がくのアントシアニン着色の有無、花柱のアントシアニン着色の強弱、開花始期</u>
-----------	--

さくら	[略]
-----	-----

[新設]

(記載)

	<u>五 開花期、発芽期、落葉期、成熟期、結果性、果実の着色の難易、生理落果の多少、裂果性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあつては接ぎ木の難易、実生のそろい、栄養繁殖の難易、接ぎ木後の樹勢、台木の根の発育、耐干性及び耐湿性</u>
--	--

日本すもも	[略]
-------	-----

はなかんざし (ローダンセ)	[略]
ローダンセマム	<u>草型、草丈、株の幅、茎の太さ、節間長、節数、一次分枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉片の幅、葉の表面の毛の密度、花の直径、花盤の直径、花盤の主な色、舌状花の向き、舌状花の数、舌状花の形、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色（複色品種に限る。）、舌状花の裏面の主な色、舌状花の裏面の二次色（複色品種に限る。）、花粉の有無、開花期</u>

ロードヒポキシス	[略]
みかづきぐさ	<u>草型、草高、茎の太さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）、花穂の幅、ほうの長さ、ほうの幅、ほうの白色部の有無、ほうの白色部の長さ、そう果の形</u>

セルリ	<u>樹姿、樹高、樹の幅、葉の着生密度、木質塊茎の有無、葉の向</u>
-----	-------------------------------------

すもも	[略]
-----	-----

はなかんざし (ローダンセ)	[略]
-------------------	-----

[新設]

ロードヒポキシス	[略]
----------	-----

[新設]

セルリ	<u>一 樹姿及び樹高</u>
-----	-----------------

(記載)

ア	<u>き、葉の着生角度（常に直立する葉を除く。）</u> 、 <u>葉の長さ</u> 、 <u>葉の羽状欠刻の強弱</u> 、 <u>葉の裂片の厚さ</u> 、 <u>葉の色（アントシアニンを除く。）</u> 、 <u>葉の毛の強弱</u> 、 <u>葉の裂片の先端の色</u> 、 <u>開花枝の長さ</u> 、 <u>開花枝の太さ</u> 、 <u>開花枝の毛の強弱</u> 、 <u>開花枝の主な色</u> 、 <u>開花枝の分枝の有無</u> 、 <u>開花枝当たりの頭花数（開花枝が分枝する品種に限る。）</u> 、 <u>頭花の直径</u> 、 <u>頭花のよく発達した総ほう片の有無</u> 、 <u>頭花のよく発達した総ほう片の数</u> 、 <u>総ほう片の長さ</u> 、 <u>総ほう片の幅</u> 、 <u>総ほう片の長さ／幅</u> 、 <u>総ほう片の先端の形</u> 、 <u>総ほう片の地色</u> 、 <u>総ほう片の中肋の色</u> 、 <u>小花房の直径</u> 、 <u>小花房の色</u> 、 <u>小花房の先端の形</u> 、 <u>小花ほうの色</u> 、 <u>小花ほうの縁毛の長さ</u> 、 <u>小花の花被の長さ</u> 、 <u>小花のつぼみの先端部の毛の強弱</u> 、 <u>小花のつぼみの先端部の色（毛を除く。）</u> 、 <u>小花のつぼみの先端部の下の花被の色</u> 、 <u>開花期</u>
---	---

なす（ トマト 、ペピー ーノ及 びばれ いしょ を除 く。）	[略]
トマト	[略]
ペピー ーノ	<u>草丈</u> 、 <u>茎のアントシアニン着色の強弱</u> 、 <u>茎の毛の有無</u> 、 <u>葉の型</u> 、 <u>葉の長さ</u> 、 <u>葉の幅</u> 、 <u>葉身の形</u> 、 <u>葉身の緑色の濃淡</u> 、 <u>一花序の花の数</u> 、 <u>花の直径</u> 、 <u>花の表面の主な色</u> 、 <u>花の表面の二次色（複色品種に限る。）</u> 、 <u>未熟果の果実の色</u> 、 <u>果実の長さ</u> 、 <u>果実の直径</u> 、 <u>果実の長さ／直径</u> 、 <u>果実の縦断面の形</u> 、 <u>果実の梗あいの深さ</u> 、 <u>果実の先端の形</u> 、 <u>へたの大きさ</u> 、 <u>成熟果の果実の地色</u> 、 <u>果実の全体に占める条斑の割合</u> 、 <u>果実の条斑の色</u> 、 <u>果肉の色</u> 、 <u>果肉の硬さ</u> 、 <u>果実の可溶性固形物含量</u> 、 <u>収穫期</u>

ア	<u>二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状</u> <u>三 花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）</u> <u>四 品質特性</u> <u>五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u> <u>六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性</u>
---	---

なす（ トマト 及びば れいし ょを除 く。）	[略]
トマト	[略]

[新設]

(図案)

トレニア	草姿、草丈、株の幅、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の周縁の切れ込み、葉身の周縁の切れ込みの深さ、葉身の斑の有無、花序の腋花の有無、がく裂片の数、花の長さ、花の幅、花筒の長さ、花筒の外側の色、花筒の内側の条線の強弱、花筒の内側の基部の色、花冠裂片の周縁の切れ込みの強弱、花冠裂片の色の分布の型、上部花冠裂片の波打ちの強弱、上部花冠裂片の基部の色、上部花冠裂片の先端部の色、側部花冠裂片の中央部の色、側部花冠裂片の周縁部の色、下部花冠裂片の先端部の色、下部花冠裂片のブロッチの強弱
ゆうぎりそう	[略]
ていかかずら	樹型、樹高、樹幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の毛の有無、新葉のアントシアニン着色の強弱、葉身の緑色の濃淡、葉身の光沢の有無、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の斑の有無、葉身の斑の主な色（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）、葉身の斑の二次色（斑のある品種に限る。）、花冠裂片の向き、花の直径、花の高さ、花冠裂片の表面の主な色、花の香りの有無、開花の早晩
小麦	子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、出穂期、止め葉の葉しょうの白粉の強弱、止め葉の白粉の強弱、穂の白粉の強弱、穂首の白粉の強弱、草丈、穂首直下の節間の髓の厚さ、穂の形、粒着密度、穂の長さ、芒の有無、穂の先端の芒の長さ、穂の色、穂軸の先端凸部表面の毛の多少、護穎の肩部の幅、護穎の肩部の形、護穎の嘴の長さ、護穎の嘴の形、護穎の内側の毛の多少、原麦粒の色、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡、まき性、Glu-A1 遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1 遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1 遺伝子座にある対立遺伝子の

トレニア	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、とげの有無、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ及び葉柄の長さ 三 花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花卉の形、花卉数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
ゆうぎりそう	[略] [新設]
小麦	子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、出穂期、止葉の葉しょうの白粉の強弱、止葉の白粉の強弱、穂の白粉の強弱、稈の止葉下の白粉の強弱、草丈、穂首直下の節間の髓の程度、穂の形、粒着密度、穂の長さ、芒の有無、穂の先端の芒の長さ、穂の色、穂軸の先端凸部表面の毛の強弱、外穎の肩部の幅、外穎の肩部の形、外穎の嘴の長さ、外穎の嘴の形、外穎の内側の毛の粗密、原麦粒の色、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡、播き性、Glu-A1 遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-B1 遺伝子座にある対立遺伝子の発現、Glu-D1 遺伝子座にある対立遺伝子の

(記載)

発現、稈の長さ、<u>穂の色</u>、粒の形、千粒重、うるち・もちの別、成熟期、粒質	の発現、稈の長さ、<u>ふの色</u>、粒の形、千粒重、うるち・もちの別、成熟期、粒質
フリーセア 葉部の高さ、株の幅、葉の数、新葉の表面の主な色（斑を除く。）、新葉の斑の有無、新葉の斑の型（斑のある品種に限る。）、新葉の二次色の模様（斑を除く。）、新葉の表面の二次色（斑を除く。）、新葉の先端部の色（主な色と異なる場合に限る。）（斑を除く。）、葉しょうの長さ、葉しょうの幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の斑の有無、葉身の表面の主な色（斑を除く。）、葉身の斑の型（斑のある品種に限る。）、葉身の二次色の模様（斑を除く。）、葉身の表面の二次色（斑を除く。）、葉身の先端部の色（主な色と異なる場合に限る。）（斑を除く。）、葉身の裏面の主な色（斑を除く。）、ほうの色、花序の位置、花序の分枝の有無、花序の分枝数、花序の向き、花序の長さ、花序の着花部の長さ、花序の幅（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の長さ（花序に分枝がある品種に限る。）、花穂の幅、花穂の厚さ、花穂の形、花ほうの数、花ほうの着生状態、花ほうの長さ、花ほうの幅、花ほうの先端の角度、花ほうの外面の主な色、花ほうの外面の二次色、花ほうの内面の主な色、がくの色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の先端の色、子房の色、花柱の色、柱頭の色	フリーセア 一 草型及び草丈 二 葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉質、葉の硬さ、葉面の白粉の程度、葉縁のとげの形状及び吸枝の発生程度 三 花穂の形、花穂の大きさ、花穂の色、ほうの毛の多少、ほうのとげの有無、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、一花ほうの花数、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色及び花柄の毛の多少 四 開花期、花柄の分岐性、耐寒性、繁殖性、病害抵抗性及び虫害抵抗性