

	身の色 1 の分布、葉身の色 1 の模様、葉身の色 1 の面積、葉身の色 2、葉身の色 2 の分布、葉身の色 2 の模様、葉身の色 2 の面積、葉身の色 3、葉身の色 3 の分布、葉身の色 3 の模様、葉身の色 3 の面積、葉身の色 4、葉身の色 4 の分布、葉身の色 4 の模様、葉身の色 4 の面積、葉身の裏面の色、花茎の向き、花茎の長さ、花茎の主な色、花茎の花の着生する部位の長さ、花茎の花の着生する部位の幅、花茎の花の着生する部位の長さ／幅、花茎の花の粗密、つぼみの色、花の向き、花の長さ、花の幅、花の外面の色、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	
大麦	草姿、稈の長さ、葉しょうの毛の有無、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱、植物体の反曲した止め葉の多少、止め葉の葉しょう表面のろう質の多少、出穂期、芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性、穂のろう質の多少、穂の向き、草丈、穂の条数、穂の形、穂の粒着の粗密、穂の長さ、芒の長さ、穂軸の長さ、穂軸の曲がりの強弱、穂の不稔小穂の発育、不稔小穂の向き、<u>穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ</u>、穀粒の小穂軸の毛の型、穀粒の稃の有無、穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少、穀粒の縦溝の毛の有無、穀粒のりん皮の着き方、穀粒の糊粉層の色、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重（原麦粒）、まき性、穀粒硬度、麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）、コールバツハ数（ビール用品種に限る。）、ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ（$10x$）活性の有無、βグルカン含量、D-ホルデインの Hor- 3 座の遺伝子の発現、C-ホルデインの Hor- 1 座の遺伝子の発現、B-ホルデインの Hor- 2 座の遺伝子の発現	大麦 草姿、稈の長さ、葉しょうの毛の有無、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱、植物体の反曲した止め葉の多少、止め葉の葉しょう表面のろう質の多少、出穂期、芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性、穂のろう質の多少、穂の向き、草丈、穂の条数、穂の形、穂の粒着の粗密、穂の長さ、芒の長さ、穂軸の長さ、穂軸の曲がりの強弱、穂の不稔小穂の発育、不稔小穂の向き、<u>穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ</u>、穀粒の小穂軸の毛の型、穀粒の稃の有無、穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少、穀粒の縦溝の毛の有無、穀粒のりん皮の着き方、穀粒の糊粉層の色、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重（原麦粒）、まき性、穀粒硬度、麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）、コールバツハ数（ビール用品種に限る。）、ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ（$10x$）活性の有無、βグルカン含量、D-ホルデインの Hor- 3 座の遺伝子の発現、C-ホルデインの Hor- 1 座の遺伝子の発現、B-ホルデインの Hor- 2 座の遺伝子の発現
ニューギニアインパ	葉部の高さ、株幅、茎のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の	ニューギニアインパ 葉部の高さ、株の幅、茎のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の

チェン ス	色（斑入り品種に限る。）、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の葉脈間の色、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）、葉身の裏面の葉脈の色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の表面の主な色、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）、花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）、花の目の有無、花の目の大きさ、花の目の主な色、花の上弁の幅（一重品種に限る。）、花の側弁の幅（一重品種に限る。）、花の下弁の長さ（一重品種に限る。）、花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）、距の曲がりの強弱
----------	---

カルミ ア	〔略〕
クニフ オフィ ア	草丈、葉の展開状態、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の表面の色、葉の横断面の形、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花序の葉に対する位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の花の粗密、未熟なつぼみの主な色、開花直前のつぼみの主な色、花被の色の变化の有無、花被の向き、花被の長さ、花被の筒部の直径、花被の長さ／花被の筒部の直径、花被の筒部の外面の色、花被の裂片の湾曲、花糸の色、花被の長さに対する雄ずいの長さ

ラウア ンドウ ラ（ラ ベンダ ー）	樹姿、株の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の灰色の強弱、花茎の伸長方向、株の枝の粗密、葉の長さ、葉の幅（ <u>Pterostoechas</u> 節を除く。）、葉の幅（ <u>Pterostoechas</u> 節に限る。）、葉の周縁の切れ込み、葉の斑の有無、葉の斑の分布、葉の斑の色、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の緑色の濃淡、花茎の基部の強さ（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花茎の毛の粗密（ <u>Stoechas</u> 及び <u>Pterostoechas</u> 節に限る。）、花茎の分枝の有無、花茎の分枝数、花茎の最長分枝の長さ、花穂の最大幅、花穂の長さ、花穂の第二輪生花からの長さ（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花穂の輪生花の
--------------------------------	--

チェン ス	の色（斑入り品種に限る。）、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の葉脈間の色、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）、葉身の裏面の葉脈の色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の表面の主な色、花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）、花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）、花の目の有無、花の目の大きさ、花の目の主な色、花の上弁の幅（一重品種に限る。）、花の側弁の幅（一重品種に限る。）、花の下弁の長さ（一重品種に限る。）、
----------	--

カルミ ア	〔略〕
	〔新設〕

ラベン ダー	樹姿、株の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の灰色の強弱、花茎の伸長方向、株の枝の粗密、葉の周縁の切れ込みの有無、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の緑色の濃淡、花茎の基部の強さ（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花茎の毛の粗密（ <u>Stoechas</u> 及び <u>Pterostoechas</u> 節に限る。）、花茎の分枝の有無、花茎の分枝数、花茎の最長分枝の長さ、花穂の最大幅、花穂の長さ、花穂の第二輪生花からの長さ（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花穂の輪生花の段数（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花穂の輪生花間の距離（ <u>Lavandula</u> 節に限る。）、花穂の形、花穂の花の数、花穂の最上位輪生
-----------	--

	段数（Lavandula 節に限る。）、花穂の輪生花間の距離（Lavandula 節に限る。）、花穂の形、花穂の花の数、花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula 節に限る。）、ほう葉の幅、ほう葉の色（Stoechas 及び Pterostoechas 節に限る。）、 <u>小ほう葉の有無（Lavandula 節に限る。）</u> 、 <u>小ほう葉の長さ（Lavandula 節に限る。）</u> 、先端ほう葉の有無、先端ほう葉の長さ（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の形（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の主な色（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas 節に限る。）、 <u>がくの色、がくの毛の粗密、花冠の色数、花冠の主な色、花冠の二次色、花冠の二次色の分布、開花始期</u>
--	---

ロベリア	[略]
ロブリア	草丈、株幅、 <u>茎の分枝の粗密、茎の基部の太さ、茎の色、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の周縁の形、葉の先端の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の有無、花序の直径、花序の小花数、小花の直径、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニン着色の有無、がく片の形、がく片の緑色の濃淡、がく片のアントシアニン着色の有無、がく片の毛の有無、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の形、開花初期の花弁の色、開花盛期の花弁の色</u>

リモニウム（旧スターチス）	草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉の表面の毛の密度、葉の周縁の毛の密度、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの強弱、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、 <u>茎出葉の有無、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の毛の密度、花茎の色、花茎の翼の幅、花茎の翼の波打ちの強弱、一次分枝部のたく葉の長さ、花序の型、一次分枝の長さ、花序の分枝性、分枝の方向、花序の花数、がくの長さ、がくの直径、がくの形、がくの主な色、がくの中肋の色</u>
---------------	--

	花の花の数（Lavandula 節に限る。）、ほう葉の幅、ほう葉の色（Stoechas 及び Pterostoechas 節に限る。）、 <u>ほう葉の有無（Lavandula 節に限る。）</u> 、 <u>小ほう葉の長さ（Lavandula 節に限る。）</u> 、先端ほう葉の有無、先端ほう葉の長さ（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の形（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の主な色（Stoechas 節に限る。）、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas 節に限る。）、 <u>がくの色、がくの毛の粗密、花冠の主な色、開花始期</u>
--	---

ロベリア	[略]
------	-----

[新設]

リモニウム（旧スターチス）	草丈、 <u>分けつの多少</u> 、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉の表面の毛の密度、葉の周縁の毛の密度、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの強弱、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、 <u>茎出葉の有無、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の毛の密度、花柄の色、花柄の翼の幅、花柄の翼の波打ちの強弱、一次分枝部のたく葉の長さ、花序の型、一次分枝の長さ、花序の分枝性、分枝の方向、花序の花数、がくの長さ、がくの直径、がくの形、がくの主な色、</u>
---------------	---

	、花冠の大きさ、花冠の型、花冠の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭の形、花の香りの有無、開花始期
--	---

もくれん	[略]
マルコミアマリテイマ	草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の多少、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉表面の緑色の濃淡、葉身の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉身の長さ、葉身の幅、がくの色、花の直径、花の目の有無、花弁の形、花弁先端の切れ込みの深さ、花弁表面の主な色、花弁表面の二次色、開花後期の花弁表面の主な色、開花後期の花弁表面の脈の明瞭度

桑	<u>倍数性、樹勢、刈桑樹型、冬芽の形、冬芽の大小、冬芽の色、副芽の多少、枝条数、枝の揃い、側枝数、矮小枝条の数、枝条の長さ、枝条の太さ、枝条の色、枝の屈曲の強弱、節間長、葉序、葉の着生角度、葉身の欠刻の数、葉身の欠刻の深さ、葉身の大きさ、葉身の先端の形、葉身の鋸歯の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の厚さ、葉柄の長さ、花性、雌花穂の多少、花柱の長さ、果実の縦径（果実用品種に限る。）、果実の横径（果実用品種に限る。）、果実の形（果実用品種に限る。）、果実の重さ（果実用品種に限る。）、果実の色（果実用品種に限る。）、着果数、果柄の長さ（果実用品種に限る。）、種子の大きさ（果実用品種に限る。）、発芽の早晚、再発芽力、枝条の伸長停止期、さし木の発根力、枝条の先枯れの多少、耐倒伏性、胴枯病抵抗性、縮葉細菌病抵抗性、萎縮病抵抗性、裏うどんこ病抵抗性、菌核病抵抗性（果実用品種に限る。）、春蚕期の収葉量（果実用品種を除く。）、夏秋蚕期の収葉量（果実用品種を除く。）、春蚕期の新しょう割合（果実用品種を除く。）、夏秋蚕期の葉量割合（果実用品種を除く。）、芽のすそ上り、葉のこき取りの難易、葉の硬化の早晚、飼料価値（蚕飼料用品種に限る。）、開花期</u>
---	---

	がくの中ろくの色、花冠の大きさ、花冠の型、花冠の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭の形、花の香りの有無、開花始期
--	---

もくれん	[略]
	[新設]

桑	<u>一 樹姿及び樹勢</u> <u>二 発芽の早晚、不発芽割合、花芽の多少、芽色、芽のすそ上り、再発芽性及び芽の着生状態</u> <u>三 葉形、葉の大きさ、葉の厚さ、葉色、葉の光沢、葉の硬化の早晚、葉のこき取りの難易、葉の粗滑及び着葉角度</u> <u>四 樹色、枝条長、枝条数、枝条の径、枝条の曲直、枝のそろい、側枝の多少及び節間長</u> <u>五 果形、果実の大きさ、果実の色、甘味及び酸味</u> <u>六 開花期、果実の成熟期、発根性、耐寒性、耐干性、耐倒伏性、蚕期別収葉量、蚕期別葉量割合、葉質、病害抵抗性及び虫害抵抗性</u>
---	---

	(果実用品種に限る。)、成熟期(果実用品種に限る。)、糖度(果実用品種に限る。)、酸度(果実用品種に限る。)
--	--

はす	[略]
ふうら ん	一 草型及び草丈 二 茎又はぎ球茎の形、茎の太さ、ぎ球茎の大きさ、茎又はぎ球茎の色、茎の毛の多少、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花茎の抽出角度、花茎の分枝性、花芽の発生位置及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

オンシ ジウム	植物体の大きさ、葉の向き、ぎ球茎の大きさ、ぎ球茎の縦断面の形、ぎ球茎の横断面の形、ぎ球茎の下位葉の数、ぎ球茎の上位葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の表面の緑色の濃さ、花序の型、花序の長さ、花序の幅、花序の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花のセパルの湾曲、花のペタルの湾曲、花の縦径、花の横径、花の香り、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの形、ドーサルセパルの縦断面の形、ドーサルセパルの横断面の形、ドーサルセパルの周縁の波打ち、ドーサルセパルの地色、ドーサルセパルの覆色のぼかしの色、ドーサルセパルの斑点の数、ドーサルセパルの斑点の大きさ、ドーサルセパルの斑点の色、ドーサルセパルの横縞の数、ドーサルセパルの横縞の分布、ドーサルセパルの横縞の色、ドーサルセパルの縦縞の色、ドーサルセパルの覆輪の幅、ドーサルセパルの覆輪の色、ドーサルセパルの基部斑の大きさ、ドーサルセパルの基部斑の色、ラテラルセパルの長さ、ラテラルセパルの幅、ラテラルセパルの形、ラテラルセパルの縦断面の形、ラテラルセ
------------	--

--	--

はす	[略]
	[新設]

オンシ ジウム	一 草型 二 ぎ球茎の形、ぎ球茎の大きさ、ぎ球茎の色、葉の向き、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ及び葉数 三 花房の形、花房の大きさ、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の強さ、花茎の色、花茎の抽出角度及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
------------	--

パルの横断面の形、ラテラルセパルのねじれ、ラテラルセパルの周縁の波打ち、ラテラルセパルの地色、ラテラルセパルの覆色のぼかしの色、ラテラルセパルの斑点の数、ラテラルセパルの斑点の大きさ、ラテラルセパルの斑点の色、ラテラルセパルの横縞の数、ラテラルセパルの横縞の分布、ラテラルセパルの横縞の色、ラテラルセパルの縦縞の色、ラテラルセパルの覆輪の幅、ラテラルセパルの覆輪の色、ラテラルセパルの基部斑の大きさ、ラテラルセパルの基部斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの形、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれ、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの地色、ペタルの覆色のぼかしの色、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの横縞の数、ペタルの横縞の分布、ペタルの横縞の色、ペタルの縦縞の色、ペタルの覆輪の幅、ペタルの覆輪の色、ペタルの基部斑の大きさ、ペタルの基部斑の色、リップの長さ、リップの幅、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさ、リップの周縁の波打ち、リップの中央裂片の形、リップの中央裂片の切れ込み、リップの中央裂片の縦断面の形、リップの中央裂片の横断面の形、リップの中央裂片の地色、リップの中央裂片の覆色のぼかしの色、リップの中央裂片の斑点の色、リップの中央裂片の横縞の色、リップの中央裂片の覆輪の色、リップの側裂片の地色、リップのカルスの色、リップのカルス周辺の色

ちぢみ ざさ	[略]
オリガ ヌム	草姿、茎の長さ、分枝の数、最長分枝の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の表面の色、葉身の斑の有無、葉身の
ロツン ディフ	斑の型、葉の向き、花穂の数、花穂の長さ、花穂の幅、ほう葉
オリウ ム	数の数、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉のアントシアニン着色の強弱、一ほう葉当たりの小花数、小花の長さ、小花の雄ずいの露出の有無、小花の主な色、花穂の香りの強弱、開花期

ちぢみ ざさ	[略]
-----------	-----

[新設]

オステ オスぺ ルマム	草姿、 <u>草丈</u> 、 <u>葉の長さ</u> 、 <u>葉の幅</u> 、 <u>葉の周縁の切れ込みの深さ</u> 、 <u>葉の斑の有無</u> 、 <u>葉の緑色の濃淡</u> 、 <u>開花初期の頭花の舌状花の主な色</u> 、 <u>副花冠の有無</u> 、 <u>舌状花の数</u> 、 <u>頭花の直径</u> 、 <u>花盤の型</u> 、 <u>花盤の直径</u> （ <u>花盤がデイジー型の品種に限る。</u> ）、 <u>花盤の直径</u> （ <u>花盤がアネモネ型の品種に限る。</u> ）、 <u>花盤の色</u> （ <u>花盤がデイジー型の品種に限る。</u> ）、 <u>優勢な管状花の型</u> （ <u>花盤がアネモネ型の品種に限る。</u> ）、 <u>漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色</u> 、 <u>花弁状の管状花の表面の主な色</u> 、 <u>舌状花の長さ</u> 、 <u>舌状花の幅</u> 、 <u>舌状花の長さ／幅</u> 、 <u>舌状花の先端の形</u> 、 <u>舌状花の横断面の内巻きの有無</u> 、 <u>舌状花の周縁の内巻き部分の比率</u> 、 <u>舌状花の基部の目の幅</u> （ <u>花盤がデイジー型の品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の基部の目の色</u> 、 <u>舌状花の下部の主な色</u> 、 <u>舌状花の中央部の主な色</u> 、 <u>舌状花の上部の主な色</u> 、 <u>舌状花の縦縞の明瞭度</u> 、 <u>舌状花の先端の色</u> 、 <u>舌状花の裏面の色の区分</u>	オステ オスぺ ルマム	草姿、 <u>主茎の長さ</u> 、 <u>葉の長さ</u> 、 <u>葉の幅</u> 、 <u>葉の周縁の切れ込みの深さ</u> 、 <u>葉の斑の有無</u> 、 <u>葉の表面の緑色の濃淡</u> 、 <u>開花初期の頭花の舌状花表面の主な色</u> 、 <u>副花冠の有無</u> 、 <u>舌状花の数</u> 、 <u>頭花の直径</u> 、 <u>舌状花の長さ</u> 、 <u>舌状花の幅</u> 、 <u>舌状花の長さ／幅</u> 、 <u>舌状花の先端の形</u> 、 <u>舌状花の横断面の内巻きの有無</u> 、 <u>舌状花の周縁の内巻き部分の長さ</u> （ <u>舌状花が内巻きの花に限る。</u> ）、 <u>舌状花の形</u> （ <u>内巻きのない品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の基部の向き</u> 、 <u>舌状花の下部の色</u> 、 <u>舌状花の表面の色数</u> 、 <u>舌状花の表面の主な色</u> 、 <u>舌状花の表面の色の分布</u> （ <u>単色の品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の表面の二次色</u> （ <u>二色以上の品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の表面の二次色の分布</u> （ <u>二色以上の品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の表面の三次色</u> （ <u>三色以上の品種に限る。</u> ）、 <u>舌状花の裏面中央部の色の区分</u> 、 <u>花盤の直径</u> 、 <u>花盤の色</u>
ファレ ノプシ ス	<u>植物体の長さ</u> 、 <u>植物体の花序の数</u> 、 <u>葉の長さ</u> 、 <u>葉の幅</u> 、 <u>葉の形</u> 、 <u>葉の最大幅の位置</u> 、 <u>葉の先端の形</u> 、 <u>葉の先端の対称性</u> 、 <u>葉の向き</u> 、 <u>葉の斑の有無</u> 、 <u>葉の表面の斑点の有無</u> 、 <u>葉の表面の主な色</u> 、 <u>葉の表面のアントシアニンの着色</u> 、 <u>花序の型</u> 、 <u>花序の長さ</u> 、 <u>花序の花数</u> 、 <u>花茎の長さ</u> 、 <u>花茎の太さ</u> 、 <u>花茎のアントシアニンの着色</u> 、 <u>花の側面の形</u> 、 <u>花の縦径</u> 、 <u>花の横径</u> 、 <u>花のペタルの配列</u> 、 <u>花の香り</u> 、 <u>ドーサルセパルの長さ</u> 、 <u>ドーサルセパルの幅</u> 、 <u>ドーサルセパルの形</u> 、 <u>ドーサルセパルの最大幅の位置</u> 、 <u>ドーサルセパルの縦断面の形</u> 、 <u>ドーサルセパルの横断面の形</u> 、 <u>ドーサルセパルのねじれの有無</u> 、 <u>ドーサルセパルの周縁の波打ち</u> 、 <u>ドーサルセパルの表面の地色</u> 、 <u>ドーサルセパルの覆色</u> 、 <u>ドーサルセパルの斑点の数</u> 、 <u>ドーサルセパルの斑点の大きさ</u> 、 <u>ドーサルセパルの斑点の色</u> 、 <u>ドーサルセパルの縞斑の数</u> 、 <u>ドーサルセパルの縞斑の色</u> 、 <u>ドーサルセパルの網斑の密度</u> 、 <u>ドーサルセパルの網斑の色</u> 、 <u>ラテラルセパルの表面の地色</u> 、 <u>ラテラルセパルの覆色</u> 、 <u>ラテラルセパルの斑点の数</u> 、 <u>ラテラルセパルの斑点の色</u> 、 <u>ラテラルセパルの縞斑の数</u> 、 <u>ラテラルセパルの縞斑の色</u> 、	ファレ ノプシ ス	一 <u>草型</u> 二 <u>ぎ球茎の形</u> 、 <u>葉の向き</u> 、 <u>葉形</u> 、 <u>葉の大きさ</u> 、 <u>葉色</u> 、 <u>葉の厚さ及び葉数</u> 三 <u>花房の形</u> 、 <u>花房の大きさ</u> 、 <u>花の向き</u> 、 <u>花形</u> 、 <u>花の大きさ</u> 、 <u>花色</u> 、 <u>花弁の形</u> 、 <u>花弁の大きさ</u> 、 <u>花弁の色</u> 、 <u>花弁の厚さ</u> 、 <u>一花茎の花数</u> 、 <u>花茎の長さ</u> 、 <u>花茎の太さ</u> 、 <u>花茎の強さ</u> 、 <u>花茎の色</u> 、 <u>花茎の分枝性</u> 、 <u>花茎の抽出角度及び花の香り</u> 四 <u>開花期</u> 、 <u>耐寒性</u> 、 <u>耐暑性</u> 、 <u>病害抵抗性</u> 及び <u>虫害抵抗性</u>

	ラテラルセパルの網斑の密度、ラテラルセパルの網斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの正面の形、ペタルの最大幅の位置、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれの有無、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの表面の地色、ペタルの覆色、ペタルの覆色の面積、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの縞斑の数、ペタルの縞斑の色、ペタルの網斑の密度、ペタルの網斑の色、リップの中央裂片の長さ、リップの中央裂片の幅、リップの中央裂片の形、リップのヒゲの有無、リップのヒゲの長さ、リップの中央裂片の突起又は稜、リップの側裂片の形、リップの側裂片の巻き込み、リップの側裂片の大きさ、中央裂片の地色、中央裂片の覆色、中央裂片の斑点の数、中央裂片の斑点の大きさ、中央裂片の斑点の色、中央裂片の縞斑の数、中央裂片の縞斑の色、中央裂片の網斑の密度、中央裂片の網斑の色、側裂片の地色、側裂片の覆色、側裂片の斑点の数、側裂片の斑点の色、側裂片の縞斑の数、側裂片の縞斑の色、側裂片の網斑の密度、側裂片の網斑の色、リップのカルス、カルスの色、カルスの毛の有無、ずい柱の色
--	--

--	--

つつじ	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の斑の有無、成葉の斑の模様、成葉の斑の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数（八重品種に限る。）、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の
-----	---

ロード デンド ロン	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数（八重品種に限る。）、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭
------------------	---

花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）

の色、開花始期、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の形（常緑の品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）、成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）

ロスマ リヌス （ロー ズマリ ー）	樹姿、樹高、株幅、葉群の粗密、節間長、葉の長さ、葉の幅、 葉の長さ／幅、展開直後の新葉表面の色、葉の表面の色、葉の 表面の斑の有無、葉の表面の斑の種類（斑のある品種に限る。 ）、葉の表面の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉の表面の 光沢の有無、葉の表面の粗滑、葉の湾曲の向き、葉の湾曲の強 弱、葉の周縁部の反転の強弱、がくの大きさ、がくの形、がく のアントシアニン着色の有無、花の着き方、花冠の長さ、花冠 の幅、花冠の下唇弁の地色、花冠の下唇弁の濃色模様の色、花 柱の長さ、雄ずいと比較した花柱の長さ、花柱の色、開花習性 、開花期
--------------------------------	--

ローズ マリー	一 樹姿及び樹高 二 枝の長さ、分枝性、葉形、葉の大きさ及び葉色 三 花の大きさ、花色、花数及び花の着生位置 四 開花期、香気、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 五 成分
------------	--

スクテ ラリア コス タリカ ナ	[略]
セドゥ ム ブ リト	茎の長さ、茎の太さ、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、 葉の形、葉の先端の形、新葉の表面の色、葉の表面の色

スクテ ラリア コス タリカ ナ	[略]
	[新設]

なす（ トマト 、ペピ	^{はい} 胚軸のアントシアニン着色の有無、 ^{はい} 胚軸のアントシアニン着色 の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のア ントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎
-------------------	---

なす（ トマト 、ペピ	^{はい} 胚軸のアントシアニン着色の有無、 ^{はい} 胚軸のアントシアニン着色 の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のア ントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎
-------------------	---

一ノ、 ふゆさ んご及 びばれ いしよ を除 く。)	の毛じの粗密、茎のとげの有無、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身のとげの有無、葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）、葉身の色の数（観賞用品種に限る。）、葉身の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の二次色（観賞用品種に限る。）、葉身の三次色（観賞用品種に限る。）、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果柄の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、 <u>単為結果性</u>
--	---

ペピー ノ	[略]
ふゆさ んご	樹高、樹幅、樹高に対する樹幅、茎の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の長さに対する幅、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の凹凸の強弱、葉の地色、葉の斑の有無、葉の斑の主な色、葉の斑の二次色、花冠の直径、花冠裂片の表面の主な色、幼果の主な色、幼果の模様の有無、幼果の模様の色、果実の長さ、果実の直径、果実の長さに対する直径、果実の主な色、果柄の長さ、へたの直径

ベロニ カ	[略]
おおよ まり	樹姿、樹高、樹幅、枝の毛の粗密、枝のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の

一ノ及 びばれ いしよ を除 く。)	の毛じの粗密、茎のとげの有無、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身のとげの有無、葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）、葉身の色の数（観賞用品種に限る。）、葉身の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の二次色（観賞用品種に限る。）、葉身の三次色（観賞用品種に限る。）、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）、収穫時の果皮の主な色、果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。）、果実の光沢の強弱、果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果梗の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、 <u>単為結果性の有無</u>
--------------------------------	--

ペピー ノ	[略]
----------	-----

[新設]

ベロニ カ	[略]
----------	-----

[新設]

長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の粗密、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の表面の光沢の有無、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、花序の高さ、花序の幅、花序の形、花の性型、両性花の数、両性花の色、装飾花の数、装飾花の花冠裂片の形、装飾花の花冠裂片の重なり、装飾花の直径、装飾花の花冠裂片の主な色、装飾花の花冠裂片の二次色の有無、装飾花の花冠裂片の二次色、装飾花の花冠裂片の二次色の分布、装飾花の花冠裂片の花色の移行性、装飾花の開花終期の花冠裂片の色（花色の移行性を有する品種に限る。）、装飾花の花冠裂片の切れ込みの有無、装飾花の花冠裂片の対称性、装飾花の花冠裂片の横断面の形、開花始期、果実の長さ、果実の幅、果実の形、果実の色

パンジー

[略]

せいよう
うにん
じんぼ
く

樹姿、樹高、株幅、枝の太さ、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニン着色の強弱、小葉の数、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、花序の長さ、花序の幅、中心花房の長さ、中心花房の幅、花の直径、がくのアントシアニン着色の強弱、花冠裂片の反転の強弱、花冠裂片の主な色、花冠裂片の模様の有無、花冠裂片の模様の色、花筒の長さ、開花期

パンジー

[略]

[新設]