

重要な形質の指定に関する説明資料

食料産業局

平成 2 5 年 1 2 月 6 日

農林水産省

諮問植物一覧

1. 区分を新設するもの

- ① のこぎりそう
- ② おおばなののこぎりそう
- ③ めぎ
- ④ おおしまこぼんのき
- ⑤ ふじうつぎ
- ⑥ ひとつばたご
- ⑦ デイギタリス
- ⑧ デイオニシア アレティオイデス
- ⑨ エキナケア
- ⑩ ウラルかんぞう
- ⑪ アジアわた
- ⑫ クニフォフィア
- ⑬ ロブラリア
- ⑭ マルコミア マリティマ
- ⑮ オリガヌム ロツンディフォルム
- ⑯ セドウム ブリト
- ⑰ ふゆさんご
- ⑱ おおでまり
- ⑲ せいようにんじんぼく

2. UPOVテストガイドラインに準拠改正するもの

- ① グラジオラス
- ② ホイヘラ(つぼさんご)
- ③ オンシジウム
- ④ ファレノプシス

3. UPOVテストガイドラインにない種類で改正するもの

- ① シクラメン
- ② 桑
- ③ ロスマリヌス(ローズマリー)

4. 1～3の改正後の運用の結果等、所要の修正を行うもの

- ① むかぼ
- ② 茶
- ③ オーチャードグラス
- ④ トールフェスク
- ⑤ メドウフェスク
- ⑥ フェストロリウム
- ⑦ 大麦
- ⑧ ニューギニアインパチェンス
- ⑨ ラウアンドウラ(ラベンダー)
- ⑩ リモニウム(旧スターチス)
- ⑪ オステオスペルマム
- ⑫ つつじ
- ⑬ なす(トマト、ペピーノ、ふゆさんご及びばれいしょを除く。)

1. これまでに出願のなかった植物種類について、審査の必要上から審査基準を作成するため、区分を新設するもの

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① のこぎりそう | ⑪ アジアわた |
| ② おおばなののこぎりそう | ⑫ クニフォフィア |
| ③ めぎ | ⑬ ロブラリア |
| ④ おおしまこぼんのき | ⑭ マルコミア マリティマ |
| ⑤ ふじうつぎ | ⑮ オリガヌム ロツンディフォルム |
| ⑥ ひとつばたご | ⑯ セドウム ブリト |
| ⑦ ディギタリス | ⑰ ふゆさんご |
| ⑧ ディオニシア アレティオイデス | ⑱ おおでまり |
| ⑨ エキナケア | ⑲ せいようにんじんぼく |
| ⑩ ウラルかんぞう | |

1. 区分を新設するもの

のこぎりそう

(学名 : Achillea L.)

改 正 案	現 行
草丈、株幅、立茎数、茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、節間長、一次分枝の多少、一次分枝の発生位置、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉の色、葉の裏面の毛の多少、小葉の葉縁の切れ込みの深さ、花序の幅、頭花の粗密、頭花の直径、舌状花の数、舌状花の大きさ、開花初期の舌状花の色、開花盛期の舌状花の色、管状花の色、頭花のにおいの有無、開花期	なし 

1. 区分を新設するもの

おおばなののこぎりそう

(学名 : *Achillea ptarmica* L.)

改 正 案	現 行
草姿、一次分枝の長さ、一次分枝の節間長、二次分枝の多少、葉の長さ、葉の幅、葉の鋸歯の深さ、頭花の数、つぼみの縦断面の形、頭花の形、頭花の直径、舌状花の多少、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の先端の切れ込みの深さ、舌状花の横断面の形、花盤の有無、花盤の直径、花盤の色、花柄の長さ、開花期	なし 

1. 区分を新設するもの

めぎ

(学名: Berberis L.)

改 正 案	現 行
樹勢、樹姿、新しうの色、落葉性、葉群の主な色、葉群の二次色の有無、葉群の二次色の型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の波打ちの有無、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの多少、葉の切れ込みの深さ、葉の光沢の有無、葉の光沢の強弱、葉の裏面の冬季の色、葉針の有無、葉針の形、葉針の型、葉針の長さ、つぼみの外面の赤色の有無、開花盛期、花序の型、一花序の花数、花の色、花弁の先端の形、結実性、果実の形、果実の先端の形、果実の色、果実のろう質の有無、果実の種子形成の有無、開花習性	なし 

1. 区分を新設するもの

おおしまこばんのき

(学名: Breynia J. R. Forst. Et. G. Forst. Nom. Cons.)

改 正 案	現 行
樹姿、分枝の数、一次分枝の長さ、一次分枝の幅、二次分枝の長さ、二次分枝の太さ、二次分枝の色、葉の数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色数、葉身の斑の主な色、葉身の斑の二次色、新葉のアントシアニン着色の強弱、新しうの新葉の色	なし 

1. 区分を新設するもの

ふじうつぎ

(学名: Buddleja L.)

改 正 案	現 行
樹姿、樹高、樹幅、樹幅に対する樹高、枝の長さ、枝の太さ、枝の色、枝の横断面の形、枝の毛の粗密、葉身の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）、葉身の周縁部の形、葉身の表面の毛の多少、葉身の裏面の毛の有無、葉身の葉脈間の凹凸の強弱、花序の形、花序の長さ、花序の幅、小花の粗密、がくの長さ、がくの毛の多少、花筒の外面の主な色、花冠の直径、花冠裂片の向き、花冠裂片の重なり、花冠裂片の周縁部の切れ込みの深さ、花冠裂片の表面の色、花冠の目の有無、花冠の目の色、開花始期	なし 

1. 区分を新設するもの

ひとつばたご

(学名: Chionanthus L.)

改 正 案	現 行
樹型、樹高、新しょうの長さ、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の光沢の有無、葉縁の形、葉柄の長さ、葉柄基部のアントシアニン着色の濃淡、花序の着生位置、花序の向き、花序の数、小花序の数、花序の長さ、花序の幅、一花序当たりの花数、小花柄の長さ、花冠の高さ、花冠の幅、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、花冠裂片基部の着色の有無	なし 

1. 区分を新設するもの

ディギタリス

(学名: Digitalis R.)

改 正 案	現 行
草丈、株幅、花茎の数、茎の太さ、茎の毛の多少、節間長、一次分枝の多少、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉身の先端の形、葉縁の形、葉身の毛の多少、花序の長さ、花序の幅、花序の花の粗密、花柄の長さ、花の向き、花の長さ、がくの長さ、がく裂片の幅、花冠の縦径、花冠の横径、花筒の縦径、花筒の横径、下唇弁の中央裂片の長さ、花冠の外面上部の主な色、花冠の内面下部の色数、花冠の内面下部の主な色、花冠の内面下部の二次色の模様、花冠の内面下部の二次色、花冠の内面下部の三次色の模様、花冠の内面下部の三次色、花冠の外面の毛の多少、下唇弁の中央裂片表面の毛の多少、開花期	なし 

1. 区分を新設するもの

ディオニシア アレティオイデス

(学名: *Dionysia aretioides* (Lehm.) Boiss.)

改 正 案	現 行
草丈、株幅、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の毛の有無、葉の毛の多少、葉の周縁部の反転の強弱、葉の周縁部の鋸歯の有無、ほう葉の長さ、花の直径、花の長さ、花冠裂片の重なり、花冠裂片の形、花冠裂片の反転の強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の縁部の色、花冠裂片の表面の中央部の色、花冠裂片の表面の基部の色、花冠裂片の先端の切れ込みの有無、花冠裂片の先端の切れ込みの数、花冠筒部の太さ、花冠筒部の外面の色、開花始期	なし 

1. 区分を新設するもの

エキナケア

(学名：Echinacea Moench)

改 正 案	現 行
草姿、草丈、多花性、株の粗密、茎の色、葉の数、葉の長さ(葉柄を含む。)、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の最大幅の位置、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の分布、葉のしわ、葉の光沢、葉の周縁部の鋸齒、花柄の色、花柄の毛の粗密、頭花の直径、頭花の高さ、頭花の舌状花卉の数、頭花の舌状花の基部の向き、頭花の舌状花卉の相対的な数、頭花のさじ状花卉の相対的な数、頭花の管状花卉の相対的な数、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の外面の色(さじ状花卉、管状花卉に限る。)、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面の二次色の分布、舌状花の曲り、舌状花のねじれ、舌状花の横断面の形、舌状花の先端部の形、舌状花の先端の切れ込み、花盤の型、花盤の直径(デージー型の品種に限る。)、花盤の直径(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の高さ(デージー型の品種に限る。)、花盤の高さ(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の高さ／幅(デージー型の品種に限る。)、花盤の高さ／幅(アネモネ型の品種に限る。)、頭花の直径に対する花盤の直径、花盤の鱗片の色(デージー型の品種に限る。)、花盤の鱗片の二次色(デージー型の品種に限る。)、花盤の小花の開やく前の花盤の色(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の小花の開やく時の花盤の色(アネモネ型の品種に限る。)、花盤内に生じた舌状花卉の有無(デージー型の品種に限る。)、花盤内に生じた舌状花卉の数(花盤に舌状花卉を有するデージー型の品種に限る。)、花盤の小花の長さ(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の小花の幅(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の小花の反り(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の小花の筒部の長さ(アネモネ型の品種に限る。)、花盤の小花の先端の切れ込み(アネモネ型の品種に限る。)、花色の移行性	なし



1. 区分を新設するもの

ウラルかんぞう

(学名: Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC.)

改 正 案	現 行
草丈、根の数、根の太さ、根の表皮の色、根の横断面の黄色系着色の強弱、茎の数、茎の太さ、節数、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の粗密、分枝の数、葉柄の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の波打ちの強弱、小葉の数、小葉の葉身の長さ、小葉の葉身の幅、小葉の葉身の長さ／幅、花序の数、花序の長さ、花序の幅、小花の数、小花の長さ、小花の幅、花の色、さやの幅、種子の粒数、萌芽の早晩性、開花の早晩性、枯れ上がりの早晩性、乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量	なし 

1. 区分を新設するもの

アジアわた

(学名: *Gossypium arboreum* L.)

改 正 案	現 行
草姿、草丈、最下結果枝の着生位置、結果枝の長さ、結果枝の節数、結果枝の節間長、茎のアントシアニン着色の強弱、茎上部の毛の多少、葉の粗密、葉身の長さ、葉身の幅、葉の裂片の深さ、葉の緑色の濃淡、葉の裏面の毛の多少、葉の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、葉身の蜜腺の有無、花の着き方、花卉の色、花卉のスポットの有無、花粉の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭基部のアントシアニン着色の有無、果柄の長さ、さく果に対するほう葉の大きさ、ほう葉の鋸歯の細かさ、ほう葉のアントシアニン着色の有無、さく果の大きさ、さく果の縦断面の形、さく果の表面のくぼみの細かさ、さく果の先端の突出の強弱、さく果の開じょの強弱、百粒重、種子の地毛の色、種子の地毛の粗密、繰綿の実綿に対する重さの割合、繊維の色、繊維の長さ(繊維用品種に限る。)、繊維の長さの一様性(繊維用品種に限る。)、繊維の強さ(繊維用品種に限る。)、繊維の伸長率(繊維用品種に限る。)、繊維の細かさ(繊維用品種に限る。)、開花始期、さく果の開じょ期	なし 

1. 区分を新設するもの

クニフォフィア

(学名：Kniphofia Moench)

改 正 案	現 行
草丈、葉の展開状態、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の表面の色、葉の横断面の形、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の色、花序の葉に対する位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の花の粗密、未熟なつぼみの主な色、開花直前のつぼみの主な色、花被の色の変化の有無、花被の向き、花被の長さ、花被の筒部の直径、花被の長さ／花被の筒部の直径、花被の筒部の外面の色、花被の裂片の湾曲、花糸の色、花被の長さに対する雄ずいの長さ	なし 

1. 区分を新設するもの

ロブラリア

(学名 : Lobularia Desv.)

改 正 案	現 行
草丈、株幅、茎の分枝の粗密、茎の基部の太さ、茎の色、茎の毛の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の周縁の形、葉の先端の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の有無、花序の直径、花序の小花数、小花の直径、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニン着色の有無、がく片の形、がく片の緑色の濃淡、がく片のアントシアニン着色の有無、がく片の毛の有無、花卉の長さ、花卉の幅、花卉の形、開花初期の花弁の色、開花盛期の花弁の色	なし 

1. 区分を新設するもの

マルコミア マリティマ

(学名 : Malcolmia maritima (L.) R. Br.)

改 正 案	現 行
草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の多少、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉表面の緑色の濃淡、葉身の形、葉縁の切れ込みの深さ、葉身の長さ、葉身の幅、がくの色、花の直径、花の目の有無、花弁の形、花弁先端の切れ込みの深さ、花弁表面の主な色、花弁表面の二次色、開花後期の花弁表面の主な色、開花後期の花弁表面の脈の明瞭度	なし 

1. 区分を新設するもの

オリガナム ロツンディフォリウム

(学名: Origanum rotundifolium Boiss.)

改 正 案	現 行
草姿、茎の長さ、分枝の数、最長分枝の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の表面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉の向き、花穂の数、花穂の長さ、花穂の幅、ほう葉の数、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉のアントシアニン着色の強弱、一ほう葉当たりの小花数、小花の長さ、小花の雄ずいの露出の有無、小花の主な色、花穂の香りの強弱、開花期	なし 

1. 区分を新設するもの

セドウム ブリト

(学名: Sedum burrito Moran、Sedum morganianum Walth.)

改 正 案	現 行
茎の長さ、茎の太さ、葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の先端の形、新葉の表面の色、葉の表面の色	なし 

1. 区分を新設するもの

ふゆさんご

(学名：Solanum pseudocapsicum L.)

改 正 案	現 行
樹高、樹幅、樹高に対する樹幅、茎の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の長さに対する幅、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の表面の凹凸の強弱、葉の地色、葉の斑の有無、葉の斑の主な色、葉の斑の二次色、花冠の直径、花冠裂片の表面の主な色、幼果の主な色、幼果の模様の有無、幼果の模様の色、果実の長さ、果実の直径、果実の長さに対する直径、果実の主な色、果柄の長さ、へたの直径	なし 

1. 区分を新設するもの

おおでまり

(学名: *Viburnum plicatum* Thunb.)

改 正 案	現 行
樹姿、樹高、樹幅、枝の毛の粗密、枝のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の鋸歯の粗密、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の表面の光沢の有無、葉身の横断面の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、花序の高さ、花序の幅、花序の形、花の性型、両性花の数、両性花の色、装飾花の数、装飾花の花冠裂片の形、装飾花の花冠裂片の重なり、装飾花の直径、装飾花の花冠裂片の主な色、装飾花の花冠裂片の二次色の有無、装飾花の花冠裂片の二次色、装飾花の花冠裂片の二次色の分布、装飾花の花冠裂片の花色の移行性、装飾花の開花終期の花冠裂片の色（花色の移行性を有する品種に限る。）、装飾花の花冠裂片の切れ込みの有無、装飾花の花冠裂片の対称性、装飾花の花冠裂片の横断面の形、開花始期、果実の長さ、果実の幅、果実の形、果実の色	なし 

1. 区分を新設するもの

せいようにんじんぼく

(学名 : Vitex agnus-castus L.)

改 正 案	現 行
樹姿、樹高、株幅、枝の太さ、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニン着色の強弱、小葉の数、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、花序の長さ、花序の幅、中心花房の長さ、中心花房の幅、花の直径、がくのアントシアニン着色の強弱、花冠裂片の反転の強弱、花冠裂片の主な色、花冠裂片の模様の有無、花冠裂片の模様の色、花筒の長さ、開花期	なし 

2. UPOVTG(テストガイドライン)に準拠した改正を行うもの

- ① グラジオラス
- ② ホイヘラ(つぼさんご)
- ③ オンシジウム
- ④ ファレノプシス



グラジオラス

(学名 : Gladiolus L.)

改 正 案	現 行
草丈、葉群の高さ、葉の幅、葉の上半分の曲がりの強弱、花序の側枝の有無、花穂の長さ、一花穂の花数、一花穂の同時開花数、花穂の節間の長さ、花穂の花の配列、ほうの先端の形、ほうのアントシアニン着色の強弱、花の正面の形、花の向き、花の幅、花の主な色、花の主な色の濃淡の変化、花被筒部の長さ、花被筒部の内面の斑点の数、花被筒部の内面の斑点の分布、花被喉部の外面の斑点の数、花被喉部の外面の斑点の色、外花被片の形、外花被片の周縁部の波打ちの強弱、内花被片の周縁部の波打ちの強弱、内花被片の条線の有無、内花被片の条線の長さ、内花被片の条線の幅、内花被片の条線の色、内花被片の斑紋の有無、内花被片の斑紋の位置、内花被片に占める斑紋の大きさ、内花被片の斑紋の形、内花被片の斑紋の主な色、内花被片の斑紋の二次色、内花被片の斑紋の周縁の形、内花被片の周縁部の複色の有無、内花被片の周縁部の複色の幅、内花被片の周縁部の複色の境界の形、内花被片の周縁部の色、中央内花被片の向き、中央内花被片の先端の向き、花系の主な色、花系の基部の小斑点の有無、花系の主な色と比較した先端部の色、やく隔の色、やくの口辺細胞の色、花柱の主な色、花柱の基部の色、花柱の分枝の色、球茎の肉の色、開花始期	一 草型及び草丈 二 球茎の形、球茎の大きさ、球茎の色、茎の太さ、茎の色、葉形、葉の大きさ、葉色及び葉の厚さ 三 花穂の形、花形、花の大きさ、花色、花被片の形、花被片の大きさ、花柱の形、花柱の色、雄ずいの形、雄ずいの色、やくの色、しょう包の形、しょう包の長さ、しょう包の色、花穂の長さ、一花穂の花数、花柄の太さ及び花柄の長さ 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

2. UPOVTGに準拠改正するもの

ホイヘラ(つぼさんご)

(学名 : Heuchera L., × Heucherella H. R. Wehrh.)

改 正 案	現 行
草丈、株幅、葉の粗密、若葉の葉身の色1、若葉の葉身の色1の分布、若葉の葉身の色1の模様、若葉の葉身の色1の面積、若葉の葉身の色2、若葉の葉身の色2の分布、若葉の葉身の色2の模様、若葉の葉身の色2の面積、若葉の葉身の色3、若葉の葉身の色3の分布、若葉の葉身の色3の模様、若葉の葉身の色3の面積、若葉の葉身の色4、若葉の葉身の色4の分布、若葉の葉身の色4の模様、若葉の葉身の色4の面積、葉柄の長さ、葉柄の毛の粗密、葉柄の主な色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の先端部の形、葉身裂片の切れ込みの深さ、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ(ホイヘラ属に限る。)、葉身の周縁部の欠刻の数、葉身の周縁部の欠刻の深さ、葉身の周縁部の波打ちの強弱、葉身のしわ、葉身の光沢、葉身の毛の粗密、葉身の裏面の毛の粗密、葉身の色1、葉身の色1の分布、葉身の色1の模様、葉身の色1の面積、葉身の色2、葉身の色2の分布、葉身の色2の模様、葉身の色2の面積、葉身の色3、葉身の色3の分布、葉身の色3の模様、葉身の色3の面積、葉身の色4、葉身の色4の分布、葉身の色4の模様、葉身の色4の面積、葉身の裏面の色、花茎の向き、花茎の長さ、花茎の主な色、花茎の花の着生する部位の長さ、花茎の花の着生する部位の幅、花茎の花の着生する部位の長さ／幅、花茎の花の粗密、つぼみの色、花の向き、花の長さ、花の幅、花の外面の色、花弁の表面の色(ホイヘラ属に限る。)	一 草姿及び草丈 二 茎の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、ねん性(不ねん現象のあるものに限る。)、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあっては根の形状、主に食用としてデンプン源、タンパク源等として使用するものにあっては収量性、台木用品種にあっては接ぎ木特性



2. UPOVTGに準拠改正するもの

オンシジウム

(学名 : Oncidium Group)

改 正 案	現 行
植物体の大きさ、葉の向き、ぎ球茎の大きさ、ぎ球茎の縦断面の形、ぎ球茎の横断面の形、ぎ球茎の下位葉の数、ぎ球茎の上位葉の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の横断面の形、葉の表面の緑色の濃さ、花序の型、花序の長さ、花序の幅、花序の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花のセパルの湾曲、花のペタルの湾曲、花の縦径、花の横径、花の香り、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの形、ドーサルセパルの縦断面の形、ドーサルセパルの横断面の形、ドーサルセパルの周縁の波打ち、ドーサルセパルの地色、ドーサルセパルの覆色のぼかしの色、ドーサルセパルの斑点の数、ドーサルセパルの斑点の大きさ、ドーサルセパルの斑点の色、ドーサルセパルの横縞の数、ドーサルセパルの横縞の分布、ドーサルセパルの横縞の色、ドーサルセパルの縦縞の色、ドーサルセパルの覆輪の幅、ドーサルセパルの覆輪の色、ドーサルセパルの基部斑の大きさ、ドーサルセパルの基部斑の色、ラテラルセパルの長さ、ラテラルセパルの幅、ラテラルセパルの形、ラテラルセパルの縦断面の形、ラテラルセパルの横断面の形、ラテラルセパルのねじれ、ラテラルセパルの周縁の波打ち、ラテラルセパルの地色、ラテラルセパルの覆色のぼかしの色、ラテラルセパルの斑点の数、ラテラルセパルの斑点の大きさ、ラテラルセパルの斑点の色、ラテラルセパルの横縞の数、ラテラルセパルの横縞の分布、ラテラルセパルの横縞の色、ラテラルセパルの縦縞の色、ラテラルセパルの覆輪の幅、ラテラルセパルの覆輪の色、ラテラルセパルの基部斑の大きさ、ラテラルセパルの基部斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの形、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれ、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの地色、ペタルの覆色のぼかしの色、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの横縞の数、ペタルの横縞の分布、ペタルの横縞の色、ペタルの縦縞の色、ペタルの覆輪の幅、ペタルの覆輪の色、ペタルの基部斑の大きさ、ペタルの基部斑の色、リップの長さ、リップの幅、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさ、リップの周縁の波打ち、リップの中央裂片の形、リップの中央裂片の切れ込み、リップの中央裂片の縦断面の形、リップの中央裂片の横断面の形、リップの中央裂片の地色、リップの中央裂片の覆色のぼかしの色、リップの中央裂片の斑点の色、リップの中央裂片の横縞の色、リップの中央裂片の覆輪の色、リップの側裂片の地色、リップのカルスの色、リップのカルス周辺の色	一 草型 二 ギ球茎の形、ギ球茎の大きさ、ギ球茎の色、葉の向き、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ及び葉数 三 花房の形、花房の大きさ、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の強さ、花茎の色、花茎の抽出角度及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

2. UPOVTGに準拠改正するもの

ファレノプシス

(学名 : Phalaenopsis Blume)

改 正 案	現 行
植物体の長さ、植物体の花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の先端の対称性、葉の向き、葉の斑の有無、葉の表面の斑点の有無、葉の表面の主な色、葉の表面のアントシアニンの着色、花序の型、花序の長さ、花序の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花の側面の形、花の縦径、花の横径、花のペタルの配列、花の香り、ドーサルセパルの長さ、ドーサルセパルの幅、ドーサルセパルの形、ドーサルセパルの最大幅の位置、ドーサルセパルの縦断面の形、ドーサルセパルの横断面の形、ドーサルセパルのねじれの有無、ドーサルセパルの周縁の波打ち、ドーサルセパルの表面の地色、ドーサルセパルの覆色、ドーサルセパルの斑点の数、ドーサルセパルの斑点の大きさ、ドーサルセパルの斑点の色、ドーサルセパルの縞斑の数、ドーサルセパルの縞斑の色、ドーサルセパルの網斑の密度、ドーサルセパルの網斑の色、ラテラルセパルの表面の地色、ラテラルセパルの覆色、ラテラルセパルの斑点の数、ラテラルセパルの斑点の色、ラテラルセパルの縞斑の数、ラテラルセパルの縞斑の色、ラテラルセパルの網斑の密度、ラテラルセパルの網斑の色、ペタルの長さ、ペタルの幅、ペタルの正面の形、ペタルの最大幅の位置、ペタルの縦断面の形、ペタルの横断面の形、ペタルのねじれの有無、ペタルの周縁の波打ち、ペタルの表面の地色、ペタルの覆色、ペタルの覆色の面積、ペタルの斑点の数、ペタルの斑点の大きさ、ペタルの斑点の色、ペタルの縞斑の数、ペタルの縞斑の色、ペタルの網斑の密度、ペタルの網斑の色、リップの中央裂片の長さ、リップの中央裂片の幅、リップの中央裂片の形、リップのヒゲの有無、リップのヒゲの長さ、リップの中央裂片の突起又は稜、リップの側裂片の形、リップの側裂片の巻き込み、リップの側裂片の大きさ、中央裂片の地色、中央裂片の覆色、中央裂片の斑点の数、中央裂片の斑点の大きさ、中央裂片の斑点の色、中央裂片の縞斑の数、中央裂片の縞斑の色、中央裂片の網斑の密度、中央裂片の網斑の色、側裂片の地色、側裂片の覆色、側裂片の斑点の数、側裂片の斑点の色、側裂片の縞斑の数、側裂片の縞斑の色、側裂片の網斑の密度、側裂片の網斑の色、リップのカルス、カルスの色、カルスの毛の有無、ずい柱の色	一 草型 二 ギ球茎の形、葉の向き、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ及び葉数 三 花房の形、花房の大きさ、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花弁の厚さ、一花茎の花数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の強さ、花茎の色、花茎の分枝性、花茎の抽出角度及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

3. UPOVTG(テストガイドライン)にない植物種類の審査基準の作成・改正に伴い改正を行うもの

- ① シクラメン
- ② 桑
- ③ ロスマリヌス(ローズマリー)

3. UPOVTGにない種類で改正するもの

シクラメン

(学名：Cyclamen L.)

改 正 案	現 行
草型、葉の数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の先端の形、葉縁の欠刻、葉縁の波打ちの強弱、葉身の裏面のアントシアニンの着色、葉身の表面の地色、葉身の表面の模様の有無、葉身の模様の明瞭度、葉身の模様の型、葉柄の長さ、葉柄の太さ、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎のアントシアニンの着色、花茎の結実後の回旋性、花の型、花の香り、花弁の数、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の縁の欠刻の有無、花弁の縁の欠刻の数、花弁の縁の欠刻の深さ、花弁の縁の波打ちの有無、花弁の縁の波打ちの強弱、花弁の反転、花弁のねじれ、花弁の模様の有無、花弁の模様のタイプ、花弁の模様の割合、花弁先端の色、花弁中央部の色、花弁基部の色、花弁の表面の突起の有無、がく片の弁化、がく片の裏面の色、開花習性	一 草型及び草丈 二 塊茎の形、塊茎の大きさ、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢、葉の厚さ、葉数、葉柄の長さ、葉柄の太さ及び葉柄の色 三 花形、花の大きさ、花色、がくの形、がくの大きさ、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の色、花の香り及び花数 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

3. UPOVTGにない種類で改正するもの

桑

(学名: Morus L.)

改 正 案	現 行
倍数性、樹勢、刈桑樹型、冬芽の形、冬芽の大小、冬芽の色、副芽の多少、枝条数、枝の揃い、側枝数、矮小枝条の数、枝条の長さ、枝条の太さ、枝条の色、枝の屈曲の強弱、節間長、葉序、葉の着生角度、葉身の欠刻の数、葉身の欠刻の深さ、葉身の大きさ、葉身の先端の形、葉身の鋸歯の形、葉身の基部の形、葉身の表面の色、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の厚さ、葉柄の長さ、花性、雌花穂の多少、花柱の長さ、果実の縦径(果実用品種に限る。)、果実の横径(果実用品種に限る。)、果実の形(果実用品種に限る。)、果実の重さ(果実用品種に限る。)、果実の色(果実用品種に限る。)、着果数、果柄の長さ(果実用品種に限る。)、種子の大きさ(果実用品種に限る。)、発芽の早晚、再発芽力、枝条の伸長停止期、さし木の発根力、枝条の先枯れの多少、耐倒伏性、胴枯病抵抗性、縮葉細菌病抵抗性、萎縮病抵抗性、裏うどんこ病抵抗性、菌核病抵抗性(果実用品種に限る。)、春蚕期の収葉量(果実用品種を除く。)、夏秋蚕期の収葉量(果実用品種を除く。)、春蚕期の新しょう割合(果実用品種を除く。)、夏秋蚕期の葉量割合(果実用品種を除く。)、芽のすそ上り、葉のこき取りの難易、葉の硬化の早晚、飼料価値(蚕飼料用品種に限る。)、開花期(果実用品種に限る。)、成熟期(果実用品種に限る。)、糖度(果実用品種に限る。)、酸度(果実用品種に限る。)	一 樹姿及び樹勢 二 発芽の早晚、不発芽割合、花芽の多少、芽色、芽のすそ上り、再発芽性及び芽の着生状態 三 葉形、葉の大きさ、葉の厚さ、葉色、葉の光沢、葉の硬化の早晚、葉のこきとりの難易、葉の粗滑及び着葉角度 四 樹色、枝条長、枝条数、枝条の径、枝条の曲直、枝のそろい、側枝の多少及び節間長 五 果形、果実の大きさ、果実の色、甘味及び酸味 六 開花期、果実の成熟期、発根性、耐寒性、耐干性、耐倒伏性、蚕期別収葉量、蚕期別葉量割合、葉質、病害抵抗性及び虫害抵抗性 

3. UPOVTGにない種類で改正するもの

ロスマリヌス(ローズマリー)

(学名: Rosmarinus L.)

改 正 案	現 行
樹姿、樹高、株幅、葉群の粗密、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、展開直後の新葉表面の色、葉の表面の色、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の種類(斑のある品種に限る。)、葉の表面の斑の色(斑のある品種に限る。)、葉の表面の光沢の有無、葉の表面の粗滑、葉の湾曲の向き、葉の湾曲の強弱、葉の周縁部の反転の強弱、がくの大きさ、がくの形、がくのアントシアニン着色の有無、花の着き方、花冠の長さ、花冠の幅、花冠の下唇弁の地色、花冠の下唇弁の濃色模様の色、花柱の長さ、雄ずいと比較した花柱の長さ、花柱の色、開花習性、開花期	一 樹姿及び樹高 二 枝の長さ、分枝性、葉形、葉の大きさ及び葉色 三 花の大きさ、花色、花数及び花の着生位置 四 開花期、香気、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 五 成分 

4. 1～3の改正後の運用の結果等所要の修正を行うもの

- | | |
|-------------|------------------|
| ① めかぼ | ⑧ ニューギニアインパチェンス |
| ② 茶 | ⑨ ラウアンドウラ(ラベンダー) |
| ③ オーチャードグラス | ⑩ リモニウム(旧スターチス) |
| ④ トールフェスク | ⑪ オステオスペルマム |
| ⑤ メドウフェスク | ⑫ つつじ |
| ⑥ フェストロリウム | ⑬ なす(トマト、ペピーノ、ふゆ |
| ⑦ 大麦 | さんご及びばれいしょを除く。) |

4. 運用の結果、修正するもの

ぬかぼ

(学名 : Agrostis L.)

改 正 案	現 行
倍数性、は種年の秋の草姿、は種年の秋の株幅、は種年の秋の葉の色、は種年の秋の葉の幅、は種年の開花性、春の生長開始時期、出穂期、止め葉の長さ、止め葉の幅、 <u>草丈</u> 、 <u>最長茎の長さ</u> 、 <u>茎の太さ</u> 、 <u>茎の上部の節間長</u> 、 <u>穂の長さ</u> 、 <u>緑度保持力</u>	倍数性、は種年の秋の草姿、は種年の秋の株幅、は種年の秋の葉の色、は種年の秋の葉の幅、は種年の開花性、春の生長開始時期、出穂期、止め葉の長さ、止め葉の幅、最長茎の長さ、 <u>茎の上部の節間長</u> 、 <u>花序の長さ</u>



4. 運用の結果、修正するもの

茶

(学名 : Camellia sinensis (L.) Kuntze [Thea sinensis L.])



改 正 案	現 行
樹勢、樹型、樹姿、分枝の粗密、枝の屈曲の有無、ほう芽期(一番茶)、 <u>一心一葉始期、一心三葉期の第三葉の色</u> 、新芽の毛じの有無、新芽の毛じの粗密、新芽の葉柄基部のアントシアニン着色の有無、 <u>一心三葉期の新芽長</u> 、摘採期(一番茶)、摘採期の茶芽の芽数、枝条の太さ、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の横断面の形、葉身の表面のしわの強弱、葉身の先端の形、葉の周縁部の波打ちの強弱、葉の周縁部の鋸歯の強弱、葉身の基部の形、開花期、花柄の長さ、がくの外面の毛じの有無、がくの外面のアントシアニン着色の有無、花の直径、内花卉の色、子房の毛じの有無、子房の毛じの粗密、花柱の長さ、花柱の分岐点の位置、雄ずいに対する柱頭の位置、発酵性、カフェイン含量	樹勢、樹型、樹姿、分枝の粗密、枝の屈曲の有無、ほう芽期(一番茶)、 <u>一芯一葉期、一芯三葉期の第三葉の色</u> 、新芽の毛じの有無、新芽の毛じの粗密、新芽の葉柄基部のアントシアニン着色の有無、 <u>一芯三葉期の新芽長</u> 、摘採期(一番茶)、摘採期の茶芽の芽数、枝条の太さ、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の横断面の形、葉身の表面のしわの強弱、葉身の先端の形、葉の周縁部の波打ちの強弱、葉の周縁部の鋸歯の強弱、葉身の基部の形、開花期、花柄の長さ、がくの外面の毛じの有無、がくの外面のアントシアニン着色の有無、花の直径、内花卉の色、子房の毛じの有無、子房の毛じの粗密、花柱の長さ、花柱の分岐点の位置、雄ずいに対する柱頭の位置、発酵性、カフェイン含量

オーチャードグラス

(学名：Dactylis glomerata L.)

改 正 案	現 行
倍数性、春の草勢、秋の草勢、 <u>出穂期の草姿</u> 、 <u>最長稈の長さ</u> 、 <u>上部の節間長</u> 、 <u>葉の緑色の濃淡</u> 、 <u>春化前の分けつ期の葉の密度</u> 、 <u>止め葉の長さ</u> 、 <u>止め葉の幅</u> 、 <u>穂の長さ</u> 、 <u>春化前</u> の出穂性、 <u>春化後</u> の出穂期、 <u>出穂期の茎数</u> 、 <u>越冬性</u> 、 <u>すじ葉枯病抵抗性</u> 、 <u>うどんこ病抵抗性</u> 、 <u>雪腐大粒菌核病抵抗性</u> 、 <u>雪腐黒色小粒菌核病抵抗性</u>	倍数性、春の草勢、秋の草勢、 <u>草姿</u> 、 <u>最長稈の長さ</u> 、 <u>上部の節間長</u> 、 <u>葉の緑色の濃淡</u> 、 <u>春化前の栄養生長期の葉の密度</u> 、 <u>止葉の長さ</u> 、 <u>止葉の幅</u> 、 <u>穂の長さ</u> 、 <u>春化前</u> の出穂性、 <u>春化後</u> の出穂期、 <u>出穂期の茎数</u> 、 <u>越冬性</u> 、 <u>すじ葉枯病抵抗性</u> 、 <u>うどんこ病抵抗性</u> 、 <u>雪腐大粒菌核病抵抗性</u> 、 <u>雪腐黒色小粒菌核病抵抗性</u>
	

4. 運用の結果、修正するもの

トールフェスク

(学名 : Festuca arundinacea Schreb.)

改 正 案	現 行
倍数性、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の粗剛度、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、 <u>春化前の出穂性</u> 、春化後の草高、 <u>春化後の出穂期</u> 、出穂期の草姿、出穂期の草高、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂の長さ	倍数性、葉身の幅、葉の緑色の濃淡、葉の粗剛度、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、 <u>秋の出穂性</u> 、春化後の草高、 <u>出穂期</u> 、出穂期の草姿、出穂期の草高、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂の長さ
	

メドウフェスク

(学名 : Festuca pratensis Huds.)

改 正 案	現 行
倍数性、 <u>分けつ期の草姿</u> 、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、葉の緑色の濃淡、草丈、 <u>春化前の出穂性</u> 、春化後の草高、 <u>春化後の出穂期</u> 、出穂期の草姿、出穂期の草高、 <u>出穂期の茎の数</u> 、茎の長さ、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂数、穂の長さ	倍数性、 <u>栄養生長期の草姿</u> 、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、葉の緑色の濃淡、草丈、 <u>秋の出穂性</u> 、春化後の草高、 <u>出穂期</u> 、出穂期の草姿、出穂期の草高、 <u>茎の数</u> 、茎の長さ、最長稈の長さ、止め葉の長さ、止め葉の幅、穂数、穂の長さ
	

フェストロリウム

(学名：× Festulolium Aschers. et Graebn.)

改 正 案	現 行
倍数性、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、春化前の草姿、葉の長さ、葉の幅、春化後の株幅、春化後の草姿、春化後の草高、出穂期、出穂期の草高、止め葉の長さ、止め葉の幅、最長稈の長さ、上部の節間長、穂の長さ、 <u>けい光反応性</u>	倍数性、春の草勢、夏の草勢、秋の草勢、春化前の草姿、葉の長さ、葉の幅、春化後の株幅、春化後の草姿、春化後の草高、出穂期、出穂期の草高、止め葉の長さ、止め葉の幅、最長稈の長さ、上部の節間長、穂の長さ 

4. 運用の結果、修正するもの



大麦

(学名 : Hordeum L.)

改 正 案	現 行
草姿、稈の長さ、葉しょうの毛の有無、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱、植物体の反曲した止め葉の多少、止め葉の葉しょう表面のろう質の多少、出穂期、芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性、穂のろう質の多少、穂の向き、草丈、穂の条数、穂の形、穂の粒着の粗密、穂の長さ、芒の長さ、穂軸の長さ、穂軸の曲がりの強弱、穂の不稔小穂の発育、不稔小穂の向き、 <u>穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ</u> 、穀粒の小穂軸の毛の型、穀粒の稃の有無、穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少、穀粒の縦溝の毛の有無、穀粒のりん皮の着き方、穀粒の糊粉層の色、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重(原麦粒)、まき性、穀粒硬度、麦芽エキスの多少(ビール用品種に限る。)、コールバツハ数(ビール用品種に限る。)、ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ(lox)活性の有無、βグルカン含量、D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現、C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現、B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現	草姿、稈の長さ、葉しょうの毛の有無、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱、植物体の反曲した止め葉の多少、止め葉の葉しょう表面のろう質の多少、出穂期、芒の先端のアントシアニン着色の強弱、開閉花受粉性、穂のろう質の多少、穂の向き、草丈、穂の条数、穂の形、穂の粒着の粗密、穂の長さ、芒の長さ、穂軸の長さ、穂軸の曲がりの強弱、穂の不稔小穂の発育、不稔小穂の向き、 <u>穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ</u> 、穀粒の小穂軸の毛の型、穀粒の稃の有無、穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱、穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少、穀粒の縦溝の毛の有無、穀粒のりん皮の着き方、穀粒の糊粉層の色、うるち・もちの別、穂発芽性、千粒重(原麦粒)、まき性、穀粒硬度、麦芽エキスの多少(ビール用品種に限る。)、コールバツハ数(ビール用品種に限る。)、ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)、穀粒のプロアントシアニジンの有無、穀粒のリポキシゲナーゼ(lox)活性の有無、βグルカン含量、D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現、C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現、B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現

4. 運用の結果、修正するもの

ニューギニアインパチェンス

(学名 : Impatiens New Guinea Group)

UPOVテストガイドラインの改正に伴い改正するもの



改 正 案	現 行
葉部の高さ、 <u>株幅</u> 、茎のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色(斑入り品種に限る。)、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の葉脈間の色、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱(裏面の色が赤の品種に限る。)、葉身の裏面の葉脈の色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の表面の主な色、花の表面の二次色(2色以上の品種に限る。)、花の表面の二次色の分布(2色以上の品種に限る。)、花の目の有無、花の目の大きさ、花の目の主な色、花の上弁の幅(一重品種に限る。)、花の側弁の幅(一重品種に限る。)、花の下弁の長さ(一重品種に限る。)、 <u>花の下弁の切れ込み(一重品種に限る。)</u> 、 <u>距の曲がりの強弱</u>	葉部の高さ、 <u>株の幅</u> 、茎のアントシアニン着色の強弱、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色(斑入り品種に限る。)、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱、葉身の裏面の葉脈間の色、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱(裏面の色が赤の品種に限る。)、葉身の裏面の葉脈の色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニン着色の強弱、花型、花の幅、花の色数、花の表面の主な色、花の表面の二次色(2色以上の品種に限る。)、花の表面の二次色の分布(2色以上の品種に限る。)、花の目の有無、花の目の大きさ、花の目の主な色、花の上弁の幅(一重品種に限る。)、花の側弁の幅(一重品種に限る。)、花の下弁の長さ(一重品種に限る。)

ラウアンドウラ(ラベンダー)

(学名 : Lavandula L.)



改 正 案	現 行
樹姿、株の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の灰色の強弱、花茎の伸長方向、株の枝の粗密、<u>葉の長さ、葉の幅</u> (Pterostoechas節を除く。)、<u>葉の幅</u> (Pterostoechas節に限る。)、<u>葉の周縁の切れ込み、葉の斑の有無、葉の斑の分布、葉の斑の色</u>、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の緑色の濃淡、花茎の基部の強さ (Lavandula節に限る。)、<u>花茎の毛の粗密</u> (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)、花茎の分枝の有無、花茎の分枝数、花茎の最長分枝の長さ、花穂の最大幅、花穂の長さ、花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)、花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)、花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)、花穂の形、花穂の花の数、花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)、<u>ほう葉の幅、ほう葉の色</u> (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)、<u>小ほう葉の有無</u> (Lavandula節に限る。)、<u>小ほう葉の長さ</u> (Lavandula節に限る。)、先端ほう葉の有無、先端ほう葉の長さ (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の形 (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の主な色 (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱 (Stoechas節に限る。)、<u>がくの色、がくの毛の粗密、花冠の色数、花冠の主な色、花冠の二次色、花冠の二次色の分布</u>、開花始期	樹姿、株の大きさ、葉の緑色の濃淡、葉の灰色の強弱、花茎の伸長方向、株の枝の粗密、<u>葉の周縁の切れ込みの有無、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の緑色の濃淡、花茎の基部の強さ</u> (Lavandula節に限る。)、<u>花茎の毛の粗密</u> (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)、花茎の分枝の有無、花茎の分枝数、花茎の最長分枝の長さ、花穂の最大幅、花穂の長さ、花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)、花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)、花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)、花穂の形、花穂の花の数、花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)、<u>ほう葉の幅、ほう葉の色</u> (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)、<u>ほう葉の有無</u> (Lavandula節に限る。)、<u>小ほう葉の長さ</u> (Lavandula節に限る。)、先端ほう葉の有無、先端ほう葉の長さ (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の形 (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の主な色 (Stoechas節に限る。)、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱 (Stoechas節に限る。)、<u>がくの色、がくの毛の粗密、花冠の主な色、開花始期</u>

リモニウム(旧スターチス)

(学名: Limonium Mill.)

改 正 案	現 行
草丈、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉の表面の毛の密度、葉の周縁の毛の密度、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの強弱、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、茎出葉の有無、 <u>花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の毛の密度、花茎の色、花茎の翼の幅、花茎の翼の波打ちの強弱</u> 、一次分枝部のたく葉の長さ、花序の型、一次分枝の長さ、花序の分枝性、分枝の方向、花序の花数、がくの長さ、がくの直径、がくの形、がくの主な色、 <u>がくの中肋の色</u> 、花冠の大きさ、花冠の型、花冠の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭の形、花の香りの有無、開花始期	草丈、 <u>分けつの多少</u> 、花序の数、葉の長さ、葉の幅、葉身の形、葉の緑色の濃淡、葉の光沢の強弱、葉の毛の有無、葉の表面の毛の密度、葉の周縁の毛の密度、葉の周縁の波打ちの強弱、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの強弱、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニン着色の強弱、茎出葉の有無、 <u>花柄の長さ、花柄の太さ、花柄の毛の密度、花柄の色、花柄の翼の幅、花柄の翼の波打ちの強弱</u> 、一次分枝部のたく葉の長さ、花序の型、一次分枝の長さ、花序の分枝性、分枝の方向、花序の花数、がくの長さ、がくの直径、がくの形、がくの主な色、 <u>がくの中ろくの色</u> 、花冠の大きさ、花冠の型、花冠の色、やくに対する柱頭の位置、柱頭の形、花の香りの有無、開花始期
	



オステオスペルマム

(学名 : Osteospermum L.)

UPOVテストガイドラインの改正に伴い改正するもの

改 正 案	現 行
草姿、 <u>草丈</u> 、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の切れ込みの深さ、葉の斑の有無、 <u>葉の緑色の濃淡</u> 、 <u>開花初期の頭花の舌状花の主な色</u> 、 <u>副花冠の有無</u> 、 <u>舌状花の数</u> 、 <u>頭花の直径</u> 、 <u>花盤の型</u> 、 <u>花盤の直径</u> (花盤がデージー型の品種に限る。)、 <u>花盤の直径</u> (花盤がアネモネ型の品種に限る。)、 <u>花盤の色</u> (花盤がデージー型の品種に限る。)、 <u>優勢な管状花の型</u> (花盤がアネモネ型の品種に限る。)、 <u>漏斗状の管状花の花筒の外側の主な色</u> 、 <u>花弁状の管状花の表面の主な色</u> 、 <u>舌状花の長さ</u> 、 <u>舌状花の幅</u> 、 <u>舌状花の長さ／幅</u> 、 <u>舌状花の先端の形</u> 、 <u>舌状花の横断面の内巻きの有無</u> 、 <u>舌状花の周縁の内巻き部分の比率</u> 、 <u>舌状花の基部の目の幅</u> (花盤がデージー型の品種に限る。)、 <u>舌状花の基部の目の色</u> 、 <u>舌状花の下部の主な色</u> 、 <u>舌状花の中央部の主な色</u> 、 <u>舌状花の上部の主な色</u> 、 <u>舌状花の縦縞の明瞭度</u> 、 <u>舌状花の先端の色</u> 、 <u>舌状花の裏面の色の区分</u>	草姿、 <u>主茎の長さ</u> 、葉の長さ、葉の幅、葉の周縁の切れ込みの深さ、葉の斑の有無、 <u>葉の表面の緑色の濃淡</u> 、 <u>開花初期の頭花の舌状花表面の主な色</u> 、 <u>副花冠の有無</u> 、 <u>舌状花の数</u> 、 <u>頭花の直径</u> 、 <u>舌状花の長さ</u> 、 <u>舌状花の幅</u> 、 <u>舌状花の長さ／幅</u> 、 <u>舌状花の先端の形</u> 、 <u>舌状花の横断面の内巻きの有無</u> 、 <u>舌状花の周縁の内巻き部分の長さ</u> (舌状花が内巻きの花に限る。)、 <u>舌状花の形</u> (内巻きのない品種に限る。)、 <u>舌状花の基部の向き</u> 、 <u>舌状花の下部の色</u> 、 <u>舌状花の表面の色数</u> 、 <u>舌状花の表面の主な色</u> 、 <u>舌状花の表面の色の分布</u> (単色の品種に限る。)、 <u>舌状花の表面の二次色</u> (二色以上の品種に限る。)、 <u>舌状花の表面の二次色の分布</u> (二色以上の品種に限る。)、 <u>舌状花の表面の三次色</u> (三色以上の品種に限る。)、 <u>舌状花の裏面中央部の色の区分</u> 、 <u>花盤の直径</u> 、 <u>花盤の色</u>

4. 運用の結果、修正するもの

つつじ

(学名 : Rhododendron L.)



改 正 案	現 行
葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、<u>成葉の斑の有無、成葉の斑の模様、成葉の斑の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、花序の形(一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。)</u>、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数(八重品種に限る。)、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、<u>花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉(秋葉)の表面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の裏面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の長さ(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の幅(常緑品種に限る。)、<u>成葉(秋葉)の形(常緑品種に限る。)</u>、成葉(秋葉)の表面の毛じの粗密(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の横断面の形(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の表面の光沢の強弱(常緑品種に限る。)</u>	葉の持続性、樹姿、つぼみの形、新葉のろう質粉の多少、新葉の色、新葉のアントシアニン着色の強弱、成葉の表面の色、成葉の裏面の色、成葉の長さ、成葉の幅、成葉の形、成葉の表面の毛じの粗密、成葉の横断面の形、成葉の表面の光沢の強弱、一花序当たりの着花数、<u>花序の形(一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。)</u>、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの有無、がく片の長さ、花の形、花の直径、花の香りの強弱、花型、花冠裂片の数(八重品種に限る。)、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の裏面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の分布、<u>花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度、花冠裂片の花喉部の斑点の型、花冠裂片の花喉部の斑点の色、花冠裂片の花喉部の色の濃淡、やくの色、雌ずいの長さ、柱頭の色、開花始期、成葉(秋葉)の表面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の裏面の色(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の長さ(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の幅(常緑品種に限る。)、<u>成葉(秋葉)の形(常緑の品種に限る。)</u>、成葉(秋葉)の表面の毛じの粗密(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の横断面の形(常緑品種に限る。)、成葉(秋葉)の表面の光沢の強弱(常緑品種に限る。)</u>

4. 運用の結果、修正するもの

なす(トマト、ペピーノ、ふゆさんご及びばれいしょを除く。)

(学名 : Solanum L.)



改 正 案	現 行
区分: なす(トマト、ペピーノ、 <u>ふゆさんご</u> 及びばれいしょを除く。)	区分: なす(トマト、ペピーノ及びばれいしょを除く。)
胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、茎のとげの有無、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身のとげの有無、葉身の緑色の濃淡(観賞用品種を除く。)、葉身の色の数(観賞用品種に限る。)、葉身の主な色(観賞用品種に限る。)、葉身の二次色(観賞用品種に限る。)、葉身の三次色(観賞用品種に限る。)、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱(円筒形の品種に限る。)、収穫時の果皮の主な色、 <u>果皮の主な色の濃淡(果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。)</u> 、果実の光沢の強弱、 <u>果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果柄の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、<u>単為結果性</u></u>	胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、草姿、草丈、第一花着生節の子葉からの長さ、茎のアントシアニン着色の有無、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛じの粗密、茎のとげの有無、葉身の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の凹凸の強弱、葉身のとげの有無、葉身の緑色の濃淡(観賞用品種を除く。)、葉身の色の数(観賞用品種に限る。)、葉身の主な色(観賞用品種に限る。)、葉身の二次色(観賞用品種に限る。)、葉身の三次色(観賞用品種に限る。)、花の数、花の大きさ、花の紫色の濃淡、果実の長さ、果実の直径、果実の長さ／直径、果実の形、果実の花こん部の大きさ、果実の先端の形、果実の花こん部のへこみの深さ、果実の曲がりの強弱(円筒形の品種に限る。)、収穫時の果皮の主な色、 <u>果皮の主な色の濃淡(果皮色が紫色白または緑色の品種に限る。)</u> 、果実の光沢の強弱、 <u>果実の斑紋の有無、果実の条斑の有無、果実の条斑の明瞭度、果実の条斑の粗密、果実の肋の凹凸の強弱、果梗の長さ、へた下のアントシアニン着色の有無、へた下のアントシアニン着色の強弱、へたの大きさ、へたのアントシアニン着色の有無、へたのアントシアニン着色の強弱、へたのとげの多少、へたの縦じわの強弱、果肉の色、成熟時の果皮の色、開花始期、完熟期、<u>単為結果性の有無</u></u>