農林水産省告示(重要な形質)の制定について

平成28年1月20日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、平成28年3月10日付け農林水産省告示第734号で平成20年4月1日付け農林水産省告示第534号(種苗法第2条第7項の規定に基づき重要な形質を定める件)の一部を改正し、同年4月1日から施行。

(参考)

品種登録ホームページ: http://www.hinsyu.maff.go.jp/

〇農林水産省告示第七百三十四号

アガパンサス さ/幅、花族片の内面の縁部の色、花筬片の内面の中助部の色、花筬片の内面の中助部の色、花筬片の内面の中助部の透明度、花筬片の線の波打ち、雄ずい及び雌ずいの花桜片化の有無、雄ずいの突出、花糸の色、やくの色、花柱の色、開花始期 を除く。)、葉の表面の斑の色、葉の基部のアントシアニン着色の有無、ほうの全体の長さに対する先端部の長さ、ほうのアントシアニンの着色、ほうの囲き、花茎の長さ、花茎の大さ、花茎の横断面の形、花茎のアントシアニンの着色、花序の花巻、花序の直径、花序の側面から見た形、トンアニンの着色、花序の主な色、つぼみの二次色、つばみの一次色、つが布、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄のアントシアニンが着色の分布、花板片の長さ、水花板の筒部の長さ、花板の筒部外面の主な色、花板片の長 落葉・常緑の別、 葉の斑の有無、 葉の粗密、 葉の成長に伴う斑の消失、 ・芽当たりの葉数、 葉の長さ、葉の幅、 葉の表面の緑色

ХIJ

_ _ ₹
110
40
الدكه ا
30
- A-∧
l av
~
_
4
_
_
(/)
レマノ
T 🖆
~
(/)
V >
ייתי ו
- ~N
6.1
K
1
にか
に次
次
に次の
に次の
に次の
に次のと
に次の上
に次のよ
に次のよう
に次のよう
表ねむのきの項の次に次のよう
に次のよう
に次のように
に次のように
に次のように
に次のように加
に次のように加
に次のように加
に次のように加る
に次のように加え
に次のように加え
に次のように加え
に次のように加える
に次のように加える
に次のように加える。

NY Ħ. レブカ スピリリ 葉群の高さ、葉群の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の総断面の形、葉の機断面の形、葉の色、花柄の長さ、花柄の直径、花柄の色、花序の長さ、花柄の形、葉の色、花柄の長さ、花柄の色、花序の長さ、花柄の毛、花の数、小花柄の向き、小花柄の長さ、小花柄の直径、小花柄の向き、小花板片の橋、花の数、小花板内の信息、小花板の長さ、小花板片の紙の色、花の面、外花板片の長崎の形、外花板片の紙断面の形、外花板片の横断面の形、外花板片の内面の中央部の主な色、外花板片の外面の周縁部の主な色、外花板片の外面の中央部の主な色、外花板片の外面の周縁部の主な色、外花板片の外面の周縁部の主な色、内花板片の形、内花板片の先端の形、内花板片の形、内花板片の光面の用縁部の主な色、内花板片の形、内花板片の光面の中央部の主な色、内花板片の水面の中央部の主な色、内花板片の水面の中央部の主な色、内花板片の水面の甲央部の主な色、内花板片の外面の用縁部の主な色、内花板片の外面の中央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の中央部の主な色、内花板片の外面の中央部の主な色、内花板片の外面の中央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主な色、内花板片の外面の甲央部の主ない。

表アフェランドラ スクア \Box サ Ó 項 の次に次の ように加える。

カホドイ H 華の大さ、華の緑 葉の幅、葉の緑色 頂小葉の幅、頂小 の長さ、花序の幅 基の表皮の粗滑、 収穫期 の緑色の濃淡、緑色の濃淡、緑色の濃淡、緑色の濃淡、緑色の濃淡、緑川水葉の形、10幅、花弁の6年、堪基の肉6 浆 淡、茎のアントシ7 葉のアントシア3 頂小葉の先端の形 別色、堪茎の形、均 物色、上いも数、J シアニン着色のA アニンの着色、I アニンの着色、I の形、頂小葉のJ 塊茎の皮色のA 塊茎の皮色の平均I 有頂基褐重 「無、葉の長さ、 貞小葉の長さ、 甚部の形、 花序 最色の濃淡、 塊 重、 開花始期、

栾 表アスター (°, °) を加え、 间 司 お 項 h の次に次のように加 0 萯 单 Y スター がえる。 (田) が ろ し の 次に \widehat{m} 47 Щ +(III) ヤコワ X Z

オコワ ナメE, イメビ $\widehat{\equiv}$ 六 前各号に掲げるものの 状、主に食用のデンプン。 ては収量性、台木用品種 \mathbb{H} 7 111 | | | , 全型 花の形状、果実の形状に利用するものに限る。)) 種の識別のために利用する 品質特色 草姿及び草 茎の形状及び葉の形状 国廃住、 とび虫鳥 生、稔性(良害抵抗性 (不稔現 のほか、根部をあった。 で源、タンパクで 重にあっては接 犬(果実を食用、カ)及び種子の形状 するものに限る。) 象のあるものに 利源ぎ 利用するものに 原等として使用 ぎ木特性 . 履る。)、 茁 加倉 用子 又舍 環境耐性、 は品種食用、 <u>a</u> 01 V の加 ては根のものにあ (機別の) 病害抵抗 たると記る品は、 あら

表アスティ ルベ 0 項 を次の ように改める。

木曜日

スデ インプベ 小花密花葉穂度弁のの、の 葉の長 X の形、小葉の先端の形、の長さ、花穂の幅、花穂の長さ、花穂の裾、花穂の、小花穂の形、小花穂の形、小花穂の形、花穂のの形、花井の色、やくの M. Ot 茎の太さ、 巣の幅、 茎の色、 薬の Ē 色、葉の光沢、葉の斑の有無 形、小葉の緑の鋸歯、葉柄の 形、小葉の緑の鋸歯、葉柄の 花舗の形、花舗の曲がり、花 徳の曲がり、花の大きさ、が くの色、雌ずいの色、花の香 茎の毛の多少、 鋸歯、葉柄の長さ、葉柄の色、の曲がり、花穂の小花穂の着生の大きさ、がくの色、花弁の数、の色、花の香、花の香、花の香の、現花期 茎の屈曲、 浦 部間 集の 깩 毛の多少、 葉の型、

平成 28 年 3 月 10 日

表 くろばなろうば 17 の項を次 のように改める。

N ばなる Ś ばい 葉の花花 樹葉 身組形被の密、片、花のたれ、花の 姿身の)先端の形、葉身の基部の形、葉身のま。 で、葉身の裏面の毛の粗密、葉柄の長さ、 が被片の数、外花被片の長さ、外花での色、外花被片の形、外花被片の形、外花被片の形。 樹長 高さ 側枝の粗密、乳葉身の幅、葉り 単しのを 校形の、 長葉 有字 Ì٠ 長外 、 葉身の表面の毛)長さ、花の大きさ、 外花被片の形、外 、内花被片の長さ、 対数、前の表別の 、前年枝の1 の裏面の色 色色

お おしまかんす げ の項の次に次のように加

内花綾片の幅、内花綾片の 有無、内花綾片の二次色、 形、内花綾片の曲がり、花 内花被片の三次1階段子の二次1)主な色、内花被片の二次色 (色の分布、内花被片の先端

99

がえる。

カダン Ż Х トリフィ 丰 壓 姒 面の内曲の強弱、 葉群の 파 M 茶品 葉身の緑色の濃淡、 長群の粗 密密 舼 長の長 葉身の斑の有 'Nt 渊 冲 舼 ຼ 身の斑の 舼 の有が

表ケラトスティグ 7 ウ イル モッティアヌム (るり まつり もどき) 0 項の次に次のように 加

ハナン

ズオウ 成目の明瞭度、葉身の向、 葉身の先端の形、葉身 葉身の先端の形、葉身 葉身の表面の主な色、葉 葉身の表面の主次の、 葉身の表面の光沢の強、 葉身の表面の光沢の強い、 葉身の周の光沢の強い、 葉身の周縁の波打が布、葉身の周縁の波打が直径、 花柄の長さ、 花板の 旗弁の内面の二次、 竜骨弁の外面の主な色、

17 あらせ 1/7 とうの 項を次 0 ように改める

表にお

カラ

		スマンティウム・ティフォリウム
の向き、小穂の長さ、小穂の幅、小穂のアントシアニン着色の有無、頴 の数	葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の色、葉身の裏面の緑色の濃淡、葉身の横断面の形、葉身の毛の有無、止め葉の長さ、止め葉の幅、小標	茎の長さ、葉しょうの長さ、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうの毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の表面の緑色の濃微、

表エリンギウム 0 項 の次に次の ように加える。

エスカリョニア ラエウィス	エリシムム
樹姿、枝の粗密、当年枝の横断面の形、当年枝のアントシアニンの着色、当年枝の軟毛の有無、当年枝の軟毛の粗密、当年枝の腺毛の有無、当年枝の腺毛の有無、当年枝の腺毛の有無、当年枝の腺毛の粗密、葉の長さ、一幅、新葉の表面の主な色、葉の最もの粗密、葉の長さ、一種、素の斑の色、葉の斑の横様、葉色、葉の表面の主な色、葉の斑の角葉、葉の斑の色、葉の斑の横様、葉の光沢の強弱、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の競歯の有無、葉の光沢の強弱、葉の最大幅の位置、葉の先端の形、葉の競歯の有無、葉の競歯の分布、葉の銃歯の型、花序の型、花序の長さ、花序の幅、一花の筋を、花の長さ、花の幅、花の長さ、花筒部の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の表面の色、花冠裂片の真面の色、花冠裂片の直き、花冠裂片の直なり	草型、草丈、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の総断面の形、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の表面のアントシアニンの着色、葉の周縁の鋸歯の有無、葉の周縁の鋸歯の数、葉の波打ち、花序の幅、一花序の花数、花らいに対する花の位置、小花柄の長さ、花型、花径、がくの長さ、がくの色、花弁の直なり、花弁の長さ、花井の画、花弁の形、花弁の先端部の形、花弁の馬さ、花弁の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬さ、花井の馬の水、花井の玉な色、花弁の馬の明瞭度、花の香り、開花始期(種子繁殖性品種弁の二次色、花弁の脈の明瞭度、花の香り、開花始期(種子繁殖性品種に限る。)

				1	ユーフォルビア アミガダロイデス
葉の斑の有無、ほう花葉の斑の色、腺体の色	直径、頂花序の一次花柄の数、椀状花序の直径、ほう花葉の色、ほう花	序の数、臓花序の一次花柄の長さ、臓花序の二次花柄の長さ、頂花序の	の色、葉の斑の有無、葉の斑の色、臓花序の数、臓花序当たりの端状花	薬の着生角度、薬の長さ、薬の幅、薬の形、薬の光端部の形、薬の表面	草姿、草丈、株幅、側枝の数、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニン の著色 雄の数 新華の表面の色 新華の画面のアントシアーンの著色

様の大き 、う葉の裏面の主な色、 次に「、ほう無の多 (おい残りばいしゅから)」をユーホルビア(ヒペリシフォリ 侧枝」 ΩŦ 舼 に、「葉の緑色」 身のアントシア Ŷ 「リシフォリア (おとぎりばにしきそう)の項 まる 录色」を「葉身の緑色」に、「葉の斑の有無」を「葉身の斑の下シアニンの着色、葉身のアントシアニン着色部の面積」にを加え、「ほう葉の色」を「ほう葉の表面の主な色、ほう葉がずの裏面の二次色」に改め、同表きんかんの項を次のよ 「ユーフォルビア ヒペリキフォリア」は、 同表きんかんの項を次のように改める。 É <u>Ц</u> 「葉身の斑の有無、 「麻痺」,「 改 を め、「花序の幅 ヒペリシフッ[草姿]に、 葉身の模

(号外第 54 号)

の直の 極 70 姿年形在色生 、枝の密度、一年生枝の生枝のとげの多少、葉身生枝のとげの多少、葉身、葉身の基部の形、葉身、花糸の数、果実の長さ、、根皮の厚さ、果肉のす)数, 胚の数、 開花始期、 での長さ、一年生校の太さ、一年生校の節間長、 長身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端 長身の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、花の きさ、果実の幅、果実の重さ、果実の形、果皮 り甘味、果肉の酸味、果皮の甘味、果汁の多少、 成熟始期

次 表グ のように加える。 П キシニア 0 項 及びハワ ĺ シア モー -ガニー の項を削り、 同 表 ハワ ĺ シア ムチカの 項 0 次に

| ハワーシア H \mathbb{H} 7 111-11

Ė 草姿及び草 茎の形状及び葉の形状

花の形状、果実の形状 に利用するものに限る。) 種の識別のために利用す 犬(果実を食用、カ)及び種子の形状 するものに限る。) 茁 工作 用子]又は品種(- を食用、) の加)識別のため |工用又は品

品質特性

早晩性、稔性(不 性及び虫害抵抗性 (不稳現 象のあるものに .限る。)、 環境耐性、 病害抵抗

가 前各号に掲げるもののは れ、主に食用のデンプン派 Cは収量性、台木用品種に 害 のほか、根部をデン源、タンパクi 重にあっては接 利源ぎ 別用するものに2 原等として使用-ぎ木特性 <u>a</u> 8 ON V ては根のものにあ

かんしょの 項 を次 のように に改める。

用品種に限る。)、葉身の表面の数の二次色(観賞用品種に限る。)、葉身の裏面の主な色(観賞用品種に限る。)、葉身の表面のアントシアニンの着色(観賞用品種を除く。)、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色のチントシアニンの着色、新葉の天面の主な色、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色、新葉の表面の主な色、現での直径、花冠の色、塊根の形、塊根の長さ/幅、塊根の数、塊根の大きさ、塊根の语と対する皮層の厚さ、塊根の表皮の主な色、塊根の方とさ、塊根の高点さ、塊根の表皮の主な色、塊根の表皮の二次色、塊根の目の深さ、流しいもの肉の主な色の濃淡、塊根の肉の二次色、塊根の目の深さ、蒸しいもの肉の色、でん粉の歩留、黒斑病抵抗性、つる割病抵抗性、ネコブセンチュウ抵抗性 表面の 茎の一次側枝の長さ、節間長、茎の太さ、茎のアン茎の先端のアントシアニンの着色、節のアントシア 茎の先端のアントシアニンの着色、節のアントシア ご端の毛の粗密、葉身の大きさ、葉身の裂片の数、葉)ない品種に限る。)、葉身の裂片の深さ、葉身の表面 斑の有無 (観賞用品 種に限る。)、 葉身の表面の斑の主な ントシアニンの アニンの着色、 解身の形(葉身 面の色、葉身の 舡 (観賞

15

表イソトマ アキ シラリスの 項 ô 次に次のように加 える。

葉縁の形、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の岩体がの着生位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花の数、花の直径、がくの長さ、がくの色、花冠筒部の長さ、花冠筒がの形、花冠筒部の形、花冠筒部の形、花冠筒部の形、花冠筒部の形、花冠筒部の形、花冠野の形、花冠野の形、花石野の形、花石野の色、そくの色、花の香りの有無、開花習性、開花始期 樹葉小 数、を動き、動き、動き、乗の表し、乗の表 高面さるので 分枝性、 ** Dアントシン 子薬の幅、 枝の太さ、 シアニンの引 晶、小葉の引 着形, 核色のの の色、節間長、 羽片の数、3 小葉の先端のJ 1長、葉の15人、翌年の15人、30人、30人、30人、40人 長長葉さるるの の毛の有無、数、花の同き、竹部の大さ、 竹部の大さ、 花冠製片の 花柱の主な 、葉の幅、光子の幅、 、光子の標、 基部の形、

スター デー 0 項の 次に次のように加える。

t

4

メリカイワナンテ 面の主な色、 3 極 着先 色、葉郷の画 甶 凇 、新葉の表面の主な色、新葉の斑の有無葉身の幅、葉身の形、葉身の形、葉身の形、葉身の光端の形、 極恒 が多りの 葉身の斑の有無、 *** の鋸歯の深さ、葉柄 花冠の開口部の直 來福 IIE 4年枝の (柄の手)直径、 Ť, 葉身の斑の色、 前年枝の長 X ₹さ、がくの色、 花冠筒部の幅、 無、新葉の斑の色、 Ñ 葉身のアントシアニンの 前年枝の太 花覧の:0-1 長色 が が、 と対 N 葉身の長 葉身の表 前年枝 花覧の活性対

次に次のように加 表ぎ よりゅうば 11 の項 える。 中 叫 97 S ð うばい」 を [レプトスペルムム] に改め、 同表ほう んしめじ Ŏ 項

カトラ \ \ \ W

形二葉長花長表、ン称さるよ 3、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面のアントシアニンの着色、葉身の表面のアントシアニン着色の分布、葉身の裏面の色、標本の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花字の向き、ほう葉の長さ、はう葉の色、ほう葉のアントシアニンの着色、小花柄の長さ、小器の色、がくの先端の色、がくの基部の色、小花の直径、花冠製片の長さ、花冠製片の幅、花冠製片の形、花冠製片の幅、花冠製片の形、花冠製片の梅、花冠製片の梅、花冠製片の形、花冠製片の梅、花冠製片の梅、花冠製片の形、花冠製片のち、花米の色、花柱の色 茎の太さ、 茎の毛の3 室外の 海州産産の の長 形さ 基の色、基準身の幅、 を変し、実のでは、 部の例が ア形 4 イ葉 、ツアニンの 素身の先端の

表もくれんの 項を次のように改める。

アング

પોં

ノリ Ý スーラ 表面の色、発素の形成の形成である。 一般である。 一般では、 一をは、 一を、 一をは、 極極を高り、大きのでは、大きである。 株が温 色、葉身の表面の斑の希の形、花被片の数、花物が面の形、花被片の数、花被断面の形。花被片の根紙断面の形。花被片の根上部の色、花被片の裏正上部の香り、開花期 庫 枝がの葉 (と登り) 叛 枝彡。の葉 大の東がいるのか 技の句、影の形、 Aの裏面の色、花の高さ、花の直、花の直流、花板片の幅、花板片の形、花板片の形、花板片の形、花板片の形。 花板片の表面の色、花板片の色、木板片の色、木木の色、土木の色、土土の色、木木の色、土土の色、木木の色、土土 楽葉 は身の長さ、 身の表面の 葉身の幅、)光沢、葉身 直花のぼ 葉の

チリそけ いの 項 を次の ように改める。

そけい

東群の粗密、つるの数、若茎の緑色の濃淡、若茎のアントシアニンの着色、節間長、茎の毛の有無、葉序、葉柄の長さ、葉柄の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニンの着色、節間長、茎の毛の有無、葉序、葉柄の長さ、葉柄の砂の扇、柄のアントシアニンの着色、珠柄の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、類身の長さ/幅/東身の長さ/年/第の形と大海の一部の一部の形。葉身の主な色、葉身の三次色、葉身の二次色の模様、葉身の基部の形。葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の模様、葉身の表面の形。大海の緑色の濃淡、葉身の裏面の毛の有無、葉身の横断面の形、葉縁の波打ち、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花内のアントンアニンの着色、小花柄の毛の有無、つぼみの形、花型、がくの長さ、がくの下部の主な色、がくの上部の主な色、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の外面の色、花喉部の外面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花喉部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の角、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部の色、花碗部の丹面上部

平成 2	28年3月1	ОВ	木曜日	官	Ž	報 (号外第5	54	号)		16
ある 表 あ ま	かた	改め、日		ワス	表ぶなは	▷	表みや	ρ×	表とんび	
ガンボルツ	Î	同表かなめもちの一		ワスレナガサ	りたけの頂	70379	こわすれの項を	2ンブリアンテム クリスタリヌム	まいたけの項	
は次のように伝える。 樹高、株幅、葉の粗密、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉軸の主な色、新葉の表面の色、葉の表面の色、葉の斑の主な色、葉の斑の表面の色、葉の表面の色、葉の斑の主な色、葉の斑の分布、羽片の多少、羽片の長さ、羽片の幅、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の先端部の形、小葉の基部の形、小葉の切れ込みの多少、小葉の切れ込みの深さ、小葉の鋸歯の多少	が、 勝、 悪、 悪、 乗、 乗、 がの表で、 かの表で、 かの表で、 かの表で、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 の	ロフィルスの項中「ペンステモン ヘテロフィルス」を「ペンステモン」に 項を次のように改める。	強の有無、葉の斑の型、葉の斑の色、花の数、花の大きさ、がくの主な色、がくの切れ込みの深さ、がくの毛の粗密、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の色の変化の有無、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、副花冠の有無、副花冠の開花直後の色、副花冠の開花盛期の色、開花始期	草型、草姿、草丈、茎のアントシアニン着色の有無、茎の毛の粗密、基部葉の長さ、基部葉の幅、基部葉の長さ/幅、基部葉の形、基部葉の先端の形、基部葉の表面の緑色の濃淡、基部葉の表面の光沢、基部葉の表面の毛の粗密、基部葉の裏面の毛の粗密、茎葉の長さ/幅、茎葉の形、茎葉の光端の形、茎葉の表面の彩色の濃淡、茎葉の表面の光沢、茎葉の表面の毛の粗密、葉の表面の光沢、茎葉の表面の毛の粗密、葉の	次に次のように加える。	情数性、火芽の数、偽茎の長さ、偽茎の自在、偽茎の自なりの強弱、偽茎の先細り、偽茎の白色、偽茎の可にいいを対しようの内側の色、偽茎の可部の葉柄の粗密、草姿、葉柄の基部の葉しょうの内側の色、偽茎の頂部の葉柄の粗密、草姿、葉柄の基部の翼の状態、葉柄の長さ、葉身の裏面の中助の色、葉身の長さ/幅、葉身の裏面のワックス、葉身の長さ、栗身の幅、葉身の長さ/幅、葉身の満曲、果房の長さ、果島の長さ、果軸の長さ、果軸の毛の有無、果軸の湾曲、果房の果設の数、花軸のほうの信を、果房の形、果房の果設の数、花軸のはうの信を、果房の形、果房の形、果房の隆起の強弱、花軸のほうの宿存性、花軸の中性花の宿存性、果実の湾曲、果実の後、果実の長さ、果実の幅、果柄の長さ、果実の先端の形、果皮の厚さ、米熟果の果皮の色、果皮の色、果皮の剝皮の難易、果実の形、雄花序のほうの開き具合、ほうの内側の色、ほうの先端の形、雄花序の形、雄花序の開き具合、ほうの内側の色、ほうの先端の形	削り、同表ミューレンベッキアの項の次に次のように加	草丈、株幅、一次側枝の長さ、一次側枝の太さ、二次側枝の長さ、ブラッ ダー細胞の突出の有無、葉の長さ、葉の幅、葉の最大幅の位置、葉の問縁の波打ちの強弱、葉のベタシアニンの着色、葉の緑色の濃淡	の次に次のように加える。	先端の形、花冠裂片の重なり、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色の有無、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の表面の二次色の模様、花冠裂片の周縁の反り、花冠裂片の周縁の波打ち、花冠裂片の先端部の総断面の形、花糸の色、やくの色、子房の色
	表ペロニカヨウツェブ		表あきにれ	表ソルガム		に加える。 でリーマーマンジン	セイヨウン	表サルビア		表在来さくプロスタン

ざさくらそうの項の次に次のように加える。

樹姿、樹高、株幅、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、新葉の色、葉身の色、葉身の魚の有無、新葉の類の色、葉身の類の色、葉身の先端の形、葉身の毛の多少、葉身の凹凸、葉身の周縁の形、葉柄の有無、がくの長さ、がくの色、花冠の長さ、花冠の幅、花筒の内面の模様の有無、花筒の内面の模様の色、花筒の外面の主な色、唇弁の色、下唇弁の中央製片の形、下唇弁の側裂片の形、葉の香り、開花始期	サルビアの項の欠に	プロスタンテラ
	ルビアの項の欠に欠のように加える。	姿、樹高、株幅、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、葉身さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、新葉の色、葉身の色身の斑の有無、新葉の斑の色、葉身の斑の色、葉身の先端の形、葉毛の多少、葉身の凹凸、葉身の固縁の形。葉柄の有無、がくの長さくの色、花冠の長さ、花冠の幅、花筒の内面の模様の有無、花筒のの模様の色、花冠の外面の主な色、唇弁の色、下唇弁の中央裂片の形唇弁の側裂片の形、葉の香り、開花始期

%さの項中 「		ウニワトコ
^さの項中「भuxu」を「ベビブサ」に改め、同表セドゥム ブリトの項の次に次のよう	頂小葉の幅、頂小葉の形、葉の表面の主な色、葉の表面の斑の有無、葉の表面の斑の分布、葉の表面の斑の色、葉縁の欠刻の爼密、葉縁の欠刻の沼密、 花序の直径、 花序の花の爼密、 つばみの色、 花型、 花の色、 やくの色、 果実の色	、葉の型、葉の長さ

。 。 ぶ |

長ノレげいの頁の欠こ欠のようこ叩える。	シーマニア・シルウァティカ
欠りようこ叩える。	草姿、草丈、茎の長さ、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎上部のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ/幅、葉身の緑色の漫淡、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉柄の長さ、花柄の長さ、花柄のアントシアニンの着色、花冠の長さ、花冠の先端の直径、花冠筒部のがアントシアニンの着色、花冠筒部の内面の長さ、花冠の明瞭度、花冠筒部の松径、花冠筒部の内面の色、花冠筒部の内面の模様の明瞭度、花冠筒部の内面の模様の明瞭度、花冠筒部の内面の模様の色、花冠筒部の外面の色、花冠裂片の内面の色、開花始期

たガムの項の次に次のように加える。

.	
ビャクブ 草姿、茎の長さ、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、新葉の葉身の色、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の光沢、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉縁の波打ち、葉柄の長さ、花の直径、花被片の色、 開花始期	

こにれの項の次に次のように加える。

ルブラ 草丈、株幅、草丈/株幅、新葉の葉身の色数、新葉の葉身の主な色、新葉の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色の分布、新葉の葉身の三次色、新葉の葉身の光沢、新葉の葉身の自粉の有無、葉身の長さ、葉身の隔、葉身の色数、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色、葉身の二次色、葉身の二次色、葉身の二次色、葉身の光沢、花穂の抽出度、花穂の長さ、花穂の色、出穂期	ウンキニア	
文、株幅、草丈/株幅、新葉の葉身の色数、新葉の葉身の主な色、の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色の分布、新葉の葉身の三次色の分布、新葉の葉身の三次色の紫りの三次色、新葉の葉身の白粉の有無、葉身の長さ、葉身の偏数、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の分布、葉身の色数、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の光沢、花穂の抽出度、花穂の長さ、花穂の色、出穂		
	文、株幅、草文/株幅、新葉の葉身の色数、新葉の葉身の主な色、 の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色の分布、新葉の葉身の三次色 東の葉身の光沢、新葉の葉身の目粉の有無、葉身の長さ、葉身の幅 身の色数、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の分布、葉 三次色、葉身の光沢、花穂の抽出度、花穂の長さ、花穂の色、出穂	

三カの項の次に次のように加える。

		ヨウシュカンボク
の有無、装飾花の花冠裂片の懶断面の形、両性花の色、果柄の長柄の色、果実の長さ、果実の幅、果実の形、果実の色、開花始期	組密、葉身の周縁の波打ち、葉身の横断面の形、葉身の無、葉扇の長さ、花序の無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニンの着色、花序の無、葉柄の長さ、葉柄のアントシアニンの着色、花序の無、花序の帰、花序の形、装飾花の花冠裂片の主な色、装飾花の花石裂片の下次色、装飾花の花石裂片の正次色、装飾花の花石裂片の花石砂では、装飾花の花石裂片の花石砂では、装飾花の花石裂片のでは、装飾花の花石裂片のでは、装飾花の花石裂片の重なり、装飾花の花石裂片の色、装飾花の花石裂片の	樹姿、樹高、株幅、枝の毛の粗密、枝のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の表面のアントシアニンの着色、葉身の切れ込みの数、葉身の切れ込みの深さ、葉身