

1. これまでに出願のなかった植物種類について、審査の必要上から審査基準を作成するため、区分を新設するもの

- (1) ムラサキシキブ
- (2) クフェア ラモシッシマ
- (3) ギョウギシバ
- (4) ディエールヴィラ
- (5) エリアンツス アルンディナセウム
- (6) フィクス ルビギノサ
- (7) イヌツゲ
- (8) リンデルニア クレイスタンドラ
- (9) ロマンドラ
- (10) トキワマンサク
- (11) ネモフィラ
- (12) リベス サングイネウム
- (13) セネキオ カンディダンス
- (14) トラキメネ コエルレア

1. 区分を新設するもの

(1)ムラサキシキブ（学名：Callicarpa L.）

改 正 案	現 行
<u>樹姿、樹高、樹幅、節間長、側枝の太さ、側枝の主な色、側枝の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉脈間の膨らみ、葉身の裏面の毛、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉縁の鋸歯の位置、葉縁の鋸歯の粗密、花梗の着生位置、花梗の向き、花序の幅、一花序当たりの花の数、花冠裂片の主な色、果実の直径、果実の主な色、果実のがくに対する大きさ、開花期、成熟期、落果性、落葉性</u>	なし  ＊ 植物写真 出典 ＊印 （主な情報収集先） ・種苗管理センター（栽培試験）、現地調査等 ・UPOV-TG ・カナダ品種登録データベース http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/pbrpov/image/9101c.jpg ・http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/BotanicalGarden-F.html

1. 区分を新設するもの

(2) クフェア ラモシッシマ (学名 : Cuphea ramosissima Pohl ex Koehne)

改 正 案	現 行
<u>枝のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、花の直径、 がく筒の主な色、上花弁の主な色、下花弁の主な色</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(3) ギョウギシバ(学名：Cynodon Rich.)

改 正 案	現 行
<u>倍数性、種子の千粒重（種子繁殖性品種に限る。）</u>、<u>草丈、</u> <u>ほふく茎の伸長性、ほふく茎の長さ、ほふく茎の節間長、ほふく茎</u> <u>の節間の太さ、ほふく茎のアントシアニンの着色、水平葉の長さ、</u> <u>水平葉の幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の毛、葉耳の毛、葉</u> <u>しょうの毛、止め葉の長さ、止め葉の幅、止め葉の葉しょうの長さ、</u> <u>出穂茎の高さ、出穂茎の節間長、出穂期、総（ふさ）の長さ、</u> <u>総の数、小穂の数</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(4) ディエールヴィラ (学名 : Diervilla Mill.)

改 正 案	現 行
<u>樹勢、樹姿、一年枝の冬期の色、新しうのアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉縁の鋸歯の形、葉縁の鋸歯の深さ、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の分布、葉身の斑の色、葉身の斑の濃淡、落葉直前の葉身の主な色、葉身の光沢の強弱、葉柄の長さ、花序の型、花の大きさ、花の色、開花始期、開花期間、二季咲き性の有無、吸枝の有無、落葉始期</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(5)エリアンツス アルンディナセウム (学名：Erianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiet)

改 正 案	現 行
<u>倍数性、越冬後の初期生育、草型、出穂期、草丈、最長稈の長さ（未出穂品種を除く。）、最長稈の太さ、出穂期の茎の多少、葉しょうの毛、葉しょうのろう質、葉身の長さ、葉身の幅、穂の多少、穂の長さ</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(6)フィクス ルビギノサ (学名 : Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.)

改 正 案	現 行
<u>樹姿、主枝の色、側枝の色、側枝の発生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の一次色、葉身の斑の一次色の分布、葉身の斑の一次色の模様、葉身の斑の二次色の有無、葉身の斑の二次色の分布、葉身の斑の二次色の模様、葉身の斑の三次色の有無、葉身の斑の三次色、葉身の周縁部の波打ち、葉身の光沢、葉柄の長さ</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(7) イヌツゲ (学名 : Ilex crenata Thunb.)

改 正 案	現 行
<u>樹姿、樹勢、枝葉の粗密、新しうの毛、新しうの樹皮の色、新葉の主な色、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の光沢、葉身の縦方向の反り、葉身の横断面の形、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、花の数、花性、雄花の大きさ（雄株品種に限る。）、雄花の色（雄株品種に限る。）、雌花の大きさ（雌株品種に限る。）、雌花の色（雌株品種に限る。）、果実の大きさ（雌株品種に限る。）、果実の色（雌株品種に限る。）、果実の数（雌株品種に限る。）</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(8) リンデルニア クレイスタンドラ (学名：Lindernia cleistandra W. R. Barker)

改 正 案	現 行
<u>草姿、草丈、株の幅、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の横断面の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁部の鋸歯、葉身の腺毛、小花柄の長さ、花冠の縦径、花冠の横径、花冠の縦径／横径、花冠筒部の長さ、花喉部の内面の主な色、下唇弁の中央裂片の長さ／幅、下唇弁の中央裂片表面の主な色</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(9) ロマンドラ（学名：Lomandora Labill.）

改 正 案	現 行
<u>草姿、葉群の高さ、葉群の粗密、葉の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉の横断面の形、葉の先端の型、葉の先端の中央歯状突起の長さ、歯の平滑度、葉の表面のろう質の強弱、葉の表面の主な色、葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）、葉の表面の光沢、葉の硬さ、葉しょう基部の周縁部の切れ込み、葉しょう基部の褐色の着色の濃淡、花序の位置、花序の側枝の多少、花穂の長さ、花柄の長さ、花柄の色、ほう葉の長さ、がくの色</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(10) トキワマンサク (学名 : Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.)

改 正 案	現 行
<u>樹姿、樹高、樹幅、側枝の粗密、成葉の葉身の長さ、成葉の葉身の幅、若葉の主な色、若葉の斑の有無、若葉の斑の型、若葉の斑の色、成葉の主な色、成葉の斑の有無、成葉の斑の型、成葉の斑の色、秋季の若葉の主な色、秋季の若葉の斑の有無、秋季の若葉の斑の型、秋季の若葉の斑の色、秋季の成葉の主な色、秋季の成葉の斑の有無、秋季の成葉の斑の型、秋季の成葉の斑の色、一花序の花数、花序の直径、がくの色、花の長さ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の反り、花弁の主な色、花弁の二次色の有無、花弁の二次色</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(11)ネモフィラ (学名 : Nemophila Nutt.)

改 正 案	現 行
<u>草丈、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の主な色、葉の切れ込みの先端の形、花柄のアントシアニンの着色、花冠の直径、花冠の主な色、花冠の二次色（二次色のある品種に限る。）、花冠の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花冠の三次色（三次色のある品種に限る。）、花冠の小斑点の有無、花冠の小斑点の主な色、花冠の脈の着色の有無、花冠の脈の主な色</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(12) リベス サングイネウム (学名 : Ribes sanguineum Pursh)

改 正 案	現 行
<u>樹姿、側枝の粗密、芽のアントシアニンの着色、新しうのアントシアニンの着色、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、花序の長さ、花の数、花の粗密、花の色、花の大きさ、花柄の長さ、着果の有無</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(13)セネキオ カンディダンス (学名 : Senecio Candidans DC.)

改 正 案	現 行
<u>草姿、葉部の高さ、株の幅、茎の毛の有無、葉の数、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁部の鋸歯、葉身の周縁部の波打ち、葉身の表面の毛の有無、葉身の表面の毛の粗密、葉身の裏面の毛の有無、葉身の色、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の基部のアントシアニン着色の有無</u>	なし  *

1. 区分を新設するもの

(14)トラキメネ コエルレア (学名 : Trachymene coerulea Graham)

改 正 案	現 行
<u>草丈、一次側枝の多少、一次側枝の着生角度、葉の長さ、葉の幅、花柄の長さ、総ほう片のアントシアニンの着色、花序の高さ、花序の直径、花序の高さ／直径、小花の直径、小花の主な色、開花始期</u>	なし  *