

農林水産省告示（重要な形質）の制定について

平成 29 年 12 月 15 日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、平成 30 年 3 月 23 日付け農林水産省告示第 597 号で平成 20 年 4 月 1 日付け農林水産省告示第 534 号（種苗法第 2 条第 7 項の規定に基づき重要な形質を定める件）の一部を改正し、施行。

(参考)

品種登録ホームページ : <http://www.hinsyu.maff.go.jp/>

○農林水産省告示第五百九十七号

種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第七項の規定に基づき、平成二十年四月一日農林水産省告示第五百九十四号(種苗法第二条第七項の規定に基づき重要な形質を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

平成三十年三月二十二日

農林水産大臣 齋藤 健

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後		改 正 前	
区 分	重 要 な 形 質	区 分	重 要 な 形 質
(略)	(略)	(略)	(略)
トドマツ	(略)	とどまつ	(略)
アブチロン(イチビ)	(略)	アブチロン(いちび)	(略)
ギンヨウアカシア	(略)	ぎんようアカシア	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
カエデ	(略)	かえで	(略)
ノコギリソウ(オオバナノコギリソウを除く。)	(略)	のこぎりそう(おおばなののこぎりそうを除く。)	(略)
オオバナノコギリソウ	(略)	おおばなののこぎりそう	(略)
トリカブト	(略)	とりかぶと	(略)
マタタビ	(略)	またたび	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
アデニウム	樹高、枝の太さ、枝の色、葉身の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑のタイプ、葉身の斑の色、葉身の波打ちの有無、葉身のねじれの有無、葉身の横断面の形、葉身の周縁部の曲がり、葉身の光沢の有無、葉身表面の毛の有無、葉身裏面の毛の有無、花柄の長さ、花柄の太さ、花柄のアントシアニン着色の有無、花柄の色、がく裂片の長さ、がく裂片の幅、がく裂片のアントシアニン着色の有無、がく裂片の色、花型、花数、花径、花の香りの有無、花冠裂片の数(八重品種に限る。)、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の先端部の形、花冠裂片の重なり、花冠裂片の横断面の形、花冠裂片の波打ち、花冠裂片のねじれ、花冠裂片の周縁の鋸歯、花冠裂片表面の主な色、花冠裂片表面の二次色の有無、花冠裂片表面の二次色、花冠	アデニウム	一 樹姿及び樹高 二 幹の形状、枝の形状及び葉の形状 三 花の形状、果実の形状(果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。)及び種子の形状(種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。) 四 品質特性 五 早晚性、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六 前各号に掲げるもののほか、台木用品種にあっては、接ぎ木特性

	裂片表面の二次色の分布、花冠裂片裏面の主な色、内側の花冠裂片の主な色（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色の有無（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色の分布（八重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒外面の主な色、花筒外面の二次色の有無、花筒外面の二次色、花筒外面の毛の有無、花筒内面の主な色、花筒内面の縞模様の有無、花筒内面の縞模様の色、花筒内面の縞模様の線の数、葯付属体の突出、葯付属体の色、開花期
(略)	(略)
フクジュソウ	(略)
(略)	(略)
ヌカボ	(略)
(略)	(略)
ネムノキ	(略)
(略)	(略)
タマネギ	(略)
ラッキョウ	(略)
ネギ	(略)
(略)	(略)
ニンニク	(略)
アサツキ	(略)
(略)	(略)
ニラ	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)
アルテルナンテラ ブラジリアナ	草姿、草丈、株幅、茎の太さ、茎の節間長、茎の色、茎の毛、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の基部の形、葉の先端部の形、葉の表面の主な色、葉の表面の二次色の有無、葉の表面の二次色、葉の表面の二次色の分布、葉の表面の光沢、葉の裏面の主な色、葉の裏面の二次色の有無、葉の裏面の二次色、葉の裏面の二次色の分布、葉の裏面の光沢、葉の着生角度、葉の周縁部の波打ち、葉の凹凸、着ら いの難易、頭花の長さ、頭花の幅、頭花のアントシアニンの着色、 頭花の着生時期
(略)	(略)

(略)	(略)
ふくじゅそう	(略)
(略)	(略)
ぬかぼ	(略)
(略)	(略)
ねむのき	(略)
(略)	(略)
たまねぎ	(略)
らっきょう	(略)
ねぎ	(略)
(略)	(略)
にんにく	(略)
あさつき	(略)
(略)	(略)
にら	(略)
(略)	(略)
アルストロメリア	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)

コンニャク	(略)
ルリハコベ (アナガリス モネリ)	(略)
パインアップル	草姿、着葉数、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニンの着色、葉の裏面の毛じの粗密、葉のバイピングの有無、葉のとげの有無、葉のとげの粗密、葉の周縁部のとげの分布、葉のとげの色、葉のとげの大きさ、ほうの大きさ、花卉の先端の色、花卉の長さ、雄ずいの長さ、花柱の長さ、未熟果の色、果実基部の高さ、果柄の長さ、果柄の直径、塊茎芽の発生数、吸芽の発生数、吸芽の大きさ、えい芽の発生数、えい芽の大きさ、冠芽の発生数、冠芽の着生角度、冠芽の大きさ、果実の形、果実の長さ、果実の直径、果実の色、果実の大きさ、目の大きさ、小果の先端部の形状、目の色の均質性、果肉の色、果心の直径、果肉の色の均質性、果肉の粗密、果肉の硬さ、果肉の繊維質、果肉の香りの強弱、果汁の多少、果肉の酸味、果肉の甘味
シュウメイギク	(略)
アシタバ	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)
アサヒカズラ	茎の色、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の表面の凹凸、葉身の先端部の形、葉身の周縁の波打ち、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄のアントシアニンの着色、花序の長さ、花序の花の数、花柄の色、小花柄の色、つぼみの色、花型、花の長さ、花の幅、がく片の数、がく片の幅、がく片の形、がく片の主な色、がく片の二次色
キンギョソウ	(略)
(略)	(略)
セルリー	(略)
(略)	(略)
オダマキ	(略)
ハクサンハタザオ	子葉のアントシアニン着色の有無、草丈、花茎の数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の基部のアントシアニンの着色、花茎の一次側枝の多少、花茎の葉の数、下位葉の長さ、下位葉の幅、下位葉の形、下位葉の先端の形、下位葉の切れ込みの深さ、下位葉の切れ込みの数、中位葉の長さ、中位葉の幅、中位葉の形、中位葉の先端の形、中位葉の切れ込みの深さ、中位葉の切れ込みの数、花の縦径、花卉の色、開花始期

こんにゃく	(略)
るりはこべ (アナガリス モネリ)	(略)
パインアップル	一 草姿、草丈、吸芽の発生数、えい芽の発生数、冠芽の発生数及び冠芽の奇形の有無 二 茎長、茎の太さ、着葉数、葉長、葉幅、葉色、葉の厚さ及び葉辺のとげの多少 三 果形、果実の大きさ、果実の長さ、果実の円周、果実表面の色、小果の大きさ、小果の数、果皮の厚さ、果しんの太さ、果肉の色、肉質、果汁の多少、甘味、酸味、香気及び種子の多少 四 開花期、成熟日数、果実の生理障害の多少、病害抵抗性及び虫害抵抗性
しゅうめいぎく	(略)
あしたば	(略)
(略)	(略)
アンスリウム	(略)
(新設)	(新設)
きんぎょそう	(略)
(略)	(略)
セロリー	(略)
(略)	(略)
おだまき	(略)
(新設)	(新設)

<u>シロイヌナズナ</u>	(略)
<u>ラッカセイ</u>	(略)
<u>ウド</u>	(略)
<u>タラノキ</u>	(略)
<u>ゴボウ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>マンリョウ</u>	(略)
<u>ヤブコウジ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>セイヨウワサビ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>クサスギカズラ</u> (ア スバラガス (観賞 用))	(略)
(略)	(略)
<u>チャセンシダ</u>	(略)
アスター (ミヤマヨ メナを除く。)	(略)
ミヤマヨメナ	(略)
(略)	(略)
<u>レンゲ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>イヌワラビ</u>	(略)
<u>オオバナオケラ</u>	(略)
<u>アオキ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>エンバク</u>	(略)

<u>しろいぬなずな</u>	(略)
<u>らっかせい</u>	(略)
<u>うど</u>	(略)
<u>たらのき</u>	(略)
<u>ごぼう</u>	(略)
(略)	(略)
<u>まんりょう</u>	(略)
<u>やぶこうじ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>せいようわさび</u>	(略)
(略)	(略)
<u>くさすぎかずら</u> (ア スバラガス (観賞 用))	(略)
(略)	(略)
<u>ちゃせんしだ</u>	(略)
アスター (旧しおん) (ミヤマヨメナ (旧 ミヤコワスレ) を除 く。)	(略)
ミヤマヨメナ (旧ミ ヤコワスレ)	(略)
(略)	(略)
<u>れんげ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>いぬわらび</u>	(略)
<u>おおばなおけら</u>	(略)
<u>あおき</u>	(略)
(略)	(略)
<u>えん麦</u>	(略)

アウェナ ストリゴサ	草姿、最下位葉の葉しょうの毛、最下位葉の幅、止め葉下の葉身の周縁の毛、止め葉が反曲した植物体の出現頻度、止め葉の長さ、止め葉の幅、出穂期、茎の最上節のアントシアニンの着色、茎の最上節の直径、茎の最上節間のろう質、芒の長さ、芒のアントシアニンの着色、包穎のろう質、茎の最上節間の長さ、穂の分枝の向き、包穎の長さ、止め葉の葉しょうのろう質、草丈、穂の長さ、第一穎果の外穎の長さ、原麦粒の外穎の色
トックリラン	(略)
(略)	(略)
ヒオウギ	(略)
ヒナギク(デージー)	(略)
トウガン	(略)
メギ	(略)
(略)	(略)
テンサイ	(略)
ヒデンス(センダングサ)	(略)
シラン	(略)
(略)	(略)
カラシナ	(略)
ナタネ	(略)
ハクラン	(略)
ハボタン	(略)
(略)	(略)
ケール(ハボタンを除く。)	(略)
(略)	(略)
在来ナタネ(ハクサイ及びカブを除く。)	(略)

(新設)	(新設)
とっくりらん	(略)
(略)	(略)
ひおうぎ	(略)
ひなぎく(デージー)	(略)
とうがん	(略)
めぎ	(略)
(略)	(略)
てんさい	(略)
ヒデンス(せんだんぐさ)	(略)
しらん	(略)
(略)	(略)
からしな	(略)
なたね	(略)
はくらん	(略)
はボタン	(略)
(略)	(略)
ケール	(略)
(略)	(略)
在来なたね(はくさい及びかぶを除く。)	(略)

ハクサイ	(略)
(略)	(略)
ミシマサイコ	(略)
(略)	(略)
キンセンカ	(略)
カリブラコア	草姿、草丈、茎の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の先端の形、葉の斑の有無、葉の主な色、小花柄の長さ、がく片の長さ、がく片の幅、花型、花の幅、花の切れ込み、花の脈、花の喉部の主な色、花の喉部の主な色の大きさ、花の喉部の主な色の型、花の喉部の斑紋、花の喉部の斑紋の色、花の主な色、花の二次色、花の二次色の分布、開花初期の花の主な色、開花後期の花の主な色、生育期間中の花色の変化、花冠裂片の先端の形、花筒の内面の主な色、花筒の内面の脈
(略)	(略)
エゾギク	草丈、株幅、一次側枝の数、二次側枝の数、一次側枝の発生位置、節数、茎のアントシアニンの着色、一次側枝の長さ、一次側枝の主茎に対する角度、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、頭花の型、舌状花の数、頭花の直径、頭花の高さ、外側の舌状花の長さ、外側の舌状花の幅、外側の舌状花の長さ／幅、外側の舌状花の形、外側の舌状花の縦断面の湾曲、外側の舌状花の横断面の形、外側の舌状花の表面の主な色、外側の舌状花の表面の二次色、外側の舌状花の表面の二次色の分布、外側の舌状花の裏面の主な色、内側の舌状花の形（八重品種に限る。）、内側の舌状花の縦断面の湾曲（八重品種に限る。）、内側の舌状花の横断面の形（八重品種に限る。）、内側の舌状花の表面の主な色（八重品種に限る。）、内側の舌状花の表面の二次色（八重品種に限る。）、内側の舌状花の表面の二次色の分布（八重品種に限る。）、内側の舌状花の裏面の主な色（八重品種に限る。）、花盤の型、花盤の直径、花盤の中央部の色、管状花の色、総ほうの直径、頭花の直径に対する総ほう部の大きさ、開花始め
ツバキ（茶を除く。）	(略)
(略)	(略)
ノウゼンカズラ	(略)
(略)	(略)
アサ	(略)
トウガラシ	(略)

はくさい	(略)
(略)	(略)
みしまさいこ	(略)
(略)	(略)
きんせんか	(略)
カリブラコア	草姿、草丈、茎の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形、葉身の斑の有無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る。）、小花柄の長さ、がく片の長さ、がく片の幅、がく片のアントシアニン着色の有無、花型、花の直径、花の切れ込みの強弱、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の三次色、花冠裂片の表面の脈の明瞭度、花冠裂片の先端の形、花筒の内面の主な色、花筒の内面の脈の明瞭度
(略)	(略)
えぞきく（旧アスター）	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の長さ、茎の色、分枝性、節数、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の光沢及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の大きさ、舌状花の重ねの程度、舌状花数、管状花部の大きさ、管状花数、花弁の形、花弁の大きさ、花弁の色、花の中心部の色、花盤の色、花たくの大きさ、総ほうの大きさ、総ほう片数、花首の長さ及び花首の太さ 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
つばき（茶を除く。）	(略)
(略)	(略)
のうぜんかずら	(略)
(略)	(略)
あさ	(略)
とうがらし	(略)

オオシマカンスゲ	(略)
(略)	(略)
ベニバナ	(略)
ダンギク (カリガネソウ)	(略)
クリ	(略)
ニチニチソウ	(略)
(略)	(略)
ケイトウ	(略)
ヤグルマギク	(略)
(略)	(略)
ケラトスティグマ ウィルモッティアヌ ム (ルリマツリモド キ)	(略)
(略)	(略)
ヒノキ	(略)
ヌマヒノキ	(略)
(略)	(略)
ロウバイ	(略)
ヒトツバタゴ	(略)
オリヅルラン	(略)
(略)	(略)
キク	(略)
(略)	(略)
クスノキ	(略)
ホウショウ	(略)
(略)	(略)

おおしまかんすげ	(略)
(略)	(略)
べにばな	(略)
だんぎく (かりがね そう)	(略)
くり	(略)
にちにちそう (旧ビ ンカ)	(略)
(略)	(略)
けいとう	(略)
やぐるまぎく (セン トウレア)	(略)
(略)	(略)
ケラトスティグマ ウィルモッティアヌ ム (るりまつりもど き)	(略)
(略)	(略)
ひのき	(略)
ぬまひのき	(略)
(略)	(略)
ろうばい	(略)
ひとつばたご	(略)
おりづるらん	(略)
(略)	(略)
きく	(略)
(略)	(略)
くすのき	(略)
ほうしょう	(略)
(略)	(略)

香酸カンキツ類	(略)
ブantan類	(略)
その他カンキツ類	(略)
ウンシュウミカン	(略)
オキナワモズク	(略)
クラークア アモエナ	(略)
クレマチス	草型、草姿（無つる性品種に限る。）、草勢（つる性品種に限る。）、新しゅうの毛の有無、新しゅうの毛の粗密、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の切れ込みの有無、葉身の裂片の数、葉身の切れ込みの深さ、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の表面のしわ、花の着き方、着花の位置、小花柄の長さ、花の向き、花型、花の直径、花の形（一重又は半八重品種に限る。）、花の側面の形（車形の品種に限る。）、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）、がく片の着き方（車形の品種に限る。）、花の香り、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の横断面の形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）、がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）、がく片の先端部の形、がく片の基部の形、がく片の周縁部の波打ち、がく片の縦軸方向のねじれの有無、がく片の縦軸方向のねじれの強弱、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）、がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の裏面の色数、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）、がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）、弁化した仮雄ずいの有無、弁化した仮雄ずいの多少、弁化した仮雄ずいの主な色、花糸の色、やくの色、柱頭の色、花柱の色、開花習性、開花始期
セイヨウフウチョウソウ(クレオメソウ)	(略)
ボタンクサギ	(略)
(略)	(略)
サトイモ	(略)

香酸かんきつ類	(略)
ぶんたん類	(略)
その他かんきつ類	(略)
温州みかん	(略)
おきなわもずく	(略)
クラークア アモエナ(旧ゴデチア)	(略)
クレマチス	草型、草姿（無つる性品種に限る。）、草勢（つる性品種に限る。）、新しゅうの毛の有無、新しゅうの毛の粗密、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の切れ込みの有無、葉身の裂片の数（ <u>切れ込みのある品種に限る。</u> ）、葉身の切れ込みの深さ（ <u>切れ込みのある品種に限る。</u> ）、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の表面のしわの強弱、花の着き方、小花柄の長さ、花の向き、花型、花の直径、花の形（一重又は半八重品種に限る。）、花の側面の形（車形の品種に限る。）、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）、がく片の着き方（車形の品種に限る。）、花の香りの有無、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の横断面の形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）、がく片の先端の形、がく片の基部の形、がく片の周縁部の波打ちの強弱、がく片の縦軸に沿ったねじれの有無、がく片のねじれの強弱（ <u>がく片の縦軸に沿ったねじれのある品種に限る。</u> ）、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色（複色品種に限る。）、弁化した仮雄ずいの有無、弁化した仮雄ずいの数、弁化した仮雄ずいの主な色、花糸の色、やくの色、柱頭の色、花柱の色、開花習性、開花始期
せいようふうちょうそう(クレオメそう)	(略)
ばたんくさぎ	(略)
(略)	(略)
さといも	(略)

(略)	(略)
ツユクサ	(略)
(略)	(略)
ハグマノキ	(略)
クラスラ コッキ ネア	(略)
クラスラ オバタ	(略)
(略)	(略)
スギ	(略)
ミツバ	(略)
(略)	(略)
カボチャ	(略)
(略)	(略)
ツタガラクサ	(略)
(略)	(略)
ジンチョウゲ	(略)
(略)	(略)
ハンカチノキ	(略)
(略)	(略)
コマクサ	(略)
(略)	(略)
ハエトリグサ	(略)
(略)	(略)
ヤマノイモ	(略)
カキノキ	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)

(略)	(略)
つゆくさ	(略)
(略)	(略)
はぐまのき	(略)
クラスラ コッキ ネア (旧ロケア コッキネア)	(略)
クラスラ オバタ (旧クラスラ ポ ルツラケア)	(略)
(略)	(略)
すぎ	(略)
みつば	(略)
(略)	(略)
かぼちゃ	(略)
(略)	(略)
つたがらくさ	(略)
(略)	(略)
じんちょうげ	(略)
(略)	(略)
ハンカチのき	(略)
(略)	(略)
こまくさ	(略)
(略)	(略)
はえとりぐさ	(略)
(略)	(略)
やまのいも	(略)
かきのき	(略)
(略)	(略)
デンドロビウム	(略)

ハウチワノキ	樹高、樹幅、節間長、枝の色、枝の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、夏季の葉の表面の色、夏季の葉の裏面の色、冬季の葉の表面の色、冬季の葉の裏面の色、葉の先端部の形、葉の周縁の波打ち、花柄の色
(略)	(略)
ヒエ	(略)
ホテイアオイ	(略)
エソウコギ	(略)
(略)	(略)
ビワ	(略)
(略)	(略)
ツルマサキ	(略)
マサキ	(略)
(略)	(略)
ハマヒサカキ	(略)
(略)	(略)
トルコギキョウ	(略)
(略)	(略)
ソバ	(略)
(略)	(略)
イチジク	(略)
ゴムノキ	(略)
インドボダイジュ	(略)
(略)	(略)
キンカン	(略)
イチゴ	(略)
(略)	(略)
フリージア ラクサ	(略)
(略)	(略)

(新設)	(新設)
(略)	(略)
ひえ	(略)
ほていあおい	(略)
えぞうこぎ	(略)
(略)	(略)
びわ	(略)
(略)	(略)
つるまさき	(略)
まさき	(略)
(略)	(略)
はまひさかき	(略)
(略)	(略)
トルコぎきょう	(略)
(略)	(略)
そば	(略)
(略)	(略)
いちじく	(略)
ゴムのき	(略)
インドぼだいじゅ	(略)
(略)	(略)
きんかん	(略)
いちご	(略)
(略)	(略)
フリージア ラクサ (旧ラベルージア ラクサ)	(略)
(略)	(略)

<u>テンニンギク</u>	(略)
(略)	(略)
<u>クチナシ</u>	(略)
<u>ヤマモモソウ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>フウロソウ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>シュンギク</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ダイズ</u>	(略)
<u>ウラルカンゾウ</u>	(略)
<u>ゴンフレナ (センニ チコウ)</u>	(略)
<u>アジアワタ</u>	(略)
<u>ケブカワタ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>カスミソウ</u>	(略)
<u>マンサク</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ハスノハギリ</u>	(略)
<u>ホイヘラ (ツボサン ゴ)</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ムギワラギク (ヘリ クリサム)</u>	(略)
<u>ヒマワリ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ニオイムラサキ</u>	(略)
<u>オオムギ</u>	(略)

<u>てんにんぎく</u>	(略)
(略)	(略)
<u>くちなし</u>	(略)
<u>やまももそう</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ふうろそう</u>	(略)
(略)	(略)
<u>しゅんぎく</u>	(略)
(略)	(略)
<u>大豆</u>	(略)
<u>ウラルかんぞう</u>	(略)
<u>ゴンフレナ (せん にちこう)</u>	(略)
<u>アジアわた</u>	(略)
<u>けぶかわた</u>	(略)
(略)	(略)
<u>かすみそう</u>	(略)
<u>まんさく</u>	(略)
(略)	(略)
<u>はすのはぎり</u>	(略)
<u>ホイヘラ (つぼさん ご)</u>	(略)
(略)	(略)
<u>むぎわらぎく (ヘリ クリサム)</u>	(略)
<u>ひまわり</u>	(略)
(略)	(略)
<u>においむらさき</u>	(略)
<u>大麦</u>	(略)

<u>ギボウシ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>アジサイ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>アマミヒイラギモチ</u>	(略)
<u>ソヨゴ</u>	(略)
<u>シキミ</u>	(略)
<u>ホウセンカ</u> (ニューギニアインパチェンス及び <u>アフリカホウセンカ</u> を除く。)	(略)
(略)	(略)
<u>アフリカホウセンカ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>カンショ</u>	(略)
<u>コダチアサガオ</u>	樹高、茎の太さ、茎の色、茎の木質化、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉柄の長さ、葉柄の色、花の大きさ、花の長さ、花冠裂片の主な色、花冠裂片の二次色の有無、花冠裂片の二次色、花冠の嚢の色、花冠の喉部の色、花冠周縁の凹みの深さ、花冠周縁部の鋸歯の深さ、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱、花冠裂片のひだの強弱、花筒の長さ、花筒の幅、花筒の外面の色、花筒の内面基部の色、花柄の長さ、小花柄の長さ、開花始期
<u>アサガオ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>アイリス</u> (ピアデッドアイリス、球根アイリス及び <u>カキツバタ</u> を除く。)	(略)
<u>カキツバタ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ソケイ</u> (ヤスミヌム)	(略)
(略)	(略)

<u>ぎぼうし</u>	(略)
(略)	(略)
<u>あじさい</u>	(略)
(略)	(略)
<u>あまみひいらぎもち</u>	(略)
<u>そよご</u>	(略)
<u>しきみ</u>	(略)
<u>ほうせんか</u> (ニューギニアインパチェンス及び <u>アフリカほうせんか</u> を除く。)	(略)
(略)	(略)
<u>アフリカほうせんか</u>	(略)
(略)	(略)
<u>かんしょ</u>	(略)
(新設)	(新設)
<u>あさがお</u>	(略)
(略)	(略)
<u>アイリス</u> (ピアデッドアイリス、球根アイリス及び <u>かきつばた</u> を除く。)	(略)
<u>かきつばた</u>	(略)
(略)	(略)
<u>そけい</u> (ヤスミヌム)	(略)
(略)	(略)

イブキ	(略)
コエビソウ	(略)
(略)	(略)
ユウガオ	(略)
サルスベリ	(略)
(略)	(略)
カラマツ	(略)
(略)	(略)
ゲツケイジュ	(略)
(略)	(略)
レケナウルティア (ハツコイソウ)	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)
イワナンテン	樹姿、樹高、株幅、冬期の葉群のアントシアニンの着色、新しょう の枝の色、新しょうの葉の主な色、新しょうの葉の斑の有無、新し うの葉の斑の色、節間長、枝の太さ、枝のアントシアニンの着色、 葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉 身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、 葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の毛の有無、葉身の鋸歯の深 さ、葉身の凹凸、葉身のねじれ、葉柄の長さ、花序の長さ、ほうの 色、ほうの毛の多少、がくの色、花冠の長さ、花冠筒部の幅、花冠 筒部の開口部の幅、花冠筒部の幅／開口部の幅、花冠裂片の反りの 強弱、花冠の色、開花始期
(略)	(略)
ネズミモチ	(略)
ユリ	(略)
リモニウム	(略)
(略)	(略)
ヤブラン	(略)
(略)	(略)

いぶき	(略)
こえびそう	(略)
(略)	(略)
ゆうがお	(略)
さるすべり	(略)
(略)	(略)
からまつ	(略)
(略)	(略)
げっけいじゅ	(略)
(略)	(略)
レケナウルティア (はつこいそう)	(略)
(略)	(略)
アメリカイワナンテ ン	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
ねずみもち	(略)
ゆり	(略)
リモニウム (旧ス ターチス)	(略)
(略)	(略)
やぶらん	(略)
(略)	(略)

<u>クロミノウグイスカ</u> <u>グラ</u> (ハスカップ)	(略)
(略)	(略)
<u>センノウ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>リンゴ</u>	(略)
<u>チリソケイ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ハリツルマサキ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ノボタン</u>	(略)
<u>セندان</u>	(略)
<u>ハッカ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>オシロイバナ</u>	(略)
<u>ススキ</u>	(略)
<u>ツルレイシ</u>	(略)
<u>ダイヤモンド</u>	(略)
<u>クワ</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ナンテン</u>	(略)
<u>スイセン</u>	(略)
<u>ハス</u>	(略)
(略)	(略)
<u>フウラン</u>	(略)
(略)	(略)
<u>アマモドキ</u> (ニーレ ンベルギア)	(略)
<u>クロタネソウ</u>	(略)
(略)	(略)

<u>くろみのうぐいすか</u> <u>ぐら</u> (ハスカップ)	(略)
(略)	(略)
<u>せんのう</u>	(略)
(略)	(略)
<u>りんご</u>	(略)
<u>チリそけい</u>	(略)
(略)	(略)
<u>はりつるまさき</u>	(略)
(略)	(略)
<u>のぼたん</u>	(略)
<u>せんだん</u>	(略)
<u>はっか</u>	(略)
(略)	(略)
<u>おしろいばな</u>	(略)
<u>すすき</u>	(略)
<u>つるれいし</u>	(略)
<u>たいまつばな</u>	(略)
<u>桑</u>	(略)
(略)	(略)
<u>なんてん</u>	(略)
<u>すいせん</u>	(略)
<u>はす</u>	(略)
(略)	(略)
<u>ふうらん</u>	(略)
(略)	(略)
<u>あまもどき</u> (ニーレ ンベルギア)	(略)
<u>くろたねそう</u>	(略)
(略)	(略)

スイレン (ヒツジグサ)	(略)
(略)	(略)
セリ	(略)
マツヨイグサ	(略)
(略)	(略)
ジャノヒゲ	(略)
(略)	(略)
稲	しょう葉のアントシアニンの着色、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じ、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色、初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色、初期の外穎頂部のアントシアニンの着色、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じ、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニンの着色、後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色、後期の外穎頂部のアントシアニンの着色、護穎の長さ、護穎の色、籾の千粒重、籾の長さ、籾の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもち病抵抗性、穂いもち病抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病は場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性、高温登熟性、着粒密度

すいれん (ひつじぐさ)	(略)
(略)	(略)
せり	(略)
まつよいぐさ	(略)
(略)	(略)
じゃのひげ	(略)
(略)	(略)
稲	しょう葉のアントシアニン着色の強弱、基部葉の葉しょうの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しょうのアントシアニン着色の有無、葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じの粗密、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じの粗密、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、護穎の長さ、護穎の色、籾の千粒重、籾の長さ、籾の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもち病抵抗性、穂いもち病抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病は場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性

(略)	(略)
ルリトウワタ	(略)
(略)	(略)
シャクヤク	(略)
ボタン	(略)
オタネニンジン	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)
キビ	止め葉の葉しょうの毛、止め葉の姿勢、止め葉のアントシアニン着色の有無、止め葉のアントシアニン着色の強弱、止め葉の長さ、止め葉の幅、 ^{かん} 稈の節数、 ^{かん} 稈の上部の節間の長さ、 ^{かん} 稈の節間の太さ、出穂期、草高、 ^{かん} 稈の長さ、穂首の長さ、穂の分枝(枝梗)の開度、穂の姿勢、穂の型、穂の長さ、穂の幅、穂の粗密、穂のアントシアニン着色の有無、穂の枝梗の湾曲、穂の枝梗の基部の肥大構造の数、穂の一次枝梗の長さ、小穂の外形、小穂の黄色味の濃淡、 ^{えい} 穎のアントシアニンの着色、柱頭の色、 ^{えい} 穎果の大きさ、 ^{えい} 穎果の形、 ^{えい} 穎果の色、 ^{えい} 穎果の斑点の有無、 ^{えい} 穎果の斑点の大きさ、 ^{えい} 穎果の千粒重、玄穀粒の色(無精白)、玄穀粒のへその色の濃淡、胚乳の型
(略)	(略)
ベラルゴニウム グ ランディフロラム	草丈、株幅、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の基部の重なり、葉身の切れ込み、葉身の周縁部の切れ込み、葉身の斑の有無、葉身の緑色の濃淡、花の長さ、花の幅、がく片の長さ、がく片の幅、小花柄のアントシアニンの着色、上部花卉の周縁部の波打ち、上部花卉の周縁部の主な色、上部花卉の周縁部と中間部の間の主な色、上部花卉の中間部の主な色、上部花卉の中央の模様、上部花卉の基部の複色部、上部花卉の基部の複色部の色、下部花卉の周縁部の主な色、下部花卉の周縁部と中間部の間の主な色、下部花卉の中間部の主な色、下部花卉の中央の模様、下部花卉の基部の複色部、下部花卉の基部の複色部の色
(略)	(略)
ヒメツルソバ	(略)
シソ	(略)

(略)	(略)
るりとうわた	(略)
(略)	(略)
しゃくやく	(略)
ぼたん	(略)
おたねにんじん	(略)
(略)	(略)
パニカム	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
ベラルゴニウム グ ランディフロラム	植物体の高さ、植物体の幅、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の基部の重なり、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの長さ、葉の周縁の欠刻の深さ、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、小花柄の色、がく片の長さ、がく片の幅、がく片外側のアントシアニン着色の有無、花の直径、花卉の波打ちの有無、花卉の波打ちの強弱、上部花卉の幅、上部花卉の模様の有無、上部花卉の模様の形、上部花卉の模様の大きさ、上部花卉の表面の周縁部の色、上部花卉の表面の周縁部と模様の間の色、上部花卉の表面の中間部の色(模様のない品種に限る。)、上部花卉の模様の色、上部花卉の裏面の色、下部花卉の模様の有無、下部花卉の模様の形、下部花卉の模様の大きさ、下部花卉の表面の周縁部の色、下部花卉の表面の周縁部と模様の間の色、下部花卉の表面の中間部の色、下部花卉の模様の色、下部花卉の裏面の色、開花始期
(略)	(略)
ひめつるそば	(略)
しそ	(略)

フキ	(略)
(略)	(略)
ベニバナインゲン	(略)
インゲンマメ	(略)
キリンソウ	(略)
(略)	(略)
イワダレソウ	(略)
ホオズキ	(略)
テマリシモツケ	(略)
カクトラノオ	草丈、茎の太さ、茎の色、節数、節間長、側枝の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の波打ち、葉身の色、葉身の斑の有無、花穂の数、花穂の長さ、花穂の幅、がくの主な色、花の長さ、花冠の幅、花冠の縦径、花冠筒部の幅、花冠筒部の縦径、花冠筒部外面の側部の色、花冠筒部の内面の模様の有無、花冠筒部の内面の模様の分布、上唇弁の外面の主な色、下唇弁中央裂片の反りの強弱、下唇弁中央裂片の内面の主な色、下唇弁中央裂片の内面の模様の色、開花始期
アセビ	(略)
ビレアデブレッサ	草丈、側枝の粗密、側枝の長さ、側枝の太さ、側枝の毛の有無、側枝のアントシアニンの着色、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉柄の長さ、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の周縁の鋸歯の有無、葉身の周縁の鋸歯の分布、葉身の周縁の鋸歯の深さ、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面の斑の主な色、葉身の裏面の色
アカマツ	(略)
ゴヨウマツ	(略)
クロマツ	(略)
ボタンウキクサ	(略)
エンドウ	(略)
(略)	(略)
キキョウ	(略)

ふき	(略)
(略)	(略)
べにばないんげん	(略)
いんげんまめ	(略)
きりんそう	(略)
(略)	(略)
いわだれそう	(略)
ほおずき	(略)
てまりしもつけ	(略)
(新設)	(新設)
あせび	(略)
(新設)	(新設)
あかまつ	(略)
ごようまつ	(略)
くろまつ	(略)
ばたんうきくさ	(略)
えんどう	(略)
(略)	(略)
ききょう	(略)

チューベロース	草丈、葉群の姿勢、葉群の高さ、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の斑の色、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉の長さ／幅、ほう葉裏面の色、花序の長さ、1花序の花らい数、花序軸の屈曲、花序軸のアントシアニンの着色、つぼみの主な色、花型、花の向き、花の直径、花被筒部の長さ、花被筒部の直径、花被筒部の湾曲、花被筒部の主な色、花被片の数、中央外花被片の長さ、中央外花被片の幅、中央外花被片の長さ／幅、中央外花被片の先端部の形、中央外花被片の主な色、中央外花被片の複色の有無、中央外花被片の複色、花の香り
アマドコロ	(略)
(略)	(略)
ボリスキアス スクテラリア	(略)
(略)	(略)
イヌマキ	(略)
(略)	(略)
ウチョウラン	(略)
ハコヤナギ (ポプラ)	(略)
(削る)	(削る)
(削る)	(削る)
マツバボタン	(略)
スベリヒユ	(略)
オヘビイチゴ	ほふく枝の数、ほふく枝の長さ、葉柄の長さ、葉の大きさ、葉の長さ／幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、頂小葉の長さ、頂小葉の幅、花の数、花型、花の直径、花弁の重なり (一重品種に限る。)、花弁の先端部の形、花弁の色、開花始期
(略)	(略)

(新設)	(新設)
あまどころ	(略)
(略)	(略)
ボリスキアス スクテラリア (旧ボリスキアス バルフォリアナ)	(略)
(略)	(略)
いぬまき	(略)
(略)	(略)
うちょうらん	(略)
はこやなぎ(ポプラ)	(略)
あさくさのり	一 糸状体の色、葉形、葉長、葉色及び葉の厚さ 二 ねん性、栄養繁殖性、塩分適応性、温度適応性、流失抵抗性、耐乾性、栄養要求性及び耐病性
すさびのり	一 糸状体の色、葉形、葉長、葉色及び葉の厚さ 二 ねん性、栄養繁殖性、塩分適応性、温度適応性、流失抵抗性、耐乾性、栄養要求性及び耐病性
まつばたん	(略)
すべりひゆ	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)

プリムラ (在来サクラソウを除く。)	(略)
在来サクラソウ	(略)
(略)	(略)
ツタ	(略)
サクラ	(略)
スモモ (ニホンスモモを除く。)	(略)
アンズ	(略)
オウトウ (甘果)	(略)
ウメ	(略)
モモ及びネクタリン	(略)
ニホンスモモ	(略)
ユスラウメ	(略)
(略)	(略)
シカクマメ	(略)
アサクサノリ	一 糸状体の色、葉形、葉長、葉色及び葉の厚さ 二 ねん性、栄養繁殖性、塩分適応性、温度適応性、流失抵抗性、耐乾性、栄養要求性及び耐病性
スサビノリ	一 糸状体の色、葉形、葉長、葉色及び葉の厚さ 二 ねん性、栄養繁殖性、塩分適応性、温度適応性、流失抵抗性、耐乾性、栄養要求性及び耐病性
セイヨウナシ	(略)
ニホンナシ	(略)
(略)	(略)
ジオウ	(略)
シャリンバイ	(略)
(略)	(略)
ダイオウ	(略)
(略)	(略)

プリムラ (在来さくらそうを除く。)	(略)
在来さくらそう	(略)
(略)	(略)
つた	(略)
さくら	(略)
すもも (日本すももを除く。)	(略)
あんず	(略)
おうとう (甘果)	(略)
うめ	(略)
もも及びネクタリン	(略)
日本すもも	(略)
ゆすらうめ	(略)
(略)	(略)
しかくまめ	(略)
(新設)	(新設)
(新設)	(新設)
西洋なし	(略)
日本なし	(略)
(略)	(略)
じおう	(略)
じゃりんばい	(略)
(略)	(略)
だいおう	(略)
(略)	(略)

ハナカンザシ (ローダンセ)	草姿、草丈、株幅、分枝の粗密、茎の太さ、茎の色、茎のアントシアニン着色の有無、葉の着生、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の縦方向の反り、葉の色、葉の斑の有無、葉の毛の粗密、花の着き方、花らしいの形、花らしいの長さ、花らしいの色、頭花の側面の形、頭花の直径、花盤の直径、花盤の色、総ほう片の数、総ほう片の長さ、総ほう片の幅、総ほう片の形、総ほう片の先端の形、総ほう片の色数、総ほう片の主な色、総ほう片の二次色、総ほう片の二次色の分布
(略)	(略)
ツツジ	(略)
(略)	(略)
ジュズサンゴ	(略)
バラ	(略)
(略)	(略)
キイチゴ類 (ラズベリーを除く。)	(略)
(略)	(略)
ルドベキア	(略)
(略)	(略)
サトウキビ	(略)
クワイ	(略)
(略)	(略)
サルビア	草姿、草丈、株幅、枝の粗密、茎のアントシアニンの着色、茎の毛、葉の型、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉身の斑の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の分布、葉身の毛、葉身の凹凸、葉身の周縁の鋸歯、葉身の周縁の波打ち、花序の長さ、花序の節間長、花序の1節当たりの小花の数、花序の側枝、花序の先端の向き、ほうの残存性、ほうの長さ、ほうの主な色、がくの長さ、がくの主な色、がくの毛、花冠の長さ、花冠の高さ、花冠筒部の長さ、花冠筒部の主な色、上唇弁の主な色、上唇弁の二次色、上唇弁の毛、下唇弁の幅、下唇弁の花冠筒部に対する向き、下唇弁の主な色、下唇弁の二次色、下唇弁の二次色の分布、下唇弁の周縁の波打ち
(略)	(略)

はなかんざし (ローダンセ)	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、とげの有無、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少、葉柄の太さ及び葉柄の長さ 三 花房又は花穂の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、がくの形、がくの大きさ、がくの色、雌雄ずいの形、雌雄ずいの数、やくの色、花柄の太さ、花柄の長さ、一花房又は一花穂当たりの花数及び花の香り 四 開花期、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
(略)	(略)
つつじ	(略)
(略)	(略)
じゅずさんご	(略)
ばら	(略)
(略)	(略)
きいちご類 (ラズベリーを除く。)	(略)
(略)	(略)
ルドベキア	(略)
(略)	(略)
さとうきび	(略)
くわい	(略)
(略)	(略)
サルビア	一 草型及び草丈 二 茎の太さ、茎の色、茎の毛の多少、分枝性、節間長、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花穂の形、花穂長、花間長、一花穂の花数、花冠の形、花冠の大きさ、花冠の色、花冠の毛の多少、がくの形、がくの大きさ及びがくの色 四 開花期、耐寒性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
(略)	(略)

ウレモコウ	(略)
(略)	(略)
ナンキンハゼ	(略)
センリョウ	(略)
ダイモンジソウ	(略)
セイヨウクモマグサ	(略)
スカビオサ (マツムシソウ)	(略)
(略)	(略)
シェフレラ エレガ ンティッシマ	(略)
シュルンベルゲラ	(略)
(略)	(略)
ゴマ	(略)
アワ	(略)
(略)	(略)
シンニンギア	(略)
ミヤマシキミ	(略)
(略)	(略)
ナス(トマト、ペピー ノ、ソラヌム、ベル ウィアヌム、フユサ ンゴ及びパレイショ を除く。)	(略)
(略)	(略)
フユサンゴ	(略)
パレイショ	(略)
(略)	(略)

われもこう	(略)
(略)	(略)
なんきんはぜ	(略)
せんりょう	(略)
だいもんじそう	(略)
せいようくもまぐさ	(略)
スカビオサ (まつむ しそう)	(略)
(略)	(略)
シェフレラ エレガ ンティッシマ (旧 ディジゴテカ エレ ガンティッシマ)	(略)
シュルンベルゲラ (旧ジゴカクタス)	(略)
(略)	(略)
ごま	(略)
あわ	(略)
(略)	(略)
シンニンギア (旧グ ロキシニア)	(略)
みやましきみ	(略)
(略)	(略)
なす(トマト、ペピー ノ、ソラヌム、ベル ウィアヌム、ふゆさ んご及びばれいしょ を除く。)	(略)
(略)	(略)
ふゆさんご	(略)
ばれいしょ	(略)
(略)	(略)

ナナカマド	(略)
(略)	(略)
シモツケ	(略)
(略)	(略)
ソルガム	幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色、葉身のアントシアニンの着色、分げつ数、葉身の緑色の濃淡、葉の中肋の色、葉の中肋の変色の範囲、出穂期、穎のアントシアニンの着色、柱頭のアントシアニンの着色、柱頭の色、柱頭の長さ、小花の長さ、自家稔性、開花終期の穎の色、開花終期の穂の粒着の粗密、護穎の芒の長さ、葯の色、草丈、稈の直径、稈の節間の着色の有無、葉身の長さ、葉身の幅、穂の長さ、穂首の長さ、穂の分枝の長さ、穂の粗密、穂の最大幅の位置、穎の色、穎の長さ、子実の色、子実の千粒重、正面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色、日長感応性、茎の甘味、紫斑点病抵抗性
(略)	(略)
エゴノキ	(略)
(略)	(略)
センブリ	(略)
(略)	(略)
ハシドイ	樹姿、樹高、側枝の粗密、花序の数、枝の色、葉の型、葉の切れ込みの深さ、葉の切れ込みの数、葉の形、葉の基部の形、葉の主な色、葉の二次色、つぼみの色、花序の向き、花序の長さ、花序の型、花序の花の粗密、花の香り、花型、花冠の直径、花冠裂片の数、花冠の輪生の距離、花冠裂片の向き、花冠裂片の形、花冠裂片の波打ち、花冠裂片の縁の湾曲、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の内面の主な色、花冠裂片の内面の二次色、花筒の外面の色、やくの色、開花始期

ななかまど	(略)
(略)	(略)
しもつけ	(略)
(略)	(略)
ソルガム	幼苗の子葉しょうのアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の裏面のアントシアニン着色の強弱、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱、葉身のアントシアニン着色の強弱、出穂期、出穂期の葉の高さ、出穂期の葉身の緑色の濃淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡、開花時の苞穎の色、開花時の穎のアントシアニン着色の強弱、開花時の穎の毛じのアントシアニン着色の強弱、開花時の護穎の芒の着生の強弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱、柱頭の長さ、小花の小花柄を含む長さ、開花終期の穂の粒着の粗密、開花終期の雄ずいの色、成熟期の草丈、稈の直径、成熟期の先端から三番目の葉の長さ、成熟期の葉の幅、成熟期の穂の長さ、成熟期の穂の分枝の長さ、成熟期の穂の粗密、成熟期の穂の形、成熟期の穂首の長さ、成熟期の穎の色、成熟期の穎の長さ、脱穀後の穎果の色、子実の千粒重、正面から見た子実の形、側面から見た子実の形、子実の胚痕の大きさ、子実の種皮によって覆われた割合、子実のタンニン含量、胚乳の質（縦断面）、胚乳のガラス質の色、茎の甘味、紫斑点病抵抗性
(略)	(略)
えごのき	(略)
(略)	(略)
せんぶり	(略)
シンゴナンサス ク リサンサス	(略)
(新設)	(新設)

サンユウカ	(略)
(略)	(略)
ナツシロギク	(略)
イチイ	(略)
(略)	(略)
アスナロ	(略)
(略)	(略)
ディランジア	(略)
(略)	(略)
ユウギリソウ	(略)
テイカカズラ	(略)
(略)	(略)
アカクローバ	(略)
シロクローバ	(略)
(略)	(略)
コムギ	(略)
マカロニコムギ	子葉しょうのアントシアニンの着色、草姿、反曲した止め葉を持つ <u>個体の出現頻度、出穂期、止め葉の葉耳のアントシアニンの着色、</u> <u>止め葉の葉しょうの白粉、止め葉の白粉、^{かん}稈の最上部の節に着生す</u> <u>る毛、穂首の白粉、穂の白粉、草丈、^{かん}稈の長さ、穂の^{のぎ}芒の着生状態、</u> <u>穂の先端の^{のぎ}芒の長さ、^{のぎ}芒の長さ、^{えい}護穎の形、^{えい}護穎の肩部の形、^{えい}護穎</u> <u>の肩部の幅、^{えい}護穎のくちばしの長さ、^{えい}護穎のくちばしの曲がり方、</u> <u>^{えい}護穎の外側表面の毛の有無、穂首直下の節間の^{のぎ}髓の厚さ、^{のぎ}芒の色、</u> <u>穂の長さ、穂の着色、成熟期、^{のぎ}稈の色、穂の粒着の粗密、原麦粒の</u> <u>刷毛の長さ、原麦粒の形、原麦粒の色、原麦粒のフェノール反応に</u> <u>よる着色、千粒重、まき性、Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の</u> <u>発現、Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現</u>

さんゆうか	(略)
(略)	(略)
なつしろぎく	(略)
いちい	(略)
(略)	(略)
あすなろ	(略)
(略)	(略)
ディランジア (旧チ ランドシア)	(略)
(略)	(略)
ゆうぎりそう	(略)
ていかかずら	(略)
(略)	(略)
あかクローバ	(略)
しろクローバ	(略)
(略)	(略)
小麦	(略)
(新設)	(新設)

キンレンカ	(略)
(略)	(略)
アキニレ	(略)
(略)	(略)
オオデマリ	(略)
ソラマメ	(略)
小豆	(略)
ピンカ	(略)
スミレ	(略)
(略)	(略)
セイヨウニンジンボク	(略)
ブドウ	(略)
(略)	(略)
ワサビ	(略)
タニウツギ	(略)
(略)	(略)
オランダカイウ	(略)
トウモロコシ	(略)
ショウガ	(略)
ヒャクニチソウ	(略)
シバ	(略)
(略)	(略)

きんれんか	(略)
(略)	(略)
あきにれ	(略)
(略)	(略)
おおでまり	(略)
そらまめ	(略)
アズキ	(略)
ピンカ (旧つるにちにちそう)	(略)
すみれ	(略)
(略)	(略)
せいようになじんぼく	(略)
ぶどう	(略)
(略)	(略)
わさび	(略)
たにうつぎ	(略)
(略)	(略)
オランダかいう	(略)
とうもろこし	(略)
しょうが	(略)
ひゃくにちそう	(略)
しば	(略)
(略)	(略)

○国土交通省告示第百四十八号
都立公園法施行令（昭和三十一年政令第二百九十号）第二十条第一項第一号の規定に基づき、昭和五十六年建設省告示第千六百二十六号の一部を改正する告示を次のように定める。
平成三十年三月二十三日
昭和五十六年建設省告示第千六百二十六号の一部を改正する告示
国土交通大臣 石井 啓一
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後			改正前		
公 園 名	設置し、又は管理する者	公 園 施 設	公 園 名	設置し、又は管理する者	公 園 施 設
(略)			(略)		