

農林水産省告示（重要な形質）の制定について

令和3年3月15日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、令和3年6月10日付け農林水産省告示第1002号で平成20年4月1日付け農林水産省告示第508号（種苗法第2条第7項の規定に基づき重要な形質を定める件）の一部を改正し、施行。

(参考)

品種登録ホームページ：<http://www.hinshu2.maff.go.jp/>

対象大会関係施設の区域	岩手県遠野市	上組町、穀町、材木町、中央通り、遠野町、松崎町、白岩町、十地割、十一地割及び十三地割から十七地割まで、松崎町、白岩町、森並にこれらの区域に介在する道路の区域（いずれも次の図面に示す部分に限る。）
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域	岩手県遠野市	この表の対象大会関係施設の区域及びその周囲おおむね三百メートルの次の図面に示す地域
備考	「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。	

四十六 岩手県紫波郡紫波町聖火リレールート

期間	令和三年六月十八日		
対象大会関係施設の所在地	岩手県紫波郡紫波町	桜町一丁目、桜町田頭、桜町中桜紫波中央駅前一丁目、二丁目、四丁目及び五丁目、日詰中新田、日詰丸盛並びに日詰西三丁目から六丁目まで	
対象大会関係施設の区域	岩手県紫波郡紫波町	桜町一丁目、桜町田頭、桜町中桜紫波中央駅前一丁目、二丁目、四丁目及び五丁目、日詰中新田、日詰丸盛、日詰西三丁目から六丁目まで並びにこれらの区域に介在する道路の区域（いずれも次の図面に示す部分に限る。）	
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域	岩手県紫波郡紫波町	この表の対象大会関係施設の区域及びその周囲おおむね三百メートルの次の図面に示す地域	
備考	「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。		

○農林水産省告示第十二号

種苗法（平成十年法律第八十三号）第二条第七項の規定に基づき、平成二十年四月一日農林水産省告示第五百三十四号（種苗法第二条第七項の規定に基づき重要な形質を定める件）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和三年六月十日

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

農林水産大臣 野上浩太郎

改 正 後	
区 分	重 要 な 形 質
(略)	(略)
あらげきくらげ	菌糸密度、菌糸表面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長速度（15℃/日）、菌糸体の温度別成長速度（20℃/日）、菌糸体の温度別成長速度（25℃/日）、菌糸体の温度別成長速度（30℃/日）、菌糸体の温度別成長速度（35℃/日）、菌糸の形、菌糸の直径、菌糸の厚さ、菌糸の周縁部の形、菌糸表面の光沢の有無、菌糸の硬さ、菌糸の表面の地色、菌糸表面のしわの有無、菌糸表面のしわの形、菌糸表面の毛の有無、菌糸

四十七 岩手県紫波郡矢巾町聖火リレールート

期間	令和三年六月十八日
対象大会関係施設の所在地	岩手県紫波郡矢巾町 医大通、駅東一丁目、西徳田第一地割並びに又兵工新田第七地割及び第八地割
対象大会関係施設の区域	医大通、駅東一丁目、西徳田第一地割、又兵工新田第七地割及び第八地割並びにこれらの区域に介在する道路の区域（いずれも次の図面に示す部分に限る。）
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域	この表の対象大会関係施設の区域及びその周囲おおむね三百メートルの次の図面に示す地域

四十八 岩手県盛岡市聖火リレールート

期間	令和三年六月十八日		
対象大会関係施設の所在地	岩手県盛岡市	内丸、中央通一丁目及び二丁目、中ノ橋通一丁目、八幡町並びに南大通一丁目	
対象大会関係施設の区域	岩手県盛岡市	内丸、中央通一丁目及び二丁目、中ノ橋通一丁目、八幡町、南大通一丁目並びにこれらの区域に介在する道路の区域（いずれも次の図面に示す部分に限る。）	
対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域	岩手県盛岡市	この表の対象大会関係施設の区域及びその周囲おおむね三百メートルの次の図面に示す地域	
備考	「次の図面」は省略し、その図面を文部科学省に備え置いて縦覧に供する。		

改 正 前	
区 分	重 要 な 形 質
(略)	(略)
あらげきくらげ	一 菌糸の形、菌糸の大きさ、菌糸の色、菌糸の厚さ、菌糸の肉質、菌糸の毛の長さ及び菌糸の毛の多少 二 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 三 乾物率及び収量性

		裏面の毛の長さ、菌さん裏面の毛の色、菌さん裏面の毛の密度、菌さん裏面の毛の質、菌柄状部分の有無、培養開始から収穫までの期間、発生処理から子実体発生までの期間、子実体の乾燥重量、乾燥重量／生重量
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ダツタンソバ	葉の形、葉の大きさ、葉の色、花の色、登熟中の果皮色、草型、草丈、茎の長さ、主茎節数、茎の太さ、茎の色、脱粒の難易、粒の形、粒の長さ、粒の幅、粒の長幅比、完熟粒の果皮色、千粒重、容積重、子実の外観品質、生態型、開花始、開花期、成熟期、生育日数、耐倒伏性、ルチン含量	
(略)	(略)	(略)
えのきたけ	菌叢表面の着色の有無、菌叢表面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長量(10℃)、菌糸体の温度別成長量(15℃)、菌糸体の温度別成長量(20℃)、菌糸体の温度別成長量(25℃)、菌糸体の温度別成長量(30℃)、菌さん肉縁部の巻き込み、菌さんの直径、菌さんの高さ、菌さんの直径／高さ、菌さん表面の色、菌さんの硬さ、ひだの数、菌柄の太さ、菌柄の上部表面の色、菌柄の基部の色、あめ状物質の生成の有無、株の硬さ、菌掻きから子実体発生までの期間、子実体発生から収穫までの期間、菌掻きから収穫までの期間	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たぐの形状及び子実層たぐの色 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色及び菌柄の肉質 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性
(略)	(略)	(略)
カンゾウ	草姿、草丈、根の数、根の太さ、根の表皮の色、根の横断面の黄色系着色の強弱、茎の長さ、茎の太さ、茎の節の長さ、茎基部のアントシアニン着色の強弱、茎中間部のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の粗密、側枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の波打ちの多少、小葉の長さ、小葉の葉身の長さ、小葉の葉身の幅、小葉の葉身の長さ／幅、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の小花の長さ、小花の長さ、小花の幅、花の色、さやの幅、一さや内粒数、ほう茎の早晩、開花の早晩、枯れ上がりの早晩、乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量	草丈、根の数、根の太さ、根の表皮の色、根の横断面の黄色系着色の強弱、茎の数、茎の太さ、節数、茎のアントシアニン着色の強弱、茎の毛の粗密、分枝の数、葉柄の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の長さ／幅、葉の波打ちの強弱、小葉の数、小葉の葉身の長さ、小葉の葉身の幅、小葉の長さ、小葉の長さ／幅、花序の長さ、花序の幅、小花の数、小花の長さ、小花の幅、花の色、さやの幅、種子の粒数、萌芽の早晩性、開花の早晩性、枯れ上がりの早晩性、乾燥根の重量、グリチルリチン酸含量
(略)	(略)	(略)
アジサイ	生育型、樹型、樹高、樹幅に対する樹高、茎の節間長、茎の帯化の有無、茎の色、茎の皮目の数、茎の皮目の大きさ、茎の皮目の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の切れ込みの有無、葉身の形、葉身の先端部の突出部分の長さ、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、節数、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の長さ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色及び葉柄の毛の長さ
(略)	(略)	(略)
アジサイ	ウラルカンゾウ	
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
ソバ	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
えのきたけ	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たぐの形状及び子実層たぐの色 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色及び菌柄の肉質 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾物率及び収量性	
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
アジサイ	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、分枝性、節間長、節数、葉序、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉の毛の長さ、葉柄の長さ、葉柄の太さ、葉柄の色及び葉柄の毛の長さ	
(略)	(略)	(略)

	縁の鋸歯の深さ、葉身のアントシアニンの着色、葉身のアントシアニン着色の分布、葉身の斑の有無、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の光沢、葉身のしわ、葉身の横断面の形、葉柄の色、花序の型、花序の高さ、花序の幅、花序の両性花の明瞭度、花序の装飾花の配列、花序の装飾花の粗密、花序の装飾花の数、装飾花の直径、装飾花のがく片の数、装飾花のがく片の姿勢、装飾花のがく片間の節間伸長、装飾花のがく片の長さ、装飾花のがく片の幅、装飾花のがく片の形、装飾花のがく片の先端の形、装飾花のがく片のしわ、装飾花のがく片の横断面の形、装飾花のがく片周縁の内曲、装飾花のがく片の重なり、装飾花のがく片の波打ち、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無、装飾花のがく片の色数、装飾花のがく片の主な色、装飾花のがく片の二次色、装飾花のがく片の二次色の分布、装飾花のがく片の二次色の型、装飾花のがく片の二次色の割合、装飾花の小花柄の色、両性花の花弁の色、花序の老化による桃又は赤の着色、開花始期
(略)	(略)
ぶなしめじ	菌叢表面の着色の有無、菌叢裏面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長量(10℃)、菌糸体の温度別成長量(15℃)、菌糸体の温度別成長量(20℃)、菌糸体の温度別成長量(25℃)、菌糸体の温度別成長量(30℃)、菌さんの縦断面の形、菌さんの直径、菌さんの高さ、菌さんの直径／高さ、菌さん中央部の色、菌さん周縁部の色、菌さん表面の斑紋の大きさ、菌さん表面の斑紋の分布、菌さん表面の斑紋の明瞭度、菌さんの硬さ、ひだの並び方、ひだの密度、ひだの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌さんの直径／菌柄の長さ、菌柄の最大径、菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径、菌柄の色、菌柄の毛羽の有無、菌柄の硬さ、子実体の平均乾燥重量、発生処理までの期間、菌揃さから子実体収穫までの期間
(略)	(略)
レタス	種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、株の幅、株の葉上部の重なり、葉数、葉の姿勢、葉の裂片の数、葉の形、葉の先端部の形、葉の縦断面、葉の裂片の幅、葉のアントシアニン着色、葉のアントシアニンの色相、葉のアントシアニン着色の面積、葉の色、葉の緑色の濃淡、葉の光沢、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の凹凸、葉の凹凸の大きさ、葉の周縁部の波打ち、葉の周縁部の切れ込みの型、葉の周縁部の切れ込みの深さ、葉の周縁部の二次切れ込みの深さ、葉の周縁部の切れ込みの粗密、葉脈の型、球の大きさ、球の縦断面の形、

		三 花房の形、花房の大きさ、花の向き、花形、花の大きさ、花色、がく片の形、がく片の大きさ、がく片の色、がく片の数、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、花柄の色、花柄の数、一花房当たりの花数及び花の香り 四 開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
(略)	(略)	
ぶなしめじ	(略)	一 菌糸の性状、菌さんの形、菌さんの大きさ、菌さんの色、菌さん表面のはん紋の多少、菌さんの厚さ、菌さんの肉質、子実層たぐの形状及び子実層たぐの色 二 菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の色、菌柄の毛の多少及び菌柄の肉質 三 子実体の発生時期、子実体の発生型、温度適応性、子実体の発生に要する期間及び培地適応性又は原木適応性 四 乾燥率及び収量性
(略)	(略)	
レタス	(略)	種子の色、子葉の大きさ、子葉の形、胚軸のアントシアニン着色の有無、幼苗のアントシアニン着色の有無、葉の姿勢、葉身の切れ込みの型、株の幅、結球性、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）、球重（半結球、結球品種に限る。）、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）、球葉数（カッタインゲタイプ、ステムタイプの品種を除く。）、総葉数（カッタインゲタイプ、

	球のしまり、芯の大きさ、茎の長さ、茎の太さ、茎の縦断面の形、茎の色、茎の内部の色、収穫期、抽だい初期、腋芽 [*] の発生、帯化の発生、べと病レースBI:16EU抵抗性、べと病レースBI:17EU抵抗性、べと病レースBI:20EU抵抗性、べと病レースBI:21EU抵抗性、べと病レースBI:22EU抵抗性、べと病レースBI:23EU抵抗性、べと病レースBI:24EU抵抗性、べと病レースBI:25EU抵抗性、べと病レースBI:26EU抵抗性、べと病レースBI:27EU抵抗性、べと病レースBI:29EU抵抗性、べと病レースBI:30EU抵抗性、べと病レースBI:31EU抵抗性、べと病レースBI:33EU抵抗性、べと病レースBI:35EU抵抗性、レタスモザイクウイルス抵抗性、根腐病菌レース1抵抗性、根腐病菌レース2抵抗性、レタスビツグベイン病抵抗性、アフラムシ耐性
(略)	(略)
しいたけ	菌糸密度、菌糸 [*] 表面の着色の有無、菌糸体の成長最適温度、菌糸体の温度別成長速度 (10℃/日)、菌糸体の温度別成長速度 (15℃/日)、菌糸体の温度別成長速度 (20℃/日)、菌糸体の温度別成長速度 (25℃/日)、菌糸体の温度別成長速度 (30℃/日)、菌糸の縦断面の形、菌糸の直径、菌糸の表面の地色、菌糸の厚さ、菌糸の直径/厚さ、菌糸の硬さ、りん皮の付着部位、りん皮の大きさ、りん皮の着色の有無、ひだの有無、ひだの形、ひだの並び方、ひだのちぎれの割合、ひだの幅、ひだの密度、ひだの色、菌柄の形、菌柄の長さ、菌柄の太さ、菌柄の表面の着色の有無、菌柄の毛羽の密度、菌柄の毛羽の着色の有無、菌柄の硬さ、菌柄の色、菌糸の直径/菌柄の長さ、子実体の平均乾燥重量、発生処理までの期間、発生処理から収穫最盛期までの期間
(略)	(略)
稲	しょう葉のアントシアニン着色の強弱、基部葉の葉しよの色、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の分布、葉しよのアントシアニン着色の有無、葉しよのアントシアニン着色の強弱、葉身表面の毛じ、葉耳のアントシアニン着色の有無、葉の襟のアントシアニン着色の有無、葉舌の形、葉

	イヌ、ステムタイノの品種に限る。)、茎の長さ(ステムタイノの品種に限る。)、葉の長さ、葉の幅、 <u>葉柄の基部の幅</u> 、 <u>葉の厚さ</u> 、 <u>収穫期</u> の葉の姿勢、葉の形、 <u>葉身の先端の形</u> 、 <u>外葉の色相</u> 、 <u>外葉の色</u> の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉のアントシアニン着色の強弱、葉のアントシアニンの分布、葉のアントシアニン分布の種類、葉の光沢の強弱、葉の凹凸の強弱、葉の凹凸の大きさ、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の先端部の切れ込みの有無、葉身の先端部の切れ込みの深さ、葉身の先端部の切れ込みの粗密、葉身の先端部の切れ込みの型(葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。)、 <u>葉脈の型</u> 、 <u>芯の大きさ</u> 、 <u>腋芽</u> の発生の強弱、 <u>収穫期</u> 、 <u>抽だい初期</u> 、 <u>開花期</u> の草丈、 <u>帯化</u> の有無、 <u>帯化</u> 発生の強弱、べと病抵抗性、 <u>レタスモザイクウイルス</u> 抵抗性、 <u>根腐病菌</u> レース1抵抗性、 <u>根腐病菌</u> レース2抵抗性、 <u>レタスビツグベイン</u> 病抵抗性、 <u>アフラムシ</u> 耐性
(略)	(略)
しいたけ	一 <u>菌糸の性状</u> 、 <u>菌糸の形</u> 、 <u>菌糸の大きさ</u> 、 <u>菌糸の色</u> 、 <u>菌糸の厚さ</u> 、 <u>菌糸の肉質</u> 、 <u>りん皮の付着部位</u> 、 <u>りん皮の大きさ</u> 、 <u>りん皮の色</u> 、 <u>子実層たぐの形状及び子実層たぐの色</u> 二 <u>菌柄の形</u> 、 <u>菌柄の長さ</u> 、 <u>菌柄の太さ</u> 、 <u>菌柄の色</u> 、 <u>菌柄の毛の多少</u> 、 <u>菌柄の毛の色及び菌柄の肉質</u> 三 <u>子実体の発生時期</u> 、 <u>子実体の発生型</u> 、 <u>温度適応性</u> 、 <u>子実体の発生に要する期間及び培地適応性</u> 又は <u>原木適応性</u> 四 <u>乾燥率及び収量性</u>
(略)	(略)
稲	<u>しょう葉のアントシアニン着色</u> 、 <u>基部葉の葉しよの色</u> 、 <u>葉の緑色の濃淡</u> 、 <u>葉のアントシアニン着色の有無</u> 、 <u>葉のアントシアニン着色の分布</u> 、 <u>葉しよのアントシアニン着色の有無</u> 、 <u>葉しよのアントシアニン着色の強弱</u> 、 <u>葉身表面の毛じ</u> 、 <u>葉耳のアントシアニン着色の有無</u> 、 <u>葉の襟のアントシアニン着色の有無</u> 、 <u>葉舌の形</u> 、 <u>葉舌の色</u> 、

		舌の色、葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、稈の向き、稈のひざまぎの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節のアントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じ、外穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上がりの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱、後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱、護穎の長さ、護穎の色、穎の千粒重、穎の長さ、穎の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応による着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のアルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺伝子型、葉いもち病抵抗性、穂いもち病抵抗性、白葉枯病抵抗性品種群別、白葉枯病は場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツヤグロコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミウム吸収性、高温登熟性、着粒密度、ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ピスビリバツクナトリウム塩）抵抗性、セシウム吸収性
(略)	(略)	
シソ	胚軸のアントシアニン着色、幼苗の色、植物体の高さ、側枝の数、茎の断面の形、茎の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の表面の色、葉身の表面の色の濃淡、葉身の光沢の強弱、葉身の裏面の色、葉身の裏面の色の濃淡、葉身の山脈状の凹凸の強弱、葉身の木ぼう状の凹凸の強弱、葉身の周縁部の波打ちの強弱、葉身の周縁部の切れ込みの型、葉身の周縁部の切れ込みの密度、葉身の周縁部の切れ込みの深さ、葉身の周縁部の小型鋸歯、葉柄の長さ、花穂の位置、花穂の数、花穂の長さ、小花の型、小花の大きさ、小花の色、小花の赤紫色の濃淡、がくの大きさ、がくのアントシアニン着色、はうの大きさ、開花期、種子の大きさ、種子の色、乾燥種子の重さ	
(略)	(略)	

		葉身の長さ、葉身の幅、初期の止め葉の姿勢、後期の止め葉の姿勢、 稈の向き、稈のひざまぎの有無（浮稲品種に限る。）、出穂期、雄 性不稔性、初期の外穎のキールのアントシアニン着色、初期の外穎 頂部下のアントシアニン着色、初期の外穎頂部のアントシアニン着 色、柱頭の色、稈の太さ、稈の長さ（浮稲品種を除く。）、稈の節の アントシアニン着色の有無、稈の節のアントシアニン着色の強弱、 稈の節間のアントシアニン着色の有無、穂の主軸の長さ、穂数、芒 の有無、初期の芒の色、芒の分布、最長芒の長さ、外穎の毛じ、外 穎先端の色、後期の芒の色、穂の主軸の湾曲度、穂の二次枝梗の有 無、穂の二次枝梗の型、穂型、穂の抽出度、成熟期、葉の枯れ上が りの時期、穎の色、穎の模様、後期の外穎のキールのアントシアニ ン着色、後期の外穎頂部下のアントシアニン着色、後期の外穎頂部 のアントシアニン着色、護穎の長さ、護穎の色、穎の千粒重、穎の 長さ、穎の幅、穎のフェノール反応の有無、穎のフェノール反応に よる着色の濃淡、玄米の千粒重、玄米の長さ、玄米の幅、玄米の形、 玄米の色、胚乳の型、胚乳のアミロース含量、胚乳の色、精米のア ルカリ崩壊性、玄米の香り、低温発芽性（陸稲品種に限る。）、障 害型耐冷性、穂発芽性、耐倒伏性、脱粒性、いもち病抵抗性推定遺 伝子型、葉いもち病抵抗性、穂いもち病抵抗性、白葉枯病抵抗性 品種群別、白葉枯病は場抵抗性、しま葉枯病抵抗性品種群別、ツヤ グロコバイ抵抗性品種群別、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型、 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）、グルテリン含量、カドミ ウム吸収性、高温登熟性、着粒密度
(略)	(略)	
シソ	二 草姿、草丈、子葉の色、分枝性、茎の形状、葉色その他葉の形 状、葉柄長、花穂の形状及び花の形状 三 早晚性、耐高低温性、耐干湿性、日長感应性、病害抵抗性及び 虫害抵抗性 三 品質	
(略)	(略)	

ニヨウマツ	
	樹形、樹冠形、樹の高さ、樹の太さ、樹幹の曲がり、幹の横断面中央部の色（製材用品種のみ）、幹の横断面中央部を除く色（製材用品種のみ）、樹皮の色、樹皮の厚さ、樹皮の亀裂の有無、樹皮の亀裂の型、枝の長さ、枝の太さ、枝の着生角度、輪生枝の数、葉束の針葉の数、針葉の長さ、針葉の幅、針葉の先端部の形、夏季の針葉の色、冬季の針葉の色、針葉のねじれ、針葉の曲がり、針葉の斑の有無、針葉の斑の分布、針葉の斑の色、針葉の色の季節変化、雌花の主な色、雄花の主な色、球果の形、球果の長さ、球果の色、冬芽の形、冬芽の色、冬芽の鱗片の反転の有無、種鱗先端の突起の大きさ、種子の翼の褐色の濃淡、種子の色、種子の千粒重
(略)	(略)
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(略)	(略)
トウゴヤ	若葉のアントシアニンの着色、開花始期、草丈、葉柄の長さ、葉柄のろう質、葉柄のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の切れ込みの深さ、葉身の ^葉 筋の粗細、葉身の色、葉身の葉脈の色、花序の型、花序の形、雌花の柱頭の色、さく果の大きさ、さく果の色、さく果のとげ、さく果の裂開の有無、種子の長さ、種子の幅、種子の長さ／幅、種子の主な色、種子の二次色、種子の種枕
(略)	(略)
コムギ	種子の色、種子のフェノール反応による着色の濃淡、しょう葉のアントシアニン着色の強弱、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現

アカマツ	
	一 樹姿 二 幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの形、樹脂の多少、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ及び樹皮のき裂紋様 三 枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、葉長及び葉色 四 きゅう果の形、きゅう果の大きさ、きゅう果の色、雌花の色、種子の羽根の色及び種子の羽根の紋様
(略)	(略)
クロマツ	一 樹姿 二 幹の通直性、幹の完満性、幹の真円性、材の色、繊維配列、繊維の長さ、もくの形、樹脂の多少、材の比重、樹皮の色、樹皮の厚さ及び樹皮のき裂紋様 三 枝の太さ、枝の長さ、枝角、枝付き密度、葉長及び葉色 四 きゅう果の形、きゅう果の大きさ、きゅう果の色、雌花の色、種子の羽根の色及び種子の羽根の紋様 五 成長性、発根性、結実性、自然落枝性、耐寒性、耐雪性、耐陰性、耐干性、耐湿性、耐ポッドル性、耐霜性、耐潮性、耐しん腐れ性、抗材しん部割性、耐獣性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
(略)	(略)
リベス サンダイン ウム	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
コムギ	子葉ししょうのアントシアニン着色の強弱、草姿、反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度、出穂期、止め葉の葉ししょうの白粉の強弱、止

