

農薬ラベルに記載されている  
安全使用上の注意または  
被害防止方法を確認しましょう



作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	Aを含む 農薬の 総使用回数	被害防止 方法
稲	コブノメイガ	1000倍	60～ 150 L/10a	収穫 21 日前 まで	3回 以内	散布	3回 以内	使用者： 長スボン・ 長袖の 作業衣
	ツマグロヨコ バイ ウンカ類 イナゴ類 イネドロ オイムシ	1000倍～ 2000倍						
	カメムシ類	2000倍						



農薬散布時は、薬剤の直接付着や吸い込みを防ぐため、  
適切な防護装備を着用することが最重要です。

その装備、準備バツチリ？

- ✓ 保護メガネ
- ✓ 農薬用マスク
- ✓ 不浸透性防除衣
- ✓ 不浸透性手袋
- ✓ 長靴

使用後は直ちに着替え、衣服を洗濯し、手洗い・うがい・入浴を徹底してください。

[https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n\\_tekisei/](https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/)

農薬の適正使用 農林水産省

検索



令和 8 年度農薬危害防止運動 農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催