1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２１号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイハーパー（ｾｲﾊｰﾊﾟｰ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイハーパー」は、対照品種「DLFMIDN6」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「パンサー」と比較して、舌状花の表面の主な色が22Aであること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が22Aであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和５年８月２２日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のオレンジ色系一重咲き育成系統にオレンジ色系一重咲きの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	07　多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	05　中
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	05　中
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 163B
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	02　平
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	05　中
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	06　突起状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 22A
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 163D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 22A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 14C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイハーパー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２２号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L.　　DLFSUAV3

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「DLFSUAV3」は、対照品種「DLFCARI3」と比較して、頭花の直径（摘らいしていないもの）が大であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイセイラー」と比較して、舌状花の縦断面の形状が内曲であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「太陽の華菜」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6　登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7　出願公表の年月日　　令和５年１１月２９日

8　登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	01 無又は極弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	05　中
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	05　中
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73A
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	07　大
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	07　高

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
第３１９２２号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	01　内曲
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03　先端部1/4
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	06　やや長
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	06　突起状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04　7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFSUAV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	06　やや斜下
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２３号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　DLFLABY3

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「DLFLABY3」は、対照品種「DEKALJONKA」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「イオンの光明」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がN155B;65B(先端)であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Deliflor Royalties B.V.
　Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Arie Gerard Post

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月２９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２３号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	07　深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 65D
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	04　やや小
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	06 やや高
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	02 舟底状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	04 やや短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	04　三角形
53	舌状花の縦断面の形状	01　内曲
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	07　強
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05　中
59	舌状花の長さ	06　やや長
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	01　尖る
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B;65B(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04　7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	06　やや多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFLABY3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	06　やや斜下
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２４号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　DLFDESEO

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「DLFDESEO」は、対照品種「セイコーミラルージュ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。対照品種「DEKDORIAX」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接近するであること、舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Deliflor Royalties B.V.
　Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Arie Gerard Post

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月２９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２４号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 61A
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	03　小
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号
第３１９２４号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	06 やや密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	02 基部1/2

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２４号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03　先端部1/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01　内曲
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05　先端部1/2
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	05　中
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	01　尖る
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 72A
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C;72D(中央縦線);NN155B(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71A;NN155D(縁部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D;N74D(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04　7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	07　多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFDESEO

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	07　斜下
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２５号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　DLFALIV3

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「DLFALIV3」は、対照品種「セイセイラー」と比較して、頭花の舌状花の主要な形がさじ状であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Deliflor Royalties B.V.
　Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Arie Gerard Post

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月２９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する品種名称不詳品種の自然交雑実生から選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２５号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	05　中
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	05　中
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	03　斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 58A;2D(先端)
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	03 さじ状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	04 やや短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２５号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	02　扁円形
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04　やや弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03　先端部1/4
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75C;149A(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 186D;154B(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04　7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFALIV3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	05　水平
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２６号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　DLFLOTS7

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「DLFLOTS7」は、対照品種「DEKRABELO」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、舌状花の裏面の色が64C;NN155B(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「DELIETNAD RED」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、舌状花の裏面の色が64C;NN155B(基部)であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Deliflor Royalties B.V.
　Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Arie Gerard Post

７　出願公表の年月日　　令和５年１２月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	08 かなり長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	07 高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２６号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	05　中
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 59A
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	05　中
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	05 中
36 頭花の花柄の長さ	06 やや長
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	03 弱い内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	01 基部1/4

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２６号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03　先端部1/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	04　やや弱
59	舌状花の長さ	07　長
60	舌状花の幅	06　やや広
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	01　尖る
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 60B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C;NN155B(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 61A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70A
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05　7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	04　やや少
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFLOTS7

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	05　水平
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２７号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　シュリカナサ（ｼｭﾘｶﾅｻ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「シュリカナサ」は、対照品種「桃麗」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFISAB3」と比較して、頭花の舌状花の形の数が2であること、舌状花の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　沖縄県
　沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　田場奏美　玉城盛俊　渡邊武志　守屋伸生　関塚史朗　赤嶺聖良　宮城悦子　座喜味利将　儀間直哉　亀山健太　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年２月１３日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の赤色系デコラ咲き系統にデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	07 長
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２７号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	07　多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	07　深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 68D
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	06　やや大
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	08 かなり高
36 頭花の花柄の長さ	02 かなり短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	08 至る所

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２７号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02　平
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	09　極長
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	06　やや高
62	舌状花の先端の形	06　突起状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06　8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	06　やや多
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
シュリカナサ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	05　水平
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２８号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　琉HK28-109（ﾘｭｳHK28-109）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「琉HK28-109」は、対照品種「DEKZEHNYA YELLOW」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFROC2」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　沖縄県農業協同組合
　沖縄県那覇市壺川2-9-1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　徳元清春

7　出願公表の年月日　　令和６年２月２２日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の交雑品種どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	03 短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号
第３１９２８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 154C
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	06　やや高

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	07 わずかに凸
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	06 外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号
第３１９２８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	07　先端部3/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	04　やや弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	05　先端部1/2
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02　かなり弱
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 5A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2B;154C(先端部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07　8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
琉HK28-109

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	05　水平
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９２９号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum L.　　Dochryanma

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Dochryanma」は、対照品種「太陽のマイキ」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「セイリディ」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）がやや大であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands

6　登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7　出願公表の年月日　　令和６年６月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２９号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	07　深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	01　上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 9A;164A(至る所)
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	04　やや小
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	03　低

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２９号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03　先端部1/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02　かなり弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	02　丸
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 6A
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 5C
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 6A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 5C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
Dochryanma

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３０号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　DLFDROP3

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「DLFDROP3」は、対照品種「DEKDORIAX」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイコーミラルージュ」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「セイザック」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Deliflor Royalties B.V.
　Korte Kruisweg 163, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Arie Gerard Post

７　出願公表の年月日　　令和６年７月１０日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	02 かなり小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３０号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	05　中
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	04　散房花序型
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	03　狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	02　かなり少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 61A
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	03　小
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３０号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	02　平
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	01　内曲
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03　先端部1/4
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02　かなり弱
59	舌状花の長さ	03　短
60	舌状花の幅	03　狭
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N66D
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N66D;NN155C(基部)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64A;NN155C(基部);154D(基部)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04　7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
DLFDROP3

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	07　斜下
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３１号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイモラレス（ｾｲﾓﾗﾚｽ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイモラレス」は、対照品種「セイオーマン」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「太陽の華菜」と比較して、葉の一次欠刻の深さが極深であること、舌状花の先端の形が深い切込みであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年８月６日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のサーモン色系デコラ咲き育成系統にデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	04 やや小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	09 極深
14 葉の裂片縁部の重なり	02 平行
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３１号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	07　多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	07　深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	03　小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	03　斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73C
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	06　やや高

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	07 密
40 頭花の舌状花の形の数	02 2
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	03 さじ状
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３１号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	02　平
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	08　深い切込み
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06　8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイモラレス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	06　やや斜下
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３２号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイクルス（ｾｲｸﾙｽ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイクルス」は、対照品種「セイメリタ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「SKE160-5132」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「セイオリス」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の白色系一重咲き育成系統に秋咲き白色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	05　中
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	05　中
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155A
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	06　やや高

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	04 やや凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	02 内巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	03 基部3/4

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３２号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03　先端部1/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	02　かなり弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	05　中
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	02　丸
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	05 7.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイクルス

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３３号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイルーニー（ｾｲﾙｰﾆｰ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイルーニー」は、対照品種「スプレーアイチ秋2号」と比較して、舌状花の先端の形が突起状であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFSALV1」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の白色系一重咲き育成系統に秋咲き白色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	01 緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	07 長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	07　深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	06　やや広
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	05　中
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	01　上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155A
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	05　中

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03　先端部1/4
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	05　中
60	舌状花の幅	06　やや広
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	06　突起状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	07 8.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイルーニー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３４号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイタイラー（ｾｲﾀｲﾗｰ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイタイラー」は、対照品種「セイシャルム」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや長であること、舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）が先端部1/2であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFCOP2」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Fitcelebrate」と比較して、舌状花の先端の形が丸であること、花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）がややドーム状であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の黄色系一重咲き育成系統に秋咲き黄色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
第３１９３４号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	04 やや低
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	05　中
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	05　中
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 6A
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	02　丸
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2A
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	04 やや小
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	04 7週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイタイラー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３５号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイセロン（ｾｲｾﾛﾝ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイセロン」は、対照品種「スプレーアイチ秋1号」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の一次欠刻の深さが極深であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヨランダ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが極深であること、舌状花の縦断面の形状が平であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のピンク色系一重咲き育成系統に秋咲きピンク色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	04 やや斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	05 中
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	09 極深
14 葉の裂片縁部の重なり	04 接する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	07　多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	01　上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 65B
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	04　やや小
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	02　平
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	04　やや短
60	舌状花の幅	04　やや狭
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75D
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69D
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75D
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69D
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	03 ややドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	05 黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	06 8週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイセロン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３６号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイミレン（ｾｲﾐﾚﾝ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイミレン」は、対照品種「DLFILVIA」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヨランダ」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。対照品種「DLFPOMP3」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のピンク色系一重咲き育成系統に秋咲きピンク色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	05 中
07 葉柄の向き	05 水平
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	06 やや広
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	07 深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	06　やや多
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	02　深いドーム形
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	04　やや狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	03　小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	03　少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75C
30	頭花の型	03　半八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	01　デイジー
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	05　中
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	04　やや低

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	02 かなり少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	04 やや少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	04 やや斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	01 極短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	05 わずかに凹
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	03　外反
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05　先端部1/2
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	05　中
60	舌状花の幅	05　中
61	舌状花の長さ／幅	03　低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	07 大
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	05 中
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	05 強いドーム状
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	02 緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	04 淡黄
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	08 9週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03 10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイミレン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	03　浅

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３７号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Chrysanthemum L.　　セイヌーボバニラ（ｾｲﾇｰﾎﾞﾊﾞﾆﾗ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「セイヌーボバニラ」は、対照品種「DLFDUDO」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「セイヌーボ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　イノチオ精興園株式会社
　広島県府中市鵜飼町531番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名
　熊田謙久

7　出願公表の年月日　　令和６年９月１７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の淡いピンク色系デコラ咲き育成系統に秋咲きピンク色系スプレーギクの混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	01 無又は極小
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	06 やや長
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	05 中
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質		重要な形質に係る特性
18	葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（Chrysanthemum × morifolium品種を除く）	
19	葉の裏面の毛の粗密（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
20	葉の裏面の色（Chrysanthemum ×morifolium品種を除く）	
21	葉の周縁の二次欠刻の数	05　中
22	葉の周縁の二次欠刻の深さ	06　やや深
23	花序の形（叢生でない品種に限る）	04　散房花序型
24	花序の最大幅（叢生でない品種に限る）	03　狭
25	花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）	04　やや小
26	花序の側枝の頭花の向き（叢生でない品種に限る）	02　かなり斜上
27	一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）	04　やや少
28	株当たりの頭花の総数（叢生品種に限る）	
29	花らいの外面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2D;186C(先端)
30	頭花の型	05　八重
31	花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）	
32	頭花の直径（摘らいしていないもの）	03　小
33	頭花の直径（摘らいしたもの）	
34	頭花の高さ（摘らいしていないもの）	03　低

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	01 極短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	04 やや粗
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質		重要な形質に係る特性
52	舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53	舌状花の縦断面の形状	01　内曲
54	舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	03　先端部1/4
55	舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03　弱
56	舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58	舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59	舌状花の長さ	03　短
60	舌状花の幅	03　狭
61	舌状花の長さ／幅	04　やや低
62	舌状花の先端の形	05　歯状
63	舌状花の表面の色数	01　1
64	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
65	舌状花の表面の二次色	
66	舌状花の表面の二次色の分布	
67	舌状花の表面の二次色の分布2	
68	舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C;N155C(先端)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4C;65B(先端)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4D;77C(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	03　6.5週間
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	
96 開花習性	03　10月～11月咲き（秋ギク）
97 各開花習性における早晩性	
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

Chrysanthemum L.
セイヨーボバニラ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 頭花の舌状花の三次的な形（観賞ぎくに限る）	
104 舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）	04　やや斜上
105 管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
106 管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）	
107 舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）	
108 舌状花の幅（観賞ぎくに限る）	
109 舌状花の長さ／幅（観賞ぎくに限る）	
110 管状花の花冠の深裂の深さ（花盤の型がアネモネ型の品種は除く）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３８号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Cymbidium Sw.　　ムーンシャワー（ﾑｰﾝｼｬﾜｰ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ムーンシャワー」は、対照品種「華麗　イエロークレイン」と比較して、ペタルの周縁の色が7C,186A(基部)であること、リップのくさびの色が179Aであること等で区別性が認められる。対照品種「黄蝶遊々」と比較して、ペタルの周縁の色が7C,186A(基部)であること、リップのくさびの色が179Aであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社河野メリクロン
　徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　河野圭佑

7　出願公表の年月日　　令和７年６月５日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号
第３１９３８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	03 やや上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	05 中
04 葉の先端と垂線に対する角度	05 中
05 ぎ球茎の形成の有無	09 明確
06 ぎ球茎の大きさ	05 中
07 ぎ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ぎ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	03 狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 Ｖ形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	06 やや太
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	09 有
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	03 狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	07 広
36 ドーサルセパルの正面の形	05 倒卵形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
42 ラテラルセパルの幅	07 広
43 ラテラルセパルの正面の形	05 倒卵形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	02 ２
49 セパルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 7C
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 7C,186A(基部)

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	01 無
58 セパルの条線の色	
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	06 やや広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 Ⅲ型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
66 ペタルの色数	02 ２
67 ペタルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 7C
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 7C,186A(基部)
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 186A
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	05 扁円形
80 リップの縦断面の形	04 Ⅳ型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	01 無又は極弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
85 リップの色数	02 ２

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 12C
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 12C
89 リップの斑点の有無	01 無
90 リップの斑点の大きさ	
91 リップの斑点の色	
92 リップのくさびの有無	09 有
93 リップのくさびの色	RHSカラーチャート 179A
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート 12C
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 12B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 186A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 12D

Cymbidium Sw.
ムーンシャワー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	03　冬咲

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９３９号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Cymbidium Sw.　　街の明かり（ﾏﾁﾉｱｶﾘ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「街の明かり」は、対照品種「メルヘンハート」と比較して、セパルの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が71Bであること等で区別性が認められる。対照品種「綿あめ」と比較して、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の先端の色が71Bであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社河野メリクロン
　徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　河野茂信

7　出願公表の年月日　　令和７年４月７日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号
第３１９３９号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	01 かなり上
03 葉の最高点と垂線に対する角度	03 小
04 葉の先端と垂線に対する角度	02 かなり小
05 ぎ球茎の形成の有無	09 明確
06 ぎ球茎の大きさ	05 中
07 ぎ球茎の縦断面の形	04 卵形
08 ぎ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	02 Ｖ形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号
第３１９３９号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	03 弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	05 中
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	03 短
32 花の幅	03 狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	04 やや短

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
48 セパルの色数	03 ３
49 セパルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74C,N78A(基部)

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	01 無
53 セパルの斑点の大きさ	
54 セパルの斑点の色	
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74C
59 ペタルの長さ	04 やや短
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 Ⅲ型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
66 ペタルの色数	03 ３
67 ペタルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74D,N78A(基部)
70 ペタルの斑点の有無	01 無
71 ペタルの斑点の大きさ	
72 ペタルの斑点の色	
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74D
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	07 広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	04 Ⅳ型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	05 中
85 リップの色数	03 ３

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９３９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSカラーチャート 9D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSカラーチャート 73A,NN155C(外側)
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	02 かなり小
91 リップの斑点の色	RHSカラーチャート 73A
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSカラーチャート NN155C
97 ずい柱の先端の色	RHSカラーチャート 71B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	03 小
101 ずい柱の斑点の色	RHSカラーチャート 72B
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSカラーチャート 4D

Cymbidium Sw.
街の明かり

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９３９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04　春咲

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４０号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Cymbidium Sw.　　カラフルコットン（ｶﾗﾌﾙｺｯﾄﾝ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「カラフルコットン」は、対照品種「踊り絵巻」と比較して、セパルの斑点の有無が有であること、リップの周縁の色が64B,N66D(外側)であること等で区別性が認められる。対照品種「恋暦」と比較して、リップのくさびの有無が無であること、ずい柱の中央部の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社河野メリクロン
　徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　河野茂信

7　出願公表の年月日　　令和７年８月１４日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 株の大きさ	05 中
02 葉の先端の地際に対する位置	05 同位
03 葉の最高点と垂線に対する角度	04 やや小
04 葉の先端と垂線に対する角度	06 やや大
05 ぎ球茎の形成の有無	09 明確
06 ぎ球茎の大きさ	05 中
07 ぎ球茎の縦断面の形	02 楕円形
08 ぎ球茎の横断面の形	01 楕円形
09 葉の数	04 やや少
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	04 やや狭
12 葉の厚さ	04 やや薄
13 葉の形	02 線形
14 葉の先端の形	01 鋭形
15 葉の先端の対称性	02 対称
16 葉の横断面の形	01 平形
17 葉の欠刻の有無	01 無

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉のねじれの強弱	01 無又は極弱
19 葉の緑色の濃淡	05 中
20 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
21 花序の型	02 総状
22 花序の花の数（総状花序の品種に限る）	06 やや多
23 花茎の長さ	05 中
24 花茎の太さ	05 中
25 花茎の強さ	05 中
26 花茎の向き	03 斜上
27 花茎のアントシアニン着色の有無	01 無
28 花茎のほう葉の大きさ	05 中
29 花型	01 一重
30 花の咲き型	01 抱咲
31 花の長さ	04 やや短
32 花の幅	04 やや狭
33 花の香り	02 弱
34 ドーサルセパルの長さ	05 中

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
36 ドーサルセパルの正面の形	04 楕円形
37 ドーサルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
38 ドーサルセパルの先端の形	03 鈍形
39 ドーサルセパルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
40 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
41 ラテラルセパルの長さ	05 中
42 ラテラルセパルの幅	08 かなり広
43 ラテラルセパルの正面の形	04 楕円形
44 ラテラルセパルの縦断面の形	03 Ⅲ型
45 ラテラルセパルの先端の形	03 鈍形
46 ラテラルセパルの周縁の反転の強弱	05 中
47 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
48 セパルの色数	03 ３
49 セパルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 63D
50 セパルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
51 セパルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の有無	09 有
53 セパルの斑点の大きさ	03 小
54 セパルの斑点の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64B
55 セパルのくさびの有無	01 無
56 セパルのくさびの色	
57 セパルの条線の有無	09 有
58 セパルの条線の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C
59 ペタルの長さ	05 中
60 ペタルの幅	07 広
61 ペタルの正面の形	05 倒卵形
62 ペタルの縦断面の形	03 Ⅲ型
63 ペタルの先端の形	03 鈍形
64 ペタルの周縁の反転の強弱	02 かなり弱
65 ペタルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
66 ペタルの色数	03 ３
67 ペタルの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 63D
68 ペタルの花色境界の明瞭度	02 不明瞭

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C
70 ペタルの斑点の有無	09 有
71 ペタルの斑点の大きさ	02 かなり小
72 ペタルの斑点の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64B
73 ペタルのくさびの有無	01 無
74 ペタルのくさびの色	
75 ペタルの条線の有無	09 有
76 ペタルの条線の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C
77 リップの長さ	07 長
78 リップの幅	06 やや広
79 リップの正面の形	04 円形
80 リップの縦断面の形	04 Ⅳ型
81 リップの先端の形	03 鈍形
82 リップの先端の切れ込みの有無	01 無
83 リップの周縁の反転の強弱	03 弱
84 リップの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
85 リップの色数	03 ３

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 9D
87 リップの花色境界の明瞭度	02 不明瞭
88 リップの周縁の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64B,N66D(外側)
89 リップの斑点の有無	09 有
90 リップの斑点の大きさ	04 やや小
91 リップの斑点の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64B
92 リップのくさびの有無	01 無
93 リップのくさびの色	
94 リップの条線の有無	01 無
95 リップの条線の色	
96 ずい柱の中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C
97 ずい柱の先端の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71B
98 ずい柱の花色境界の明瞭度	02 不明瞭
99 ずい柱の斑点の有無	09 有
100 ずい柱の斑点の大きさ	04 やや小
101 ずい柱の斑点の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 72A
102 ずい柱の花粉のうの色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 8D

Cymbidium Sw.
カラフルコットン

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
103 開花時期	04　春咲

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４１号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　エターニティムーン（ｴﾀｰﾆﾃｨﾑｰﾝ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「エターニティムーン」は、対照品種「パールライト」と比較して、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）が多であること、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）がかなり浅であること等で区別性が認められる。対照品種「銀雪」と比較して、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）がかなり浅であること、花柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
　茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

６　登録品種の育成をした者の氏名
　小野崎隆　藤本卓生　東未来

７　出願公表の年月日　　令和５年１０月３０日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
エターニティムーン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	06 やや高
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	04 やや短
07 葉の幅	05 中
08 葉の長さ／幅	05 中
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	08 かなり長
15 小葉の幅	07 広
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	07 多

Dahlia Cav.
エターニティムーン

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	02 かなり浅
19 花柄の長さ	09 極長
20 花柄の色	01 緑
21 葉群に対する頭花の位置	04 葉群のかなり上
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	04 やや小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	05 中
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花の長さ／幅	03 低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
エターニティムーン

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	05　弱く内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	05　弱い外巻き
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	05　先端部から3/4まで
42 舌状花の縦断面の形	02　平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02　丸状
47 舌状花の表面の色数	01　１
48 舌状花の表面の主な色	JHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155A
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
エターニティムーン

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４２号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　エターニティサンセット（ｴﾀｰﾆﾃｨｻﾝｾｯﾄ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「エターニティサンセット」は、対照品種「ミヨダリレッドストーン」と比較して、花柄の色が赤褐又は紫を帯びた緑であること、舌状花の中間部の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「熱唱」と比較して、花柄の色が赤褐又は紫を帯びた緑であること、舌状花の中間部の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
　茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　小野崎隆　藤本卓生　東未来

7　出願公表の年月日　　令和５年１０月３０日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dahlia Cav.
エターニティサンセット

登録番号
第３１９４２号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	06 やや高
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	04 やや短
07 葉の幅	05 中
08 葉の長さ／幅	05 中
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	05 中
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	08 かなり長
15 小葉の幅	08 かなり広
16 小葉の基部の形	02 鈍形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	04 やや少

Dahlia Cav.
エターニティサンセット

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	04 やや浅
19 花柄の長さ	07 長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	04 葉群のかなり上
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	04 やや小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	05 中
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	05 中
31 舌状花の長さ	04 やや短
32 舌状花の幅	04 やや狭
33 舌状花の長さ／幅	04 やや低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
エターニティサンセット

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	06　平
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04　平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02　平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02　丸状
47 舌状花の表面の色数	01　１
48 舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N45B
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
エターニティサンセット

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４３号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　MYDAH038

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「MYDAH038」は、対照品種「DAOTTEOGTREDIVE」と比較して、舌状花の表面の主な色がN79Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DATRETTEN」と比較して、草丈が中であること、舌状花の表面の主な色がN79Aであること、舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）が先端部1/4であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　秋元徹

７　出願公表の年月日　　令和６年４月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
「ジェシーリタ」の変異株である。

Dahlia Cav.
MYDAH038

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	03 短
07 葉の幅	03 狭
08 葉の長さ／幅	06 やや高
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	03 短
15 小葉の幅	02 かなり狭
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	03 少

Dahlia Cav.
MYDAH038

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	03 浅
19 花柄の長さ	03 短
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	04 葉群のかなり上
22 頭花の向き	05 水平
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	03 小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	02 かなり短
32 舌状花の幅	03 狭
33 舌状花の長さ／幅	03 低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
MYDAH038

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４３号

重要な形質		重要な形質に係る特性
35	舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36	舌状花の中間部の横断面の形	04　中程度の内曲
37	舌状花の中間部の横断面の形2	
38	舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	05　弱く内曲
39	舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40	舌状花の周縁部の巻き方	05　弱い外巻き
41	舌状花の周縁が巻く部分の位置	06　先端部から1/2まで
42	舌状花の縦断面の形	02　平
43	舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44	舌状花の湾曲の強弱	
45	舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46	舌状花の先端の形	04　歯状
47	舌状花の表面の色数	02　２
48	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N79A
49	舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 69B
50	舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	02　先端部1/4
51	舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
MYDAH038

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	02 ぼかし
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	02 著しく異なる
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D、N79C（外斑状）
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４４号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　MYDAH042

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「MYDAH042」は、対照品種「純愛」と比較して、舌状花の表面の主な色が73Bであること、舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）が基部1/4であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、舌状花の長さがかなり短であること、舌状花の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DASYVOGTYVE」と比較して、舌状花の表面の主な色が73Bであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が13Bであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　秋元徹

７　出願公表の年月日　　令和６年５月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Dahlia Cav.
MYDAH042

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	02 中
06 葉の長さ	03 短
07 葉の幅	04 やや狭
08 葉の長さ／幅	06 やや高
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	03 短
15 小葉の幅	03 狭
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	03 少

Dahlia Cav.
MYDAH042

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	03 浅
19 花柄の長さ	06 やや長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	02 葉群と同等
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	03 小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	02 かなり短
32 舌状花の幅	02 かなり狭
33 舌状花の長さ／幅	03 低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
MYDAH042

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	04　中程度の内曲
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	05　弱く内曲
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04　平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02　平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46 舌状花の先端の形	02　丸状
47 舌状花の表面の色数	02　２
48 舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73B
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 13B
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	07　基部1/4
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
MYDAH042

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４５号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　MYDAH043

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「MYDAH043」は、対照品種「デガス」と比較して、草丈がやや低であること、花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「BKDAMPI」と比較して、頭花の型が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズクォーツ」と比較して、葉の長さが短であること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が13Aであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　秋元徹

７　出願公表の年月日　　令和６年５月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Dahlia Cav.
MYDAH043

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 茎の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	03 短
07 葉の幅	04 やや狭
08 葉の長さ／幅	05 中
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	01 凹
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	05 中
15 小葉の幅	03 狭
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	04 やや少

Dahlia Cav.
MYDAH043

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	05 中
19 花柄の長さ	06 やや長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	03 葉群のやや上
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	03 小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	06 やや密
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	03 狭
33 舌状花の長さ／幅	04 やや低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
MYDAH043

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４５号

重要な形質		重要な形質に係る特性
35	舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36	舌状花の中間部の横断面の形	05　弱く内曲
37	舌状花の中間部の横断面の形2	
38	舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39	舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40	舌状花の周縁部の巻き方	04　平（巻かない）
41	舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42	舌状花の縦断面の形	01　内曲
43	舌状花の縦方向の湾曲する位置	02　先端部から1/2
44	舌状花の湾曲の強弱	02　かなり弱
45	舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46	舌状花の先端の形	04　歯状
47	舌状花の表面の色数	02　２
48	舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
49	舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 13A
50	舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	08　基部
51	舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
MYDAH043

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４６号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dahlia Cav.　　FKD20-18

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKD20-18」は、対照品種「純愛」と比較して、舌状花の先端の形が深い切れ込み状であること等で区別性が認められる。対照品種「さくら」と比較して、舌状花の中間部の横断面の形が平であること、舌状花の先端の形が深い切れ込み状であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　小河原仁

7　出願公表の年月日　　令和６年５月２３日

8　登録品種の育成の経過の概要
「ひなた」の自然交雑実生から選抜したものである。

Dahlia Cav.
FKD20-18

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	05 中
03 茎の色	01 緑
04 葉の型	03 主に１回羽状複葉
05 葉軸の翼の強弱	01 無又は弱
06 葉の長さ	05 中
07 葉の幅	05 中
08 葉の長さ／幅	05 中
09 葉の色	02 緑
10 葉の光沢の強弱	03 弱
11 葉の表面のしわの強弱	01 平滑又は極弱
12 葉の葉脈の凹凸	02 平
13 小葉の形	02 楕円形
14 小葉の長さ	05 中
15 小葉の幅	04 やや狭
16 小葉の基部の形	01 鋭形
17 小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）	03 少

Dahlia Cav.
FKD20-18

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）	05 中
19 花柄の長さ	06 やや長
20 花柄の色	02 赤褐又は紫を帯びた緑
21 葉群に対する頭花の位置	02 葉群と同等
22 頭花の向き	03 半直立
23 頭花の型	04 八重
24 頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）	
25 頭花の副弁の有無	01 無
26 舌状花に対する副弁の長さ	
27 頭花の直径	03 小
28 頭花の高さ（八重品種及び露心する八重品種に限る。）	03 低
29 頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）	
30 頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）	07 密
31 舌状花の長さ	03 短
32 舌状花の幅	03 狭
33 舌状花の長さ／幅	04 やや低
34 舌状花の表面の形状	03 キール状（竜骨突起）

Dahlia Cav.
FKD20-18

登録番号
第３１９４６号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 舌状花のキールの数（キール状品種に限る。）	03　３以上
36 舌状花の中間部の横断面の形	06　平
37 舌状花の中間部の横断面の形2	
38 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）	
39 舌状花の基部から3/4地点の横断面の形（中間部の横断面の形と異なる場合に限る。）2	
40 舌状花の周縁部の巻き方	04　平（巻かない）
41 舌状花の周縁が巻く部分の位置	
42 舌状花の縦断面の形	02　平
43 舌状花の縦方向の湾曲する位置	
44 舌状花の湾曲の強弱	
45 舌状花のねじれの強弱	01　無又は極弱
46 舌状花の先端の形	07　深い切れ込み状
47 舌状花の表面の色数	02　２
48 舌状花の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74D
49 舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 7A
50 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）	08　基部
51 舌状花の表面の二次色の分布位置（2色以上の品種に限る。）2	

Dahlia Cav.
FKD20-18

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）	01 一様又はほぼ一様
53 舌状花の表面の三次色（3色以上の品種に限る。）	
54 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）	
55 舌状花の表面の三次色の分布位置（3色以上の品種に限る。）2	
56 舌状花の表面の三次色の型（3色以上の品種に限る。）	
57 舌状花の表面の主な色と比較した裏面の色	01 類似する
58 舌状花の裏面の色（舌状花の表面と裏面の色が著しく異なる場合に限る。）	
59 頭花の直径に対する花盤の大きさ（一重品種及び半八重品種に限る。）	
60 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
61 花盤の開やく前の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
62 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）	
63 花盤の開やく時の色（デイジー型の一重品種及び半八重品種に限る。）2	
64 管状花の色（アネモネ型品種に限る。）	
65 副弁の色（コラレット型品種に限る。）	
66 頭花の花色の変化	01 無又は弱

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４７号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Dendrobium Sw.　　YD670

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「YD670」は、対照品種「YD434」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78B,N78A(縁部・条)であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルウインク」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱が中であること、花粉のうの色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社山本デンドロビューム園
　岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　山本博文

7　出願公表の年月日　　令和７年８月２８日

8　登録品種の育成の経過の概要
モナークにハッピーモーニングを交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 ぎ球茎の向き	03 半直立
03 ぎ球茎の長さ	05 中
04 ぎ球茎の太さ	03 細
05 ぎ球茎の縦断面の形	01 線形
06 ぎ球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花ぎ球茎の齢	02 ２年以上
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	05 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 １花茎の花数	03 少
20 花茎の長さ	02 かなり短
21 花茎の太さ	05 中
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	03 短
24 小花柄の太さ	04 やや細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	03 短
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	05 中
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	04 やや内曲
31 ドーサルセパルの長さ	05 中
32 ドーサルセパルの幅	05 中
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	06 やや外反

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
37 ラテラルセパルの縦断面の形	04 やや内曲
38 ラテラルセパルの長さ	04 やや短
39 ラテラルセパルの幅	05 中
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	06 やや外反
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	02 かなり弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
44 セパルの色数	02 ２
45 セパルの模様	02 ぼかし
46 セパルの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	03 小
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78D
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
53 ペタルの縦断面の形	05 平
54 ペタルの長さ	04 やや短
55 ペタルの幅	04 やや狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	05 平
58 ペタルのねじれの強弱	01 無又は極弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
60 ペタルの色数	02 ２
61 ペタルの模様	02 ぼかし
62 ペタルの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	04 やや小
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78D
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	04 やや短
70 リップの幅	07 広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	09 有
78 リップの目の型	02 Ⅱ型
79 リップの色数	03 ３
80 リップの模様	02 ぼかし
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	06 やや大
82 リップの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
83 リップの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 1D
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78D
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD670

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B,N78A(縁部・条)
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	02 中
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	02 中
96 ずい柱の長さ	03 短
97 花粉のうの色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B
98 開花期	02 早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４８号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw.　　YD644

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「YD644」は、対照品種「YD667」と比較して、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が無であること、リップの中央部の色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イエローソング　キャンディ」と比較して、セパルの主な色が4Dであること、リップの主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビューム園
岡山県岡山市南区浜野一丁目12番30号

6　登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7　出願公表の年月日　　令和７年８月２８日

8　登録品種の育成の経過の概要

Cygnus に Harmony Queen を交配し、選抜したものである。

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	06 やや大
02 ぎ球茎の向き	03 半直立
03 ぎ球茎の長さ	06 やや長
04 ぎ球茎の太さ	03 細
05 ぎ球茎の縦断面の形	01 線形
06 ぎ球茎の横断面の形	01 楕円形
07 着花ぎ球茎の齢	02 ２年以上
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	06 やや広
10 葉の形	02 楕円形
11 葉の緑色の濃淡	05 中
12 葉の斑の有無	01 無
13 葉の斑の模様	
14 葉の斑の色	
15 葉の毛の有無	01 無
16 葉の毛の色	
17 花序の着生位置	01 全体

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の着き方	02 先端のみ
19 １花茎の花数	03 少
20 花茎の長さ	02 かなり短
21 花茎の太さ	05 中
22 花茎の向き	02 斜上
23 小花柄の長さ	04 やや短
24 小花柄の太さ	04 やや細
25 花型	02 抱え・平咲き
26 花の距の長さ	03 短
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	06 やや広
29 花の香りの有無	09 有
30 ドーサルセパルの縦断面の形	05 平
31 ドーサルセパルの長さ	05 中
32 ドーサルセパルの幅	05 中
33 ドーサルセパルの正面の形	02 楕円形
34 ドーサルセパルの横断面の形	06 やや外反

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルのねじれの強弱	01 無又は極弱
36 ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
37 ラテラルセパルの縦断面の形	06 やや外反
38 ラテラルセパルの長さ	05 中
39 ラテラルセパルの幅	05 中
40 ラテラルセパルの正面の形	02 楕円形
41 ラテラルセパルの横断面の形	06 やや外反
42 ラテラルセパルのねじれの強弱	03 弱
43 ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
44 セパルの色数	01 1
45 セパルの模様	01 単色
46 セパルの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4D
47 セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	
48 セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	
49 セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
50 セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
51 セパルの網目の色（網目のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 セパルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
53 ペタルの縦断面の形	06 やや外反
54 ペタルの長さ	05 中
55 ペタルの幅	04 やや狭
56 ペタルの正面の形	03 卵形
57 ペタルの横断面の形	05 平
58 ペタルのねじれの強弱	02 かなり弱
59 ペタルの周縁の波打ちの強弱	03 弱
60 ペタルの色数	01 1
61 ペタルの模様	01 単色
62 ペタルの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4D
63 ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	
64 ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	
65 ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	
66 ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）	
67 ペタルの網目の色（網目のある品種に限る。）	
68 ペタルの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 リップの長さ	04 やや短
70 リップの幅	07 広
71 リップの側裂片の有無	01 無
72 リップの形（側裂片がない品種に限る。）	02 円形
73 リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）	01 無
74 側裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
75 中央裂片の形（側裂片のある品種に限る。）	
76 リップの湾曲の型	
77 リップの目の有無	01 無
78 リップの目の型	
79 リップの色数	02 ２
80 リップの模様	01 単色
81 リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）	
82 リップの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2D
83 リップの中央部の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 12A
84 リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）	
85 リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）	

Dendrobium Sw.
YD644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの条線の色（条線のある品種に限る。）	
87 リップの網目の色（網目のある品種に限る。）	
88 リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）	
89 リップの目の色（目のある品種に限る。）	
90 リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 6D,64A(縁部)
91 リップのねじれの強弱	01 無又は弱
92 リップの周縁の波打ちの強弱	02 中
93 リップの周縁の切れ込みの粗密	01 無又は極粗
94 リップのカルスの有無	01 無
95 リップの毛の多少	02 中
96 ずい柱の長さ	03 短
97 花粉のうの色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155B
98 開花期	02 早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９４９号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Flammulina velutipes (Fr.) Sing.　　チクマッシュTY-7 (ﾁｸﾏｯｼｭTY-7)

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「チクマッシュTY-7」は、対照品種「森75号」と比較して、菌柄の太さがやや太であること等で区別性が認められる。対照品種「雪黄金」と比較して、菌さん周縁部の巻き込みが有であること、株の硬さがやや軟であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュTE-3」と比較して、菌さん表面の色が淡黄白であること、菌柄の上部表面の色が淡黄白であること、菌柄の基部の色が黄褐であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社千曲化成
　長野県千曲市大字内川1101番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　本澤和人

7　出願公表の年月日　　令和７年１２月１日

8　登録品種の育成の経過の概要
「チクマッシュT-011」に出願者保有着色株を交配し、選抜したものである。

Flammulina velutipes (Fr.) Sing.
チクマッシュTY-7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	09 有
03 菌糸体の成長最適温度	06 25℃
04 菌糸体の温度別成長量（10℃）	06 やや速
05 菌糸体の温度別成長量（15℃）	06 やや速
06 菌糸体の温度別成長量（20℃）	06 やや速
07 菌糸体の温度別成長量（25℃）	06 やや速
08 菌糸体の温度別成長量（30℃）	06 やや速
09 菌さん周縁部の巻き込み	09 有
10 菌さんの直径	04 やや小
11 菌さんの高さ	06 やや大
12 菌さんの直径／高さ	02 かなり小
13 菌さん表面の色	02 淡黄白
14 菌さんの硬さ	04 やや軟
15 ひだの数	04 やや少
16 菌柄の太さ	06 やや太
17 菌柄の上部表面の色	02 淡黄白

Flammulina velutipes (Fr.) Sing.
チクマッシュTY-7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９４９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 菌柄の基部の色	04 黄褐
19 あめ状物質の成分の有無	01 無
20 株の硬さ	04 やや軟
21 菌掻きから子実体発生までの期間	02 かなり短
22 子実体発生から収穫までの期間	09 極長
23 菌掻きから収穫までの期間	04 やや短

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５０号　　令和８年１０月５日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Glycine max (L.) Merr.　　兵系黒6号（ﾋｮｳｹｲｸﾛ6ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「兵系黒6号」は、対照品種「兵系黒4号」と比較して、熟さやの色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　兵庫県
　兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
　丹波篠山市
　兵庫県丹波篠山市北新町41
　丹波ささやま農業協同組合
　兵庫県丹波篠山市大沢438-1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　杉本琢真　牛尾昭浩　森本幸作　川口藍乃　湊政徳　岸野良広　森本秀樹　竹見政徳　大江博幸　西村和彦　寺本吉彦

7　出願公表の年月日　　令和５年８月１０日

8　登録品種の育成の経過の概要
兵庫県産丹波黒大豆在来系統から選抜、固定した品種である。

Glycine max (L.) Merr.
兵系黒6号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	07 多
05 草姿	03 斜上
06 茎の毛じの色	02 褐
07 茎の長さ	07 長
08 茎の節数	06 やや多
09 葉の表面の凹凸の強弱	05 中
10 小葉の数	01 ３枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	07 大
13 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	04 やや低
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.
兵系黒6号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	05 中
23 裂きょうの難易	05 中
24 熟さやの色の濃淡	05 中
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	09 極大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	05 中
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 １色
29 種皮の地色	09 黒
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	07 黒
33 胎座残の色	02 種皮と異なる
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.
兵系黒6号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	07 晩
36 成熟期	08 かなり晩
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リポキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 へそ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性（A系統）	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性（B系統）	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性（E系統）	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース1）	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）	
50 ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）	
51 ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５１号　　令和８年１０月５日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr.　　SKT01

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SKT01」は、対照品種「佐大H01号」と比較して、熟さやの色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「すみさやか」と比較して、熟さやの色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地
国立大学法人九州大学
福岡県福岡市西区元岡744
国立大学法人佐賀大学
佐賀県佐賀市本庄町1番地

６　登録品種の育成をした者の氏名

都築祥子　島田武彦　小石原弘明　大脇明子　穴井豊昭　渡邊啓史

７　出願公表の年月日　　令和５年８月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要

「トヨシロメ」に、EMS処理やX線照射によって得られた高オレイン酸系統を交配し、選抜した品種である。

Glycine max (L.) Merr.
SKT01

登録番号
第３１９５１号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	07 多
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 白
07 茎の長さ	07 長
08 茎の節数	07 多
09 葉の表面の凹凸の強弱	05 中
10 小葉の数	01 ３枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	06 やや大
13 葉の緑色の濃淡	05 中
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.
SKT01

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	06 やや多
23 裂きょうの難易	03 易
24 熟さやの色の濃淡	05 中
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	06 やや大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 １色
29 種皮の地色	01 黄白
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.
SKT01

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	07 晩
36 成熟期	07 晩
37 生態型	03 秋大豆型
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リポキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 へそ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性（A系統）	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性（B系統）	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性（E系統）	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース1）	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）	
50 ハスモンヨトウ抵抗性（抗生性）	
51 ハスモンヨトウ抵抗性（非選好性）	