１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９３号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FK17-7

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FK17-7」は、対照品種「ミヨカンブリスピンク」と比較して、葉の幅が狭であること、葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「紅梅」と比較して、葉の幅が狭であること、がくの主な色がNN74Dであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年２月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FK17-7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	03 少
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FK17-7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	03 細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN74D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74B

Limonium Mill.
FK17-7

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	04 やや小
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3A
38 やくに対する柱頭の位置	02 同位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	06 やや晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９４号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FK17-18

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FK17-18」は、対照品種「FKH11-4」と比較して、草丈がかなり高であること、がくの直径がやや大であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年２月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FK17-18

登録番号
第３１９９４号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 花序の数	03 少
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FK17-18

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	09 極長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

Limonium Mill.
FK17-18

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	04 やや小
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3A
38 やくに対する柱頭の位置	01 上位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	06 やや晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９５号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FKマルチーズP

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKマルチーズP」は、対照品種「TSマンヨーフルール」と比較して、一次分枝部のたく葉の長さが無又は極短であること、がくの主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年２月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要
「FKH11-4」の変異株である。

Limonium Mill.
FKマルチーズP

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	02 かなり少
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉身の形	04 倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FKマルチーズP

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	01 無又は極短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	08 かなり多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 67C

Limonium Mill.
FKマルチーズP

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	05 中
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2A
38 やくに対する柱頭の位置	01 上位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	07 晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９６号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FK18-10

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FK18-10」は、対照品種「南十字星」と比較して、葉の長さがやや長であること、がくの主な色が11Dであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FK18-10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	03 弱
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FK18-10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	09 極長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	02 かなり短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	04 やや短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 11D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 54B

Limonium Mill.
FK18-10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	04 やや小
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3A
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	02 乳頭状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	06 やや晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９７号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FK18-31

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FK18-31」は、対照品種「クールダイヤモンド」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、やくに対する柱頭の位置が上位であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨカンブリスホワイト」と比較して、一次分枝の長さが長であること、花冠の色が3Bであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FK18-31

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	07 強
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FK18-31

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	08 かなり長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	07 長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	03 短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D

Limonium Mill.
FK18-31

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	05 中
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3B
38 やくに対する柱頭の位置	01 上位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	06 やや晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９８号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FKA19-16

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKA19-16」は、対照品種「南十字星」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、がくの主な色が3Dであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKA19-16

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	04 やや少
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	01 無
09 葉の表面の毛の密度	
10 葉の周縁の毛の密度	01 無又は極粗
11 葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
12 葉の切れ込みの有無	01 無
13 葉の切れ込みの強弱	
14 葉柄の有無	01 無
15 葉柄の長さ	
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	09 有

Limonium Mill.
FKA19-16

登録番号
第３１９９８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の毛の密度	01 無又は極粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	01 無又は極狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	
24 一次分枝部のたく葉の長さ	02 かなり短
25 花序の型	04 Ⅳ型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	04 やや弱
28 分枝の方向	03 斜上
29 花序の花数	07 多
30 がくの長さ	03 短
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 55D

Limonium Mill.
FKA19-16

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	04 やや小
36 花冠の型	03 Ⅲ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 3A
38 やくに対する柱頭の位置	01 上位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９９号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　ブルースプレンダー（ﾌﾞﾙｰｽﾌﾟﾚﾝﾀﾞｰ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ブルースプレンダー」は、対照品種「ブルーギャラクシー」と比較して、がくの主な色がN89Cであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、がくの主な色がN89Cであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　ティー・エス・メリクロン株式会社
　山梨県北杜市小淵沢町8098

6　登録品種の育成をした者の氏名
　進藤俊英

7　出願公表の年月日　　令和５年５月１９日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
ブルースプレンダー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	06 やや長
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	06 やや長
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
ブルースプレンダー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	07 長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	05 中
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	04 やや狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	06 やや強
24 一次分枝部のたく葉の長さ	05 中
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	07 長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	04 やや少
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N89C
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155A

Limonium Mill.
ブルースプレンダー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	05 中
36 花冠の型	02 Ⅱ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	02 乳頭状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	02 かなり早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０００号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　KL1727S21

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「KL1727S21」は、対照品種「藤娘」と比較して、草丈がやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「サンバイブルー」と比較して、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　カネコ種苗株式会社
　群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　徳弘晃二

７　出願公表の年月日　　令和５年６月８日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
KL1727S21

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０００号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	04 やや弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	04 やや弱
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	04 やや短
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
KL1727S21

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０００号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	04 やや粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	02 かなり狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	03 弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	05 中
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	04 やや少
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	07 大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N87C
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155A

Limonium Mill.
KL1727S21

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０００号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	05 中
36 花冠の型	02 Ⅱ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	02 乳頭状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	02 かなり早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２００１号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　アネーロオレンジ（ｱﾈｰﾛｵﾚﾝｼﾞ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「アネーロオレンジ」は、対照品種「ティーエスバレンシアピンクオレンジ」と比較して、一次分枝の長さがやや短であること、花冠の色が1Aであること、花の香りの有無が有であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　住化アグリテック株式会社
　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　可児隆裕

７　出願公表の年月日　　令和５年９月２５日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
アネーロオレンジ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉身の形	04 倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	04 やや粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	07 強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
アネーロオレンジ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	02 かなり粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	02 かなり狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	02 かなり弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	04 やや短
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 37C
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 150D

Limonium Mill.
アネーロオレンジ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	06 やや大
36 花冠の型	01 Ｉ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 1A
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	09 有
41 開花始期	01 極早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２００２号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　エレノアピンク（ｴﾚﾉｱﾋﾟﾝｸ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「エレノアピンク」は、対照品種「KP1415」と比較して、がくの主な色がNN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エターナルピンク」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　住化アグリテック株式会社
　大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　可児隆裕

７　出願公表の年月日　　令和５年９月２５日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
エレノアピンク

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	05 中
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	06 やや強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
エレノアピンク

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	03 弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN74C
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155A

Limonium Mill.
エレノアピンク

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	04 やや小
36 花冠の型	01 Ｉ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	01 極早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２００３号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FKL17-17

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKL17-17」は、対照品種「KP1734S」と比較して、葉の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。対照品種「アテナピンク」と比較して、一次分枝の長さがやや長であること、花序の花数がやや多であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月１５日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKL17-17

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	04 やや狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	02 かなり粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	06 やや強
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
FKL17-17

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	05 中
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	03 粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	03 弱
24 一次分枝部のたく葉の長さ	03 短
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	05 中
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN74D
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155A

Limonium Mill.
FKL17-17

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	06 やや大
36 花冠の型	02 Ⅱ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	02 乳頭状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	01 極早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２００４号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FKL18-28

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKL18-28」は、対照品種「アイスブルー」と比較して、がくの主な色が91Aであること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月１５日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKL18-28

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	05 中
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	03 狭
05 葉身の形	03 狭倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	03 淡
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	03 粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
FKL18-28

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	06 やや太
20 花茎の毛の密度	02 かなり粗
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	04 やや狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	06 やや強
24 一次分枝部のたく葉の長さ	05 中
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	06 やや長
27 花序の分枝性	06 やや強
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	05 中
30 がくの長さ	05 中
31 がくの直径	06 やや大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 91A
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157C

Limonium Mill.
FKL18-28

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	06 やや大
36 花冠の型	02 Ⅱ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157B
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	01 トウモロコシ状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	01 極早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２００５号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Limonium Mill.　　FKL18-45

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FKL18-45」は、対照品種「アテナピンク」と比較して、葉の表面の毛の密度がやや粗であること、花茎の毛の密度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨリモアキュートピンク」と比較して、葉の表面の毛の密度がやや粗であること、花茎の毛の密度が中であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福花園種苗株式会社
　愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　藤井崇治

7　出願公表の年月日　　令和５年１１月１５日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Limonium Mill.
FKL18-45

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 花序の数	04 やや少
03 葉の長さ	05 中
04 葉の幅	06 やや広
05 葉身の形	04 倒卵形
06 葉の緑色の濃淡	05 中
07 葉の光沢の強弱	05 中
08 葉の毛の有無	09 有
09 葉の表面の毛の密度	04 やや粗
10 葉の周縁の毛の密度	05 中
11 葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉の切れ込みの有無	09 有
13 葉の切れ込みの強弱	05 中
14 葉柄の有無	09 有
15 葉柄の長さ	05 中
16 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
17 茎出葉の有無	01 無

Limonium Mill.
FKL18-45

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の太さ	05 中
20 花茎の毛の密度	05 中
21 花茎の色	02 緑
22 花茎の翼の幅	03 狭
23 花茎の翼の波打ちの強弱	05 中
24 一次分枝部のたく葉の長さ	04 やや短
25 花序の型	02 Ⅱ型
26 一次分枝の長さ	05 中
27 花序の分枝性	05 中
28 分枝の方向	01 直立
29 花序の花数	06 やや多
30 がくの長さ	06 やや長
31 がくの直径	07 大
32 がくの形	02 漏斗形
33 がくの主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75A
34 がくの中肋の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155B

Limonium Mill.
FKL18-45

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の大きさ	05 中
36 花冠の型	02 Ⅱ型
37 花冠の色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 157D
38 やくに対する柱頭の位置	03 下位
39 柱頭の形	02 乳頭状
40 花の香りの有無	01 無
41 開花始期	01 極早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２００６号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium perenne L.　　PN324

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「PN324」は、対照品種「サツキワセ」と比較して、秋の草勢が弱であること、葉の緑色の濃淡が極濃であること、けい光反応性がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「ヤツカゼ2」と比較して、春化後の草姿が半立～斜上であること、穂の長さがやや短であること、越夏性がかなり弱であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名

中川洋一

７　出願公表の年月日　　令和６年５月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のペレニアルライグラスに「フユチカラ」の突然変異個体を交配し、選抜したものである。

Lolium perenne L.
PN324

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	02 2倍体
02 春の草勢	05 中
03 秋の草勢	03 弱
04 春化前の草姿	05 斜上
05 葉の長さ	02 かなり短
06 葉の幅	03 狭
07 葉の緑色の濃淡	09 極濃
08 春化後の株幅	03 狭
09 春化後の草姿	04 半立～斜上
10 春化後の草高	03 低
11 春化前の出穂性	03 弱
12 春化後の出穂期	02 かなり早
13 出穂期の草高	04 やや低
14 出穂期の株幅	05 中
15 止め葉の長さ	02 かなり短
16 止め葉の幅	02 かなり狭
17 止め葉の長さ／幅	03 小

Lolium perenne L.
PN324

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 最長稈の長さ	03 短
19 上部の節間長	03 短
20 穂の長さ	04 やや短
21 穂の小穂の数	04 やや少
22 穂の粗密	08 かなり密
23 穂の基部の小穂の包頴の長さ	02 かなり短
24 穂の基部の小穂の長さ	03 短
25 けい光反応性	02 かなり少
26 雄性不稔性	01 無
27 越夏性	02 かなり弱
28 冠さび病抵抗性	
29 葉腐病抵抗性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２００７号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Oryza sativa L.　　とよめき環1号（ﾄﾖﾒｷｶﾝ1ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「とよめき環1号」は、対照品種「とよめき」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
　茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　竹内善信　松下景　大森伸之介　後藤明俊　石川覚　安部匡　前田英郎　黒木慎
　金達英　石井卓朗　佐藤宏之　松原一樹　山口誠之　小林伸哉　平林秀介

7　出願公表の年月日　　令和４年９月８日

8　登録品種の育成の経過の概要
「とよめき」に「コシヒカリ環1号」を交配し、「とよめき」を戻し交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	02 鋭形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	03 早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	04 やや短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外頴先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 ２型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 頴の色	01 黄白
47 頴の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護頴の長さ	05 中

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 護頴の色	01 黄白
53 籾の千粒重	05 中
54 籾の長さ	05 中
55 籾の幅	05 中
56 頴のフェノール反応の有無	01 無
57 頴のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 ５型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	04 低崩壊～中間
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii, Pib
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	01 日本水稲型(+)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	04 やや弱
85 着粒密度	06 やや密

Oryza sativa L.
とよめき環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
87 セシウム吸収性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２００８号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Oryza sativa L.　　萌えみのり環1号（ﾓｴﾐﾉﾘｶﾝ1ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「萌えみのり環1号」は、対照品種「萌えみのり」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、耐倒伏性が強であること、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
　茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　太田久稔　横上晴郁　津田直人　藤村健太郎　福嶌陽　梶亮太　石川覚　安部匡

7　出願公表の年月日　　令和４年９月８日

8　登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ環1号」に「萌えみのり」を交配し、「萌えみのり」を戻し交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	02 立～半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	06 やや多
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	03 上半分のみ

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外頴先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 １型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 頴の色	01 黄白
47 頴の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護頴の長さ	05 中

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 護頴の色	01 黄白
53 籾の千粒重	05 中
54 籾の長さ	05 中
55 籾の幅	05 中
56 頴のフェノール反応の有無	01 無
57 頴のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 ５型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	07 完全崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	06 やや強
70 穂発芽性	07 難
71 耐倒伏性	07 強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	04 やや弱
75 穂いもちほ場抵抗性	05 中
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	05 中
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

Oryza sativa L.
萌えみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
87 セシウム吸収性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２００９号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Oryza sativa L.　　ちほみのり環1号（ﾁﾎﾐﾉﾘｶﾝ1ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ちほみのり環1号」は、対照品種「ちほみのり」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が強であること、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
　茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　太田久稔　横上晴郁　津田直人　藤村健太郎　福嶌陽　梶亮太　石川覚　安部匡

7　出願公表の年月日　　令和４年９月８日

8　登録品種の育成の経過の概要
「ちほみのり」に「コシヒカリ環1号」を交配し、「ちほみのり」を戻し交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	02 かなり早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	04 やや細
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	04 やや短
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	04 上3/4のみ

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外頴先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 １型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	02 かなり早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 頴の色	01 黄白
47 頴の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護頴の長さ	05 中

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 護頴の色	01 黄白
53 籾の千粒重	05 中
54 籾の長さ	05 中
55 籾の幅	05 中
56 頴のフェノール反応の有無	01 無
57 頴のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 ５型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	06 中間～完全崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	05 中
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	07 強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	07 強
75 穂いもちほ場抵抗性	06 やや強
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	04 やや弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	

Oryza sativa L.
ちほみのり環1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２００９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
87 セシウム吸収性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１０号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Oryza sativa L.　　祝2号（ｲﾜｲ2ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「祝2号」は、対照品種「吟おうみ」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや濃であること、葉身の幅がかなり広であること、稈の太さがやや太であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が61～80％であること、着粒密度が密であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫錦」と比較して、稈の太さがやや太であること、穂数が少であること、成熟期が中であること、着粒密度が密であること等で区別性が認められる。対照品種「兵庫夢錦」と比較して、葉身の幅がかなり広であること、着粒密度が密であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　京都府
　京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6　登録品種の育成をした者の氏名
　静川幸明　尾崎耕二　古谷規行

7　出願公表の年月日　　令和４年９月２９日

8　登録品種の育成の経過の概要
「兵庫錦」に「祝」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	01 無又は極粗
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	08 かなり広
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	05 中
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	06 やや太
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	03 少
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外頴先端の色	01 白
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 １型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	05 中
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 頴の色	01 黄白
47 頴の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護頴の長さ	07 長

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 護頴の色	01 黄白
53 籾の千粒重	07 大
54 籾の長さ	06 やや長
55 籾の幅	05 中
56 頴のフェノール反応の有無	
57 頴のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	07 大
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	
65 胚乳の色	01 白色
66 精米のアルカリ崩壊性	
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	
70 穂発芽性	06 やや難
71 耐倒伏性	05 中
72 脱粒性	04 やや易
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
74 葉いもちほ場抵抗性	
75 穂いもちほ場抵抗性	
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	04 61～80%
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	07 密

Oryza sativa L.
祝2号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
87 セシウム吸収性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１１号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L.　　新福1号（ｼﾝﾌｸ1ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「新福1号」は、対照品種「こなゆきひめ」と比較して、出穂期が中であること、玄米の千粒重が小であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本水稲型であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、胚乳のアミロース含量がやや低であること、玄米の千粒重が小であること、玄米の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「カグラモチ」と比較して、胚乳の型が粳であること、稈の太さが中であること、芒の分布が先端1/4であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井県
福井県福井市大手3丁目17番1号
国立大学法人新潟大学
新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6　登録品種の育成をした者の氏名

小林麻子　佐藤信仁　中岡史裕　町田芳恵　渡辺脩斗　林猛　両角悠作　清水豊弘
冨田桂　佐藤有一　西村実　森田竜平

7　出願公表の年月日　　令和５年２月９日

8　登録品種の育成の経過の概要

「コシヒカリ」の突然変異系統に「コシヒカリ」を交配したF3に「コシヒカリ」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
新福1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 胚乳の型	03 粳
02 胚乳のアミロース含量	04 やや低
03 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は弱
04 草姿	03 半立
05 葉しょう先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉しょう基部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 葉身の緑色の濃淡	05 中
08 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は弱
09 葉身の毛じ	03 中
10 葉舌の形	03 裂形
11 葉舌の色	01 白
12 出穂期	05 中
13 止め葉の長さ	06 やや長
14 止め葉の幅	03 中
15 外穎の毛じの粗密	03 中
16 柱頭の色	01 白
17 稈の長さ	07 長

Oryza sativa L.
新福1号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈の太さ	05 中
19 稈の節のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 稈の節間のアントシアニンの着色	01 無又は弱
21 穂数	05 中
22 芒の分布	02 先端1/4
23 芒の長さ	02 短
24 穂の長さ	05 中
25 外頴先端の色	01 白
26 止め葉の姿勢	04 半立～水平
27 着粒密度	06 やや密
28 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
29 穂の密着度	02 やや密着
30 穂の二次枝梗の多少	02 中
31 穂の抽出度	04 穂軸もよく抽出
32 成熟期	05 中
33 枯れ上がり時期	02 中
34 外穎の色	01 白

Oryza sativa L.
新福1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 外穎のフェノール反応による着色	
36 護穎の長さ	02 中
37 護穎の色	01 白
38 玄米の千粒重	03 小
39 玄米の長さ	04 やや短
40 玄米の幅	02 やや狭
41 玄米の長さ／幅	02 やや低
42 玄米の色	01 白
43 精米のアルカリ崩壊性	
44 玄米の香り	01 無又は極弱
45 玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
46 脱粒性	07 難
47 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	
48 障害型耐冷性	
49 耐倒伏性	
50 高温登熟性	
51 グルテリン含量	

Oryza sativa L.
新福1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 カドミウム吸収性	
53 セシウム吸収性	
54 穂発芽性	
55 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
56 いもち病抵抗性推定遺伝子型	
57 葉いもちほ場抵抗性	
58 穂いもちほ場抵抗性	
59 白葉枯病抵抗性品種群別	
60 白葉枯病ほ場抵抗性	
61 しま葉枯病抵抗性品種群別	01 日本水稲型
62 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
63 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
64 ごま葉枯病ほ場抵抗性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１２号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Oryza sativa L.　　あおもりっこ（ｱｵﾓﾘｯｺ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「あおもりっこ」は、対照品種「青天の霹靂」と比較して、胚乳のアミロース含量が高であること、着粒密度が密であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPii, Pibであること等で区別性が認められる。対照品種「まっしぐら」と比較して、胚乳のアミロース含量が高であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPii, Pibであること等で区別性が認められる。対照品種「つがるロマン」と比較して、胚乳のアミロース含量が高であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPii, Pibであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　地方独立行政法人青森県産業技術センター
　青森県黒石市田中82番地9

6　登録品種の育成をした者の氏名
　上村豊和　神田伸一郎　前田一春　小林渡　若本由加里　森山茂治　落合祐介　梶田啓　須藤充　須藤弘毅　川村陽一　今智穂美

7　出願公表の年月日　　令和５年２月２１日

8　登録品種の育成の経過の概要
「さち未来」に「青系157号」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
あおもりっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 胚乳の型	03 粳
02 胚乳のアミロース含量	07 高
03 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は弱
04 草姿	03 半立
05 葉しょう先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉しょう基部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 葉身の緑色の濃淡	04 やや淡
08 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は弱
09 葉身の毛じ	03 中
10 葉舌の形	03 裂形
11 葉舌の色	01 白
12 出穂期	04 やや早
13 止め葉の長さ	05 中
14 止め葉の幅	03 中
15 外穎の毛じの粗密	03 中
16 柱頭の色	01 白
17 稈の長さ	05 中

Oryza sativa L.
あおもりっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 稈の太さ	07 太
19 稈の節のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 稈の節間のアントシアニンの着色	01 無又は弱
21 穂数	04 やや少
22 芒の分布	05 全体
23 芒の長さ	02 短
24 穂の長さ	05 中
25 外頴先端の色	01 白
26 止め葉の姿勢	01 立
27 着粒密度	07 密
28 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
29 穂の密着度	02 やや密着
30 穂の二次枝梗の多少	02 中
31 穂の抽出度	04 穂軸もよく抽出
32 成熟期	04 やや早
33 枯れ上がり時期	03 晩
34 外穎の色	01 白

Oryza sativa L.
あおもりっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 外穎のフェノール反応による着色	
36 護穎の長さ	02 中
37 護穎の色	01 白
38 玄米の千粒重	05 中
39 玄米の長さ	05 中
40 玄米の幅	03 中
41 玄米の長さ／幅	02 やや低
42 玄米の色	05 淡褐
43 精米のアルカリ崩壊性	
44 玄米の香り	01 無又は極弱
45 玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
46 脱粒性	07 難
47 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	
48 障害型耐冷性	06 やや強
49 耐倒伏性	07 強
50 高温登熟性	
51 グルテリン含量	

Oryza sativa L.
あおもりっこ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 カドミウム吸収性	
53 セシウム吸収性	
54 穂発芽性	06 やや難
55 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
56 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pii, Pib
57 葉いもちほ場抵抗性	
58 穂いもちほ場抵抗性	
59 白葉枯病抵抗性品種群別	
60 白葉枯病ほ場抵抗性	
61 しま葉枯病抵抗性品種群別	
62 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
63 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
64 ごま葉枯病ほ場抵抗性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１３号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Petchoa J. M. H. Shaw　　SAKPXC033

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKPXC033」は、対照品種「エコチュニア ホワイト」と比較して、花筒の内面の主な色が6Aであること、花筒の内面の脈がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ディーバ ホワイト」と比較して、花筒の内面の主な色が6Aであること、花筒の内面の脈がやや強であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

６　登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

７　出願公表の年月日　　令和４年１月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

x Petchoa J. M. H. Shaw
SAKPXC033

登録番号
第３２０１３号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	06 やや広
17 花の切れ込み	02 弱

x Petchoa J. M. H. Shaw
SAKPXC033

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	02 緑
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 155C
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 6A
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 4C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	02 黄

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１４号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　YG-01

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「YG-01」は、対照品種「バリフロー　パープル」と比較して、開花初期の花の主な色がNN78Aであること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が淡青であること等で区別性が認められる。対照品種「バリフロー　チェリー」と比較して、葉の形が楕円形であること、花の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山下透

兵庫県丹波市山南町西谷403番地

６　登録品種の育成をした者の氏名

山下透

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

「ディーバ パープル」の変異株である。

Petunia Juss.
YG-01

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	09 有
09 葉の主な色	02 淡緑（斑）
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	05 中
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
YG-01

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	05 中
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N80B
32 花筒の内面の脈	08 かなり強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78C
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	04 淡青

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１５号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　KEIPEMOKOHOS

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KEIPEMOKOHOS」は、対照品種「TX716」と比較して、花の切れ込みが極強であること、花の主な色が73Aであること、花冠裂片の先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「マウントプッチ　ピンク」と比較して、茎の長さがかなり短であること、花の切れ込みが極強であること、花の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社

千葉県八千代市大和田新田755番地

６　登録品種の育成をした者の氏名

松原晋　諏訪理恵子

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月１５日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
KEIPEMOKOHOS

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	02 かなり狭
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	01 極短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	02 かなり狭
17 花の切れ込み	05 極強

Petunia Juss.
KEIPEMOKOHOS

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 73A
29 花冠裂片の先端の形	01 鋭形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	01 極狭
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155B
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 150D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１６号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　MYPET031

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MYPET031」は、対照品種「SALA2」と比較して、小花柄の長さが極短であること、花の主な色が83Bであること、花筒の外面の主な色が85Dであること等で区別性が認められる。対照品種「カミホン 19SALA」と比較して、茎の長さが短であること、小花柄の長さが極短であること、花の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

６　登録品種の育成をした者の氏名

大同原野

７　出願公表の年月日　　令和５年１２月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
MYPET031

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	03 狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	01 極短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
MYPET031

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	07 青紫
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 86B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N82A
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 85D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１７号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Petunia Juss.　　MYPET032

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「MYPET032」は、対照品種「TX643」と比較して、花の切れ込みが弱であること、花の脈がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「BHTUN19502」と比較して、開花初期の花の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　大同原野

７　出願公表の年月日　　令和５年１２月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
「MYPET010」の変異株である。

Petunia Juss.
MYPET032

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	01 極短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	02 弱

Petunia Juss.
MYPET032

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０１７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	04 やや弱
20 花の脈の色	03 黄
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 155C
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2C
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 154D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１８号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　TX982

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「TX982」は、対照品種「スウィートサンシャイン ピンクパープルベイン」と比較して、花の脈が弱であること、花筒の内面の脈がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ホイップマカロン サクラ」と比較して、花の脈の色が紫であること、花筒の内面の主な色がN81Dであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

７　出願公表の年月日　　令和５年１２月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
TX982

登録番号
第３２０１８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	02 楕円形
07 葉の先端の形	01 鋭尖形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	03 密
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	02 弱

Petunia Juss.
TX982

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76B
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81D
32 花筒の内面の脈	02 かなり弱
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 84D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０１９号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Petunia Juss.　　Surf Saihasi

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「Surf Saihasi」は、対照品種「ドームウェーブ ホワイト」と比較して、花の切れ込みが強であること、花筒の内面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フォトフィニッシュ ホワイト」と比較して、草丈が低であること、小花柄の長さが短であること、花の切れ込みが強であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　サントリーフラワーズ株式会社
　東京都港区芝四丁目17番5号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　宮崎潔

7　出願公表の年月日　　令和６年２月２２日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
Surf Saihasi

登録番号
第３２０１９号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	05 中
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	03 鈍形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	02 狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	06 やや広
17 花の切れ込み	04 強

Petunia Juss.
Surf Saihasi

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０１９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	04 強
19 花の脈	02 かなり弱
20 花の脈の色	
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
29 花冠裂片の先端の形	03 円形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	04 広
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 155C
32 花筒の内面の脈	04 やや弱
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 150D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２０号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　SHIROTAE

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SHIROTAE」は、対照品種「カミホン 19MOMO」と比較して、葉の斑の有無が有であること、葉の主な色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「バリフロー　パープル」と比較して、花型が八重であること、花の幅が狭であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

６　登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

７　出願公表の年月日　　令和６年２月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要

「カミホン 19MOMO」の変異株である。

Petunia Juss.
SHIROTAE

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	09 有
09 葉の主な色	02 淡緑
10 小花柄の長さ	02 短
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	02 中
16 花の幅	03 狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
SHIROTAE

登録番号
第３２０２０号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	04 縁部
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	01 小
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	01 無又は少
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81B
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２１号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss.　　BBTUN10102

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BBTUN10102」は、対照品種「ファンタジー　ブルー」と比較して、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。対照品種「マンボGP ブルー」と比較して、花筒の内面の脈が中であること、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。対照品種「バカラiQ ブルー」と比較して、やくの花粉の色（一重品種に限る。）が白であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名

Brent D. Barnes

７　出願公表の年月日　　令和６年３月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
BBTUN10102

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
BBTUN10102

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	07 青紫
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	02 狭
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81B
32 花筒の内面の脈	05 中
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 83D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	01 白

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２２号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Petunia Juss.　　BBTUN22503

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「BBTUN22503」は、対照品種「カミホン 19MOMO」と比較して、茎の長さがやや長であること、花筒の外面の主な色がN79Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨペEK469-1」と比較して、葉の主な色が緑であること、花の主な色がNN78Bであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　WinGen, L.L.C.
　6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Brent D. Barnes

７　出願公表の年月日　　令和６年３月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
「USTUNJ2401」に「Sundasiro」を交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
BBTUN22503

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	04 長
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	02 短
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	02 八重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	02 中
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
BBTUN22503

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	06 紫
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	03 花冠裂片の癒合部に沿う
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	02 中
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	02 中
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN78D
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N81B
32 花筒の内面の脈	06 やや強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N79D
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２３号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Petunia Juss.　　WNPESVJAZ

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「WNPESVJAZ」は、対照品種「サンリパミ」と比較して、葉の先端の形が鋭形であること、花の主な色がN78Bであること、花筒の内面の主な色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「USTUN61202」と比較して、花の主な色がN78Bであること、花筒の内面の脈が強であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　WinGen, L.L.C.
　6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Brent D. Barnes

７　出願公表の年月日　　令和６年６月１７日

８　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Petunia Juss.
WNPESVJAZ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の形	01 卵形
07 葉の先端の形	02 鋭形
08 葉の斑の有無	01 無
09 葉の主な色	03 緑
10 小花柄の長さ	03 中
11 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
12 がく片の長さ	03 中
13 がく片の幅	01 極狭
14 花型	01 一重
15 花の粗密（八重品種に限る。）	
16 花の幅	04 やや狭
17 花の切れ込み	03 中

Petunia Juss.
WNPESVJAZ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の波打ち	02 弱
19 花の脈	03 弱
20 花の脈の色	05 赤
21 花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B
22 花の二次色（二次色のある品種に限る。）	
23 花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）	
24 花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）	
25 二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）	
26 花の三次色（三次色のある品種に限る。）	
27 開花初期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78A
28 開花後期の花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B
29 花冠裂片の先端の形	02 突形
30 花筒の幅（一重品種に限る。）	03 中
31 花筒の内面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B
32 花筒の内面の脈	07 強
33 花筒の外面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 72B
34 やくの花粉の色（一重品種に限る。）	04 淡青

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２４号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Phalaenopsis Blume　　イートンMU301（ｲｰﾄﾝMU301）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「イートンMU301」は、対照品種「Sogo Yukidian V3」と比較して、中央裂片の覆色が150D,60C(縁部)であること、側裂片の覆色が150D,185C(基部)であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　有限会社ヒカル・オーキッド
　和歌山県有田市千田2041番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　盧宣志

７　出願公表の年月日　　令和６年４月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
「Sogo Yukidian V3」の変異株である。

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の長さ	07 長
02 植物体の花序の数	01 1
03 葉の長さ	04 やや短
04 葉の幅	05 中
05 葉の形	03 かなり細長い
06 葉の最大幅の位置	03 先端部
07 葉の先端の形	02 鈍形
08 葉の先端の対称性	02 非対称
09 葉の向き	03 斜上
10 葉の斑の有無	01 無
11 葉の表面の斑点の有無	01 無
12 葉の表面の主な色	03 緑
13 葉の表面のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
14 花序の型	02 総状
15 花序の長さ	07 長
16 花序の花数	04 やや少
17 花茎の長さ	07 長

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	03 太
19 花茎のアントシアニンの着色	05 強
20 花の側面の形	02 平
21 花の縦径	07 長
22 花の横径	08 かなり広
23 花のペタルの配列	01 開く
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	09 極長
26 ドーサルセパルの幅	08 かなり広
27 ドーサルセパルの形	07 縦長
28 ドーサルセパルの最大幅の位置	02 中央部
29 ドーサルセパルの縦断面の形	03 外曲
30 ドーサルセパルの横断面の形	03 凸形
31 ドーサルセパルのねじれの有無	01 無
32 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
33 ドーサルセパルの表面の地色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
34 ドーサルセパルの覆色	

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の数	01 無
36 ドーサルセパルの斑点の大きさ	
37 ドーサルセパルの斑点の色	
38 ドーサルセパルの縞斑の数	01 無
39 ドーサルセパルの縞斑の色	
40 ドーサルセパルの網斑の密度	01 無
41 ドーサルセパルの網斑の色	
42 ラテラルセパルの表面の地色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
43 ラテラルセパルの覆色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 145D
44 ラテラルセパルの斑点の数	01 無
45 ラテラルセパルの斑点の色	
46 ラテラルセパルの縞斑の数	01 無
47 ラテラルセパルの縞斑の色	
48 ラテラルセパルの網斑の密度	01 無
49 ラテラルセパルの網斑の色	
50 ペタルの長さ	07 長
51 ペタルの幅	07 広

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 ペタルの正面の形	03 横長
53 ペタルの最大幅の位置	01 基部
54 ペタルの縦断面の形	02 平
55 ペタルの横断面の形	02 平
56 ペタルのねじれの有無	01 無
57 ペタルの周縁の波打ち	01 無又は弱
58 ペタルの表面の地色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
59 ペタルの覆色	
60 ペタルの覆色の面積	
61 ペタルの斑点の数	01 無
62 ペタルの斑点の大きさ	
63 ペタルの斑点の色	
64 ペタルの縞斑の数	01 無
65 ペタルの縞斑の色	
66 ペタルの網斑の密度	01 無
67 ペタルの網斑の色	
68 リップの側裂片と中央裂片の融合	01 無

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
69 リップの中央裂片の長さ	06 やや長
70 リップの中央裂片の幅	06 やや広
71 リップの中央裂片の形	01 三角形
72 リップの融合した裂片の延長（側裂片と中央裂片が強く又は完全に融合した品種に限る。）	
73 リップのヒゲの有無	09 有
74 リップのヒゲの長さ	09 極長
75 リップの中央裂片の突起又は稜	01 無又は小
76 リップの側裂片の形	05 Ｖ型
77 リップの側裂片の巻き込み	02 中
78 リップの側裂片の大きさ	07 広
79 中央裂片の地色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
80 中央裂片の覆色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 150D,60C(縁部)
81 中央裂片の斑点の数	01 無
82 中央裂片の斑点の大きさ	
83 中央裂片の斑点の色	
84 中央裂片の縞斑の数	01 無
85 中央裂片の縞斑の色	

Phalaenopsis Blume
イートンMU301

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
86 中央裂片の網斑の密度	01 無
87 中央裂片の網斑の色	
88 側裂片の地色	RHSカラーチャート NN155C
89 側裂片の覆色	RHSカラーチャート 150D,185C(基部)
90 側裂片の斑点の数	02 少
91 側裂片の斑点の色	RHSカラーチャート 60A
92 側裂片の縞斑の数	02 少
93 側裂片の縞斑の色	RHSカラーチャート 60A
94 側裂片の網斑の密度	01 無
95 側裂片の網斑の色	
96 リップのカルス	02 盛り上る
97 カルスの色	RHSカラーチャート 12B
98 カルスの毛の有無	01 無
99 ずい柱の色	RHSカラーチャート NN155B

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２５号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Prunus avium (L.) L.　　クリスタルイエロー (ｸﾘｽﾀﾙｲｴﾛｰ)

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「クリスタルイエロー」は、対照品種「月山錦」と比較して、果実の大きさがやや大であること、核の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「紅秀峰」と比較して、果皮の色が黄であること、核の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社天香園
　山形県東根市中島通り1丁目34号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　齋藤里美

7　出願公表の年月日　　令和３年１１月２４日

8　登録品種の育成の経過の概要
「月山錦」の自然交配実生を選抜したものである。

Prunus avium (L.) L.
クリスタルイエロー

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹姿	02 半直立
03 分枝の発生の強弱	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
05 新しょうの先端の毛じの粗密	03 少
06 節間長	02 短
07 枝の皮目の数	06 やや多
08 枝の太さ	05 中
09 葉身の長さ	04 やや短
10 葉身の幅	05 中
11 葉身の長さ／幅	04 やや小
12 葉身の緑色の濃淡	04 やや淡
13 葉柄の長さ	05 中
14 葉身の長さ／葉柄の長さ	05 中
15 蜜腺の有無	09 有
16 蜜腺の色	01 緑黄
17 花の直径	05 中

Prunus avium (L.) L.
クリスタルイエロー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花弁の形	03 広倒卵形
19 花弁の重なり	02 接触
20 果実の大きさ	06 やや大
21 果実の形	02 腎臓形
22 果頂部の形	02 平
23 果実の縫合線の明瞭度	02 不明瞭
24 果柄の長さ	07 長
25 果柄の太さ	02 かなり細
26 果実と果柄の間の離層の有無	01 無
27 果皮の色	01 黄
28 果皮の皮目の大きさ	01 極小
29 果皮の皮目の数	01 極少
30 果皮の厚さ	04 やや薄
31 果肉の色	01 クリーム
32 果汁の色	02 淡黄
33 果実の硬さ	05 中
34 果実の酸味	01 低

Prunus avium (L.) L.
クリスタルイエロー

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 果実の甘味	07 高
36 果汁の多少	07 多
37 核の大きさ	04 やや小
38 核の形	01 楕円形
39 果実の大きさ／核の大きさ	07 大
40 開花始期	05 中
41 収穫始期	07 晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２６号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scaevola aemula R. Br.　　Bonsc 16100

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bonsc 16100」は、対照品種「タッチ ディープピンク」と比較して、葉の長さが短であること、花冠裂片の表面の主な色が77Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonsca 1433」と比較して、葉の長さが短であること、花冠裂片の表面の主な色が77Aであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

６　登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

７　出願公表の年月日　　令和４年６月２０日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Scaevola aemula R. Br.
Bonsc 16100

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 株幅	03 狭
03 一次側枝の長さ	04 やや短
04 一次側枝のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 一次側枝の毛	03 中
06 葉の長さ	03 短
07 葉の幅	03 狭
08 葉の形	04 へら形
09 葉の周縁部の切れ込み	01 無又は極少
10 葉の毛	03 中
11 葉の緑色の濃淡	04 濃
12 葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
13 花筒部の長さ	04 長
14 花冠の幅	04 やや狭
15 花筒部に対する花冠裂片の向き	03 半直立
16 花冠裂片の表面の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 77A
17 花冠裂片の表面の二次色の分布	01 無

Scaevola aemula R. Br.
Bonsc 16100

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花冠裂片の表面の二次色	
19 花冠裂片の目の有無	09 有
20 花冠裂片の裏面の主な色	02 紫
21 花冠裂片の裏面の中肋の主な色	03 紫
22 花冠中央裂片の長さ	02 短
23 花冠中央裂片の幅	01 極狭
24 花冠中央裂片の形	01 狭楕円形
25 花冠中央裂片の先端部の形	03 突形
26 花柱の色	02 緑紫
27 花柱上部の毛の色	02 紫

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２７号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L.　　モチハルカ（ﾓﾁﾊﾙｶ）

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「モチハルカ」は、対照品種「ユメシホウ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
熊本製粉株式会社
熊本県熊本市西区花園1丁目25-1

６　登録品種の育成をした者の氏名

乙部千雅子　八田浩一　藤郷誠　藤田雅也　小島久代　髙山敏之　関昌子　松中仁
中村俊樹　斎藤美香　山田徹　鳥井貴博　道脇隼一　陣野和佳奈

７　出願公表の年月日　　令和４年３月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要

「wxチクゴイズミ」に「ユメシホウ」を交配したF1に「ユメシホウを」4回戻し交配したものから選抜したものである。

Triticum aestivum L.
モチハルカ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	02 赤
02 種子のフェノール反応による着色の濃淡	07 濃
03 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 草姿	04 半立～中
05 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	06 やや高
06 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
07 出穂期	04 やや早
08 止め葉の葉しょうの白粉の強弱	05 中
09 止め葉の白粉の強弱	03 弱
10 穂の白粉の強弱	03 弱
11 穂首の白粉の強弱	05 中
12 護頴の外面の毛の有無	01 無
13 草丈	04 やや低
14 穂首節直下の節間の髄の厚さ	01 薄
15 粒着密度	06 やや密
16 穂の長さ	04 やや短
17 芒の有無	03 長芒有り

Triticum aestivum L.
モチハルカ

登録番号
第３２０２７号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 穂の先端の芒の長さ	06 やや長
19 穂の色	02 着色
20 穂の形	05 紡錘状
21 穂軸の先端凸部表面の毛	03 小
22 護頴の肩部の幅	05 中
23 護頴の肩部の形	05 水平
24 護頴の嘴の長さ	07 長
25 護頴の嘴の形	03 やや曲がる
26 護頴の内側の毛	02 やや小
27 まき性	03 春まき型
28 グルテニン組成：Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド無し
29 グルテニン組成：Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	03 バンド7+9
30 グルテニン組成：Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	04 バンド5+10
31 稈の長さ	04 やや短
32 桴の色	04 褐
33 粒の形	03 楕円
34 千粒重	06 やや大

Triticum aestivum L.
モチハルカ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 うるち・もちの別	02 もち
36 成熟期	03 早
37 粒質	02 中間質

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２８号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Triticum aestivum L.　　ちくだい1号（ﾁｸﾀﾞｲ1ｺﾞｳ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ちくだい1号」は、対照品種「ゆめかおり」と比較して、しょう葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、止め葉の葉しょうの白粉が弱であること、稈の長さが長であること、穂の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「春よ恋St」と比較して、穂首の白粉が中であること、稈の長さが長であること、護頴の嘴の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「はるきらり」と比較して、稈の長さが長であること、穂の長さが長であること、護頴の嘴の長さが長であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　国立大学法人北海道国立大学機構
　北海道帯広市稲田町西2線11番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　大西一光

７　出願公表の年月日　　令和５年１１月１５日

８　登録品種の育成の経過の概要
「はるきらり」に「KU-1025」（スペルトコムギ）を交配し、選抜したものである。

Triticum aestivum L.
ちくだい1号

登録番号
第３２０２８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	02 赤
02 種子のフェノール反応による着色の濃淡	07 濃
03 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	07 強
04 草姿	03 半立
05 反曲した止め葉を持つ個体の出現頻度	08 かなり高
06 止め葉の葉耳のアントシアニン着色	01 無又は弱
07 出穂期	05 中
08 止め葉の葉しょうの白粉	03 弱
09 止め葉の白粉	04 やや弱
10 穂の白粉	04 やや弱
11 穂首の白粉	05 中
12 護頴の外面の毛の有無	01 無
13 草丈	07 高
14 稈の長さ	07 長
15 穂首節直下の節間の髄の厚さ	01 薄
16 粒着密度	03 粗
17 穂の長さ	07 長

Triticum aestivum L.
ちくだい1号

登録番号
第３２０２８号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 芒の有無	03 長芒有り
19 穂の先端の芒の長さ	08 かなり長
20 穂の色	01 白
21 穂の形	05 紡錘状
22 穂軸の先端凸部表面の毛	01 無又は極小
23 護頴の肩部の幅	05 中
24 護頴の肩部の形	07 やや上がる
25 護頴の嘴の長さ	07 長
26 護頴の嘴の形	01 直
27 護頴の内側の毛	01 極小
28 ふの色	02 黄
29 粒の形	04 狭楕円
30 成熟期	06 やや晩
31 千粒重	08 かなり大
32 胚乳の型	01 うるち
33 粒質	02 中間質
34 まき性	03 春まき型

Triticum aestivum L.
ちくだい1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 穂発芽性	
36 グルテニン組成：Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	
37 グルテニン組成：Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	
38 グルテニン組成：Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０２９号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi　　紫さやか（ﾑﾗｻｷｻﾔｶ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「紫さやか」は、対照品種「エリモ167」と比較して、胚軸の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社バイオテック
　北海道河西郡芽室町東芽室基線15番4号
　株式会社御座候
　兵庫県姫路市阿保甲611番地の1

６　登録品種の育成をした者の氏名
　長岡泰良　長岡寛知　山田宗平　小河俊郁

７　出願公表の年月日　　平成３０年９月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
「エリモショウズ」と「しゅまり」を交配し、選抜したものである。

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi
紫さやか

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	01 叢生
02 胚軸のアントシアニンの着色	01 無又は弱
03 胚軸の長さ	04 やや長
04 頂小葉の長さ／幅	04 やや小
05 頂小葉の切れ込み	01 無又は浅
06 開花期	05 中
07 茎の長さ	04 やや短
08 さやの長さ	05 中
09 さやの幅	06 やや広
10 さやの色	03 褐
11 成熟期	05 中
12 側枝数	05 中
13 主茎の節数	05 中
14 さや内粒数	03 中
15 子実の長さ／幅	03 中
16 子実の地色	04 赤
17 子実の斑紋の色	01 無

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi
紫さやか

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０２９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 子実の斑紋の種類	01 無
19 子実の百粒重	05 中
20 生態型	01 夏小豆型
21 アズキ落葉病菌レース1抵抗性	09 有
22 アズキ落葉病菌レース2抵抗性	01 無

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３０号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi　　きたいろは (ｷﾀｲﾛﾊ)

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「きたいろは」は、対照品種「エリモ167」と比較して、胚軸の長さがやや長であること、主茎の節数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「紫さやか」と比較して、主茎の節数が少であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西十一丁目1番地8

6　登録品種の育成をした者の氏名

中田優貴　中川浩輔　佐藤博一　長澤秀高　奥山昌隆　佐藤仁　萩原誠司　山口直矢　鴻坂扶美子　田澤暁子　村田暢明

7　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

8　登録品種の育成の経過の概要

「十育165号」に「十育161号」を交配し、選抜したものである。

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi
きたいろは

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	01 叢生
02 胚軸のアントシアニンの着色	01 無又は弱
03 胚軸の長さ	04 やや長
04 頂小葉の長さ／幅	05 中
05 頂小葉の切れ込み	01 無又は浅
06 開花期	05 中
07 茎の長さ	04 やや短
08 さやの長さ	05 中
09 さやの幅	06 やや広
10 さやの色	03 褐
11 成熟期	05 中
12 側枝数	07 多
13 主茎の節数	03 少
14 さや内粒数	03 中
15 子実の長さ／幅	02 やや小
16 子実の地色	04 赤
17 子実の斑紋の色	01 無

Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi
きたいろは

登録番号
第３２０３０号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 子実の斑紋の種類	01 無
19 子実の百粒重	06 やや大
20 生態型	01 夏小豆型
21 アズキ落葉病菌レース1抵抗性	09 有
22 アズキ落葉病菌レース2抵抗性	01 無

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３１号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1063

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1063」は、対照品種「ザハラ ダブルイエロー」と比較して、舌状花の長さ／幅が低であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKZIN012」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の縦方向の曲がりが平であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の黄色系の八重咲き育成系統に黄色系の大輪コンパクト一重咲き育成系統を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1063

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	04 密
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	03 中
09 葉の最大幅の位置	01 基部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	02 中
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	02 やや短
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	03 八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	

Zinnia L.
TZ1063

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	03 小
19 頭花の舌状花の数	05 中
20 舌状花の長さ	04 やや短
21 舌状花の幅	05 極広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	02 弱い凹
24 舌状花の縦方向の曲がり	02 平
25 舌状花の曲がる部位	
26 舌状花の曲がりの強さ	
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2A
29 舌状花の二次色	
30 舌状花の二次色の分布	01 無
31 舌状花の二次色の模様	
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1063

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３２号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1064

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1064」は、対照品種「SAKZIN014」と比較して、舌状花の縦方向の曲がりが平であること、舌状花の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の桃色系の半八重咲き育成系統に濃橙色系の大輪一重咲き育成系統を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1064

登録番号
第３２０３２号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	03 中
09 葉の最大幅の位置	01 基部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	01 無又は弱
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	03 中
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	02 半八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	01 デイジー

Zinnia L.
TZ1064

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	03 小
19 頭花の舌状花の数	03 少
20 舌状花の長さ	04 やや短
21 舌状花の幅	04 広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	02 弱い凹
24 舌状花の縦方向の曲がり	02 平
25 舌状花の曲がる部位	
26 舌状花の曲がりの強さ	
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 53C
29 舌状花の二次色	
30 舌状花の二次色の分布	01 無
31 舌状花の二次色の模様	
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1064

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	03 橙
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	03 中

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３３号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1065

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1065」は、対照品種「TZ960」と比較して、葉の周縁の波打ちが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ザハラ ダブルチェリー」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、葉の周縁の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
「ザハラ ダブルファイヤー」に出願者所有の桃色系の八重咲き育成系統を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1065

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	04 高
09 葉の最大幅の位置	02 中央部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	02 中
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	02 やや短
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	03 八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	

Zinnia L.
TZ1065

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	03 小
19 頭花の舌状花の数	04 やや少
20 舌状花の長さ	04 やや短
21 舌状花の幅	04 広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	03 平
24 舌状花の縦方向の曲がり	03 外反
25 舌状花の曲がる部位	01 先端部1/4
26 舌状花の曲がりの強さ	01 極弱
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 61B
29 舌状花の二次色	
30 舌状花の二次色の分布	01 無
31 舌状花の二次色の模様	
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1065

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３４号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1066

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1066」は、対照品種「ザハラ スターライトローズ」と比較して、頭花の型が半八重であること、舌状花の二次色の分布が基部1/2であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の蛇の目系育成系統を集団採種し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1066

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	03 中
09 葉の最大幅の位置	02 中央部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	02 中
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	02 やや短
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	02 半八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	01 デイジー

Zinnia L.
TZ1066

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	03 小
19 頭花の舌状花の数	03 少
20 舌状花の長さ	04 やや短
21 舌状花の幅	03 中
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	01 強い凹
24 舌状花の縦方向の曲がり	02 平
25 舌状花の曲がる部位	
26 舌状花の曲がりの強さ	
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155C
29 舌状花の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 63C
30 舌状花の二次色の分布	04 基部1/2
31 舌状花の二次色の模様	01 一様
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1066

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	03 橙
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	03 中

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３５号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1067

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1067」は、対照品種「TZ960」と比較して、茎のアントシアニンの着色が強であること、葉の周縁の波打ちが中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の橙色系の大輪一重咲き育成系統に（「プチランド オレンジ」×「キューピッド」）後代を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1067

登録番号
第３２０３５号

登録品種の植物体の特性記録部

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	04 密
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	04 高
09 葉の最大幅の位置	01 基部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	02 中
12 葉の緑色の濃淡	04 濃
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	02 やや小
14 花柄の長さ	02 やや短
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	02 半八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	01 デイジー

Zinnia L.
TZ1067

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	03 小
19 頭花の舌状花の数	04 やや少
20 舌状花の長さ	04 やや短
21 舌状花の幅	04 広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	02 弱い凹
24 舌状花の縦方向の曲がり	01 内曲
25 舌状花の曲がる部位	01 先端部1/4
26 舌状花の曲がりの強さ	01 極弱
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 54B
29 舌状花の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 10B
30 舌状花の二次色の分布	08 至る所
31 舌状花の二次色の模様	02 斑点
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1067

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	04 紫
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	03 中

１　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３６号　　令和８年１１月１２日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1068

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1068」は、対照品種「ザハラ レッド」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、舌状花の縦方向の曲がりが外反であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKZIN015」と比較して、茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、舌状花の主な色が42Aであること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に（「プチランド オレンジ」×「キューピッド」）後代を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1068

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	02 かなり低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	05 極高
09 葉の最大幅の位置	02 中央部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	01 無又は弱
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	02 やや短
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	01 一重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	01 デイジー

Zinnia L.
TZ1068

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	04 やや小
19 頭花の舌状花の数	02 かなり少
20 舌状花の長さ	05 中
21 舌状花の幅	05 極広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	03 平
24 舌状花の縦方向の曲がり	03 外反
25 舌状花の曲がる部位	01 先端部1/4
26 舌状花の曲がりの強さ	02 弱
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 42A
29 舌状花の二次色	
30 舌状花の二次色の分布	01 無
31 舌状花の二次色の模様	
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1068

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	04 紫
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	02 小

1　品種登録の番号及び年月日　　第３２０３７号　　令和８年１１月１２日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Zinnia L.　　TZ1069

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「TZ1069」は、対照品種「ザハラ イエロー」と比較して、葉の周縁の波打ちが中であること、舌状花の幅が極広であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　タキイ種苗株式会社
　京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　前田裕行　向井豊

7　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

8　登録品種の育成の経過の概要
「ザハラ ダブルイエロー」に出願者所有の橙色系の大輪一重咲き系統を交配し、選抜したものである。

Zinnia L.
TZ1069

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 側枝の粗密	05 極密
04 茎の毛の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
06 葉の長さ	03 中
07 葉の幅	02 狭
08 葉の長さ／幅	03 中
09 葉の最大幅の位置	02 中央部
10 葉の横断面の形	01 平
11 葉の周縁の波打ち	02 中
12 葉の緑色の濃淡	03 中
13 葉の基部のアントシアニン着色の大きさ	01 無又は小
14 花柄の長さ	03 中
15 頭花の葉群に対する位置	02 同じ
16 頭花の型	02 半八重
17 頭花の花盤の型（一重又は半八重品種に限る。）	01 デイジー

Zinnia L.
TZ1069

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３２０３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 頭花の直径	04 やや小
19 頭花の舌状花の数	02 かなり少
20 舌状花の長さ	05 中
21 舌状花の幅	05 極広
22 舌状花の長さ／幅	02 低
23 舌状花の横断面の形	02 弱い凹
24 舌状花の縦方向の曲がり	02 平
25 舌状花の曲がる部位	
26 舌状花の曲がりの強さ	
27 舌状花の先端部の形	04 切込形
28 舌状花の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 2A
29 舌状花の二次色	
30 舌状花の二次色の分布	01 無
31 舌状花の二次色の模様	
32 舌状花の三次色	
33 舌状花の三次色の分布	01 無
34 舌状花の三次色の模様	

Zinnia L.
TZ1069

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３２０３７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花盤の色（一重又は半八重品種に限る。）	02 黄
36 花盤の直径（一重又は半八重品種に限る。）	02 小