

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 2 4 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. DBRAFRESPU

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は直立、草丈は低、株の幅は狭、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は上位半分、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は1/3～2/3、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は三角形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色は72B、頭花の葉に対する位置はやや上位、頭花の直径はやや大、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数はかなり多、花盤の主な色（管状花の開花前）は143A、花盤の主な色（管状花の開花後）は3A、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の形は線形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN81B、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN81Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DBRAFRESPU」は、対照品種「DBRASC9」と比較して、頭花の舌状花の数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーフェイスピンク」と比較して、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）が無又は極弱であること、頭花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 5029700, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 叢生
02 草姿（叢生型品種に限る。）	01 直立
03 茎の数（叢生型品種に限る。）	04 やや少
04 草丈	03 低
05 株の幅	03 狭
06 株の粗密	05 中
07 葉の長さ	05 中
08 葉の幅	03 狭
09 葉の周縁の形	02 切れ込み
10 葉の形（全縁葉品種に限る。）	
11 葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）	02 上位半分
12 葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）	02 1/3～2/3
13 葉の切れ込みの規則性（切れ込み葉品種に限る。）	01 定形
14 葉裂片の最大幅（切れ込み葉品種に限る。）	05 中
15 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）	01 三角形
16 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）2	
17 葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）	01 尖形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）	01 無又は極弱
19 花茎の長さ	02 かなり短
20 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無
21 つぼみの色	RHSカラーチャート 72B
22 頭花の葉に対する位置	02 やや上位
23 頭花の直径	06 やや大
24 頭花の直径に対する花盤の直径	01 1/3未満
25 頭花の舌状花の数	08 かなり多
26 花盤の主な色（管状花の開花前）	RHSカラーチャート 143A
27 花盤の主な色（管状花の開花後）	RHSカラーチャート 3A
28 舌状花の長さ	05 中
29 舌状花の幅	05 中
30 舌状花の形	02 線形
31 舌状花の開花直後の表面の主な色	RHSカラーチャート N81B
32 舌状花の開花盛期の表面の主な色	RHSカラーチャート N81C

1 品種登録の番号及び年月日 第29425号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. Bonbra 1277

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は斜上、草丈はかなり低、株の幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は全体、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は2/3以上、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は線形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色は150D、頭花の葉に対する位置はやや上位、頭花の直径は中、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数はやや多、花盤の主な色（管状花の開花前）は143B、花盤の主な色（管状花の開花後）は2A、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はNN155D、舌状花の開花盛期の表面の主な色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonbra 1277」は、対照品種「Bonbraho」と比較して、頭花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「BELLISSIMA WHITE」と比較して、頭花の直径が中であること、頭花の舌状花の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Shaun Rebello Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和元年8月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Brachyscome Cass.
Bonbra 1277

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 叢生
02 草姿（叢生型品種に限る。）	03 斜上
03 茎の数（叢生型品種に限る。）	04 やや少
04 草丈	02 かなり低
05 株の幅	03 狭
06 株の粗密	06 やや密
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の周縁の形	02 切れ込み
10 葉の形（全縁葉品種に限る。）	
11 葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）	03 全体
12 葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）	03 2/3以上
13 葉の切れ込みの規則性（切れ込み葉品種に限る。）	01 定形
14 葉裂片の最大幅（切れ込み葉品種に限る。）	03 狭
15 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）	03 線形
16 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）2	
17 葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）	01 尖形

Brachyscome Cass.
Bonbra 1277

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）	01 無又は極弱
19 花茎の長さ	02 かなり短
20 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無
21 つぼみの色	RHSカラーチャート 150D
22 頭花の葉に対する位置	02 やや上位
23 頭花の直径	05 中
24 頭花の直径に対する花盤の直径	01 1/3未満
25 頭花の舌状花の数	06 やや多
26 花盤の主な色（管状花の開花前）	RHSカラーチャート 143B
27 花盤の主な色（管状花の開花後）	RHSカラーチャート 2A
28 舌状花の長さ	04 やや短
29 舌状花の幅	05 中
30 舌状花の形	03 長円形
31 舌状花の開花直後の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
32 舌状花の開花盛期の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 2 6 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. Goldmat

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は斜上、草丈はかなり低、株の幅はかなり狭、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は上位半分、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は1/3～2/3、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は線形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色は85B、頭花の葉に対する位置は同位、頭花の直径は小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数はやや少、花盤の主な色（管状花の開花前）は143C、花盤の主な色（管状花の開花後）は1B、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN82B、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN82Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Goldmat」は、対照品種「マウブディライト」と比較して、茎の数（叢生型品種に限る。）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「DBRASC9」と比較して、頭花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KONG YOUNG PARK

87, Jinsangmi-ro 924beon-gil, Moga-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

KONG YOUNG PARK

7 出願公表の年月日 令和元年 1 0 月 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

B. multifida（在来系統）に放射線を照射して得られた変異株である。

Brachyscome Cass.
Goldmat

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 叢生
02 草姿（叢生型品種に限る。）	03 斜上
03 茎の数（叢生型品種に限る。）	06 やや多
04 草丈	02 かなり低
05 株の幅	02 かなり狭
06 株の粗密	07 密
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅	02 かなり狭
09 葉の周縁の形	02 切れ込み
10 葉の形（全縁葉品種に限る。）	
11 葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）	02 上位半分
12 葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）	02 1/3～2/3
13 葉の切れ込みの規則性（切れ込み葉品種に限る。）	01 定形
14 葉裂片の最大幅（切れ込み葉品種に限る。）	04 やや狭
15 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）	03 線形
16 葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）2	
17 葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）	01 尖形

Brachyscome Cass.
Goldmat

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）	01 無又は極弱
19 花茎の長さ	02 かなり短
20 花茎のアントシアニン着色の強弱	01 無
21 つぼみの色	RHSカラーチャート 85B
22 頭花の葉に対する位置	01 同位
23 頭花の直径	03 小
24 頭花の直径に対する花盤の直径	01 1/3未満
25 頭花の舌状花の数	04 やや少
26 花盤の主な色（管状花の開花前）	RHSカラーチャート 143C
27 花盤の主な色（管状花の開花後）	RHSカラーチャート 1B
28 舌状花の長さ	03 短
29 舌状花の幅	03 狭
30 舌状花の形	03 長円形
31 舌状花の開花直後の表面の主な色	RHSカラーチャート N82B
32 舌状花の開花盛期の表面の主な色	RHSカラーチャート N82C

1 品種登録の番号及び年月日 第29427号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delosperma N. E. Br. 清水212スカーレット (シミス212スカーレット)

3 登録品種の特性の概要

樹型は斜上、枝の長さはかなり短、葉の形は披針形、葉の長さはやや短、葉の厚さはかなり薄、葉の色は緑、葉の表面の突起の有無は有、葉の表面の突起の形はⅢ型、花の形は水平、花の大きさはやや小、花の中心部の色は13A、花弁の幅は中、花弁の表面の主な色はN34A、花弁の表面の複色の有無は有、花弁の表面の二次色はN74C、花弁の数はやや少、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「清水212スカーレット」は、対照品種「砂漠の宝石ルビー」と比較して、花弁の幅が中であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

清水登
京都府向日市森本町東ノ口31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水登

7 出願公表の年月日 平成29年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

ヒメマツバギクに育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Delosperma N. E. Br.
清水212スカーレット

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹型	02 斜上
02 樹高	03 低
03 株の幅	02 かなり狭
04 枝の長さ	02 かなり短
05 枝の太さ	04 やや細
06 節間長	02 かなり短
07 葉の形	02 披針形
08 葉の長さ	04 やや短
09 葉の幅	03 狭
10 葉の厚さ	02 かなり薄
11 葉の色	02 緑
12 葉の表面の突起の有無	09 有
13 葉の表面の突起の形	03 III型
14 花の形	03 水平
15 花の大きさ	04 やや小
16 花柄の長さ	03 短
17 花の中心部の色	RHSカラーチャート 13A

清水212スカーレット

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

重要な形質に係る特性

05 中

RHSカラーチャート N34A

09 有

RHSカラーチャート N74C

04 やや少

09 有

02 四季咲き

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 2 8 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Epipremnum pinnatum (L.) Engl. Asaoka Second

3 登録品種の特性の概要

茎の長さは中、茎の太さは中、茎の色数は 2、茎の主な色は 137B、茎の二次色は 143C、茎の毛の有無は無、節間長は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の厚さは中、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身のしわの有無は無、葉身の裏面の突起の有無は無、葉身の模様の有無は有、葉身の模様は中斑、葉身の色数は 2、葉身の主な色は 137B、葉身の二次色は 144A、葉柄の長さは中、葉柄の主な色は 144A である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Asaoka Second」は、対照品種「テルノカーニバル」と比較して、茎の色数が 2 であること、葉身の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅岡宏明

愛知県安城市根崎町北根 180-7

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅岡宏明

7 出願公表の年月日 令和 2 年 4 月 1 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「マーブル クイーン」の変異株である。

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
Asaoka Second

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 茎の太さ	05 中
03 茎の色数	02 2
04 茎の主な色	RHSカラーチャート 137B
05 茎の二次色	RHSカラーチャート 143C
06 茎の毛の有無	01 無
07 節間長	05 中
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の厚さ	05 中
11 葉身の形	02 卵形
12 葉身の先端部の形	02 鋭尖形
13 葉身の基部の形	03 心形
14 葉身の切れ込みの有無	01 無
15 葉身のしわの有無	01 無
16 葉身の裏面の突起の有無	01 無
17 葉身の模様の有無	09 有

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
Asaoka Second

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の模様	03 中斑
19 葉身の掃き込みの大きさ	
20 葉身の色数	02 2
21 葉身の主な色	RHSカラーチャート 137B
22 葉身の二次色	RHSカラーチャート 144A
23 葉身の三次色	
24 葉身の四次色	
25 葉柄の長さ	05 中
26 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 144A
27 株の基部の葉における葉身の主な色	RHSカラーチャート 137B
28 株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）	RHSカラーチャート 144A

1 品種登録の番号及び年月日 第29429号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. KKWP

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はやや高、茎の緑色の濃淡は中、節間長はかなり短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は濃、葉身の斑の有無は無、葉身のアントシアニンの着色は中、葉柄の長さはやや長、花房の幅は中、小花房の幅はやや狭、花序の幅は狭、ほう葉の多少は中、ほう葉の長さはやや短、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の表面の主な色はN155B、ほう葉の裏面の主な色は53Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KKWP」は、対照品種「Balbreblus」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、ほう葉の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川園芸株式会社
栃木県下野市田中535

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川弘一

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

E. hypericifolia（在来系統）の変異株である。

Euphorbia hypericifolia L.
KKWP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 草丈	06 やや高
03 側枝の数	07 多
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎の緑色の濃淡	05 中
06 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
07 節間長	02 かなり短
08 葉身の長さ	03 短
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の形	01 卵形
11 葉身の先端の形	01 鋭形
12 葉身の基部の形	02 鈍形
13 葉身の緑色の濃淡	07 濃
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の模様の大きさ	01 無又は極小
16 葉身のアントシアニンの着色	03 中
17 葉身のアントシアニン着色部の面積	04 大

Euphorbia hypericifolia L.
KKWP

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29429号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	06 やや長
19 葉柄の色	05 褐
20 花房の幅	05 中
21 小花房の幅	04 やや狭
22 花序の幅	03 狭
23 ほう葉の多少	05 中
24 ほう葉の長さ	04 やや短
25 ほう葉の幅	03 狭
26 ほう葉の形	03 倒卵形
27 ほう葉の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
28 ほう葉の表面の二次色	RHSカラーチャート 61D
29 ほう葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 53C
30 ほう葉の裏面の二次色	RHSカラーチャート N155B

1 品種登録の番号及び年月日 第29430号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. PAS1292239

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、草丈はかなり高、茎の緑色の濃淡は中、節間長は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の斑の有無は無、葉身のアントシアニンの着色は無又は極弱、葉柄の長さはやや長、花房の幅はやや狭、小花房の幅は中、花序の幅はやや狭、ほう葉の多少は少、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の表面の主な色はNN155D、ほう葉の裏面の主な色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PAS1292239」は、対照品種「PAS782694」と比較して、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「インユーフェ」と比較して、草丈がかなり高であること、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ball Horticultural Company
622 Town Road West Chicago, Illinois 60185, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 令和2年5月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統を両親とする交雑品種である。

Euphorbia hypericifolia L.
PAS1292239

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 草丈	08 かなり高
03 側枝の数	07 多
04 茎の太さ	05 中
05 茎の緑色の濃淡	05 中
06 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
07 節間長	05 中
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の形	01 卵形
11 葉身の先端の形	02 鈍形
12 葉身の基部の形	02 鈍形
13 葉身の緑色の濃淡	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の模様の大きさ	01 無又は極小
16 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
17 葉身のアントシアニン着色部の面積	01 無又は極小

Euphorbia hypericifolia L.
PAS1292239

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	06 やや長
19 葉柄の色	04 緑褐
20 花房の幅	04 やや狭
21 小花房の幅	05 中
22 花序の幅	04 やや狭
23 ほう葉の多少	03 少
24 ほう葉の長さ	05 中
25 ほう葉の幅	03 狭
26 ほう葉の形	03 倒卵形
27 ほう葉の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
28 ほう葉の表面の二次色	
29 ほう葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
30 ほう葉の裏面の二次色	

1 品種登録の番号及び年月日 第29431号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray 雪国舞14号 (ユキグニマイ14ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は密、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度はやや高、子実体株の径は大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さは薄、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みは無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は白色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は無、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は細形、発生最盛期までの期間中は、子実体の生育最適温度は中、収量性はかなり多である。

出願品種「雪国舞14号」は、対照品種「森M60号」と比較して、菌糸密度が密であること、発生最盛期までの期間が中であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、気中菌糸の発達状態が多であること、菌叢の厚さが厚であること、菌糸体の温度別成長速度(10℃/日)がやや速であること、菌糸体の温度別成長速度(15℃/日)がかなり速であること、菌さんの表面の色が白色であること、菌さんの表面の環紋の形状が無であること、培養菌床の表面被(皮)膜の形成が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社雪国まいたけ
新潟県南魚沼市余川89番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

下田隆史 賈俊業 清水琢登 佐藤真之

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「雪国舞10号」の変異株と「雪国舞12号」の変異株を交配し、選抜したものである。

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
雪国舞14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	07 密
02 気中菌糸の発達状態	07 多
03 菌叢周縁部の形状	01 均質
04 菌叢の厚さ	07 厚
05 菌叢表面の着色の有無	01 無
06 菌叢表面の形状	01 平滑
07 菌糸体生長最適温度	06 やや高
08 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	06 やや速
09 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	08 かなり速
10 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	06 やや速
11 菌糸体の温度別成長速度 (25° C/日)	05 中
12 菌糸体の温度別成長速度 (30° C/日)	03 遅
13 子実体株の径	07 大
14 菌さんの大きさ	04 やや小
15 菌さんの厚さ	03 薄
16 菌さんの形状	01 扇状
17 菌さんの縁部の切れ込み	01 無

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
雪国舞14号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの断面の形	02 水平
19 菌さんの表面の色	01 白色
20 菌さんの肉質	06 やや硬
21 菌さんの表面の環紋の形状	01 無
22 管孔発達の部位	07 菌柄付近まで
23 子実体株の基部の形	01 細形
24 培養菌床の表面被（皮）膜の形成	07 多
25 培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無	09 有
26 原基形成までの期間	03 短
27 発生最盛期までの期間	05 中
28 子実体の生育最適温度	05 中
29 収量性	08 かなり多
30 菌糸同士の帯線形成の有無	
31 菌糸同士の嫌蝕反応の有無	

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 3 2 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hebe Comm. ex Juss. Lowangel ()

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや高、幼しょうのアントシアニンの着色は無又は極弱、幼しょうの毛の有無は有、新しょうの枝の色は紫黒、枝の節間長はやや短、葉芽の隙間の有無は無、葉柄の有無は無、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の形は倒卵形、葉身の最大幅の位置は先端部、葉身の先端の形は鋭形、葉身の周縁の鋸歯の有無は無、葉身の主な色はNN137A、葉身の二次色の分布は主脈部、葉身の二次色は187B、葉身の三次色の分布は覆輪、葉身の三次色は200Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Lowangel」は、対照品種「Purple Pixie」と比較して、新しょうの枝の色が紫黒であること、葉身の光沢が中であること等で区別性が認められる。対照品種「UNGVE11」と比較して、樹姿が開張であること、幼しょうのアントシアニンの着色が無又は極弱であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ian John Ashton
Hook Lane Warsash Hampshire SO31 9HH, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ian John Ashton

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 7 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の変異株である。

Hebe Comm. ex Juss.
Lowangel

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29432号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	06 やや高
03 葉の粗密	05 中
04 幼しょうのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 幼しょうの毛の有無	09 有
06 幼しょうの毛の粗密	02 粗
07 新しょうの枝の色	09 紫黒
08 枝の節間長	04 やや短
09 枝の節間のアントシアニンの着色	07 強
10 葉芽の隙間の有無	01 無
11 葉柄の有無	01 無
12 葉柄の長さ	
13 葉の着生角度	03 やや斜上
14 葉身の長さ	03 短
15 葉身の幅	03 狭
16 葉身の長さ／幅	04 やや小
17 葉身の形	06 倒卵形

Hebe Comm. ex Juss.
Lowangel

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29432号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の最大幅の位置	03 先端部
19 葉身の先端の形	02 鋭形
20 葉身の横断面の形	02 平
21 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
22 葉身の主な色	RHSカラーチャート NN137A
23 葉身の二次色の分布	06 主脈部
24 葉身の二次色	RHSカラーチャート 187B
25 葉身の二次色の面積	01 極小
26 葉身の三次色の分布	02 覆輪
27 葉身の三次色	RHSカラーチャート 200A
28 葉身の光沢	03 中
29 葉身のろう質	01 無又は極弱
30 花序の着生位置	
31 花序の形	
32 花序の長さ	
33 花序の幅	
34 花序の花の粗密	

Hebe Comm. ex Juss.
Lowangel

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の色の変化の強弱 36 花冠の幅 37 花冠裂片の表面の色 38 花筒部のがくに対する長さ 39 花筒部の外面の色 40 花序の数	

1 品種登録の番号及び年月日 第29433号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEUROYRU

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1は184A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2は185D、若葉の葉身の色2の分布は中央部の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様はぼかし、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、葉柄の主な色は187C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1は178A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187D、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色は185A、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密はかなり粗、つぼみの色は51C、花の向きはやや下向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外面の色は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INHEUROYRU」は、対照品種「TerMahogany」と比較して、花茎の花の粗密がかなり粗であること、花の外面の色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Fire Alarm」と比較して、花茎の花の着生する部位の長さが中であること、花茎の花の粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Heuchera L.
INHEUROYRU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株幅	05 中
03 葉の粗密	07 密
04 若葉の葉身の色1	RHSカラーチャート 184A
05 若葉の葉身の色1の分布	08 全体
06 若葉の葉身の色1の模様	05 均一
07 若葉の葉身の色1の面積	07 大
08 若葉の葉身の色2	RHSカラーチャート 185D
09 若葉の葉身の色2の分布	05 中央部の葉脈間
10 若葉の葉身の色2の模様	01 ぼかし
11 若葉の葉身の色2の面積	02 かなり小
12 若葉の葉身の色3	
13 若葉の葉身の色3の分布	01 無
14 若葉の葉身の色3の模様	
15 若葉の葉身の色3の面積	
16 若葉の葉身の色4	
17 若葉の葉身の色4の分布	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若葉の葉身の色4の模様	
19 若葉の葉身の色4の面積	
20 葉柄の長さ	06 やや長
21 葉柄の毛の粗密	03 中
22 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 187C
23 葉身の長さ	05 中
24 葉身の幅	05 中
25 葉身の長さ／幅	03 小
26 葉身の先端部の形	03 円形
27 葉身裂片の切れ込みの深さ	05 中
28 葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘ レラ属に限る。）	
29 葉身の周縁部の欠刻の数	03 中
30 葉身の周縁部の欠刻の深さ	03 中
31 葉身の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
32 葉身のしわ	02 かなり弱
33 葉身の光沢	01 無又は極弱
34 葉身の毛の粗密	03 中

Heuchera L.
INHEUROYRU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の裏面の毛の粗密	02 粗
36 葉身の色1	RHSカラーチャート 178A
37 葉身の色1の分布	08 全体
38 葉身の色1の模様	05 均一
39 葉身の色1の面積	09 極大
40 葉身の色2	
41 葉身の色2の分布	01 無
42 葉身の色2の模様	
43 葉身の色2の面積	
44 葉身の色3	
45 葉身の色3の分布	01 無
46 葉身の色3の模様	
47 葉身の色3の面積	
48 葉身の色4	
49 葉身の色4の分布	01 無
50 葉身の色4の模様	
51 葉身の色4の面積	

Heuchera L.
INHEUROYRU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉身の裏面の色	RHSカラーチャート 187D
53 花茎の向き	02 半直立
54 花茎の長さ	04 やや短
55 花茎の主な色	RHSカラーチャート 185A
56 花茎の花の着生する部位の長さ	05 中
57 花茎の花の着生する部位の幅	05 中
58 花茎の花の着生する部位の長さ／幅	04 やや小
59 花茎の花の粗密	02 かなり粗
60 つぼみの色	RHSカラーチャート 51C
61 花の向き	04 やや下向き
62 花の長さ	06 やや長
63 花の幅	05 中
64 花の外面の色	RHSカラーチャート 69C
65 花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29434号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. INHEU14-03

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1はN77A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極大、若葉の葉身の色2の分布は無、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は無又は極粗、葉柄の主な色は187B、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は小、葉身の先端部の形は円形、葉身裂片の切れ込みの深さは中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱は弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は中、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は粗、葉身の色1はN77A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は極大、葉身の色2の分布は無、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色は187A、花茎の向きは半直立、花茎の長さは中、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さは中、花茎の花の着生する部位の幅は中、花茎の花の着生する部位の長さ／幅はやや小、花茎の花の粗密は粗、つぼみの色は59B、花の向きはやや下向き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の外面の色は59Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INHEU14-03」は、対照品種「オブシディアン」と比較して、つぼみの色が59Bであること、花の外面の色が59Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Creole Nights」と比較して、葉柄の毛の粗密が無又は極粗であること、花茎の花の着生する部位の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Walter Ludwig

7 出願公表の年月日 平成31年3月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者の所属する法人の所有する系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Heuchera L.
INHEU14-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株幅	05 中
03 葉の粗密	06 やや密
04 若葉の葉身の色1	RHSカラーチャート N77A
05 若葉の葉身の色1の分布	08 全体
06 若葉の葉身の色1の模様	05 均一
07 若葉の葉身の色1の面積	09 極大
08 若葉の葉身の色2	
09 若葉の葉身の色2の分布	01 無
10 若葉の葉身の色2の模様	
11 若葉の葉身の色2の面積	
12 若葉の葉身の色3	
13 若葉の葉身の色3の分布	01 無
14 若葉の葉身の色3の模様	
15 若葉の葉身の色3の面積	
16 若葉の葉身の色4	
17 若葉の葉身の色4の分布	01 無

Heuchera L.
INHEU14-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若葉の葉身の色4の模様	
19 若葉の葉身の色4の面積	
20 葉柄の長さ	05 中
21 葉柄の毛の粗密	01 無又は極粗
22 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 187B
23 葉身の長さ	05 中
24 葉身の幅	05 中
25 葉身の長さ／幅	03 小
26 葉身の先端部の形	03 円形
27 葉身裂片の切れ込みの深さ	05 中
28 葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘ レラ属に限る。）	
29 葉身の周縁部の欠刻の数	02 少
30 葉身の周縁部の欠刻の深さ	03 中
31 葉身の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
32 葉身のしわ	01 無又は極弱
33 葉身の光沢	03 中
34 葉身の毛の粗密	03 中

Heuchera L.
INHEU14-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の裏面の毛の粗密	02 粗
36 葉身の色1	RHSカラーチャート N77A
37 葉身の色1の分布	08 全体
38 葉身の色1の模様	05 均一
39 葉身の色1の面積	09 極大
40 葉身の色2	
41 葉身の色2の分布	01 無
42 葉身の色2の模様	
43 葉身の色2の面積	
44 葉身の色3	
45 葉身の色3の分布	01 無
46 葉身の色3の模様	
47 葉身の色3の面積	
48 葉身の色4	
49 葉身の色4の分布	01 無
50 葉身の色4の模様	
51 葉身の色4の面積	

Heuchera L.
INHEU14-03

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉身の裏面の色	RHSカラーチャート 187A
53 花茎の向き	02 半直立
54 花茎の長さ	05 中
55 花茎の主な色	RHSカラーチャート N77A
56 花茎の花の着生する部位の長さ	05 中
57 花茎の花の着生する部位の幅	05 中
58 花茎の花の着生する部位の長さ／幅	04 やや小
59 花茎の花の粗密	03 粗
60 つぼみの色	RHSカラーチャート 59B
61 花の向き	04 やや下向き
62 花の長さ	06 やや長
63 花の幅	05 中
64 花の外面の色	RHSカラーチャート 59D
65 花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第29435号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. TerHot Spot

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅はやや狭、葉の粗密は中、若葉の葉身の色1はN144A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2は175A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は小斑点、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は150B、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや浅、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は短、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは浅、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は密、葉身の裏面の毛の粗密は密、葉身の色1はN144A、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は176A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は小斑点、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN144D、花茎の向きは半直立、花茎の長さはかなり短、花茎の主な色は152C、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色はN57D、花の向きはやや上向き、花の長さはやや長、花の幅は広、花の外面の色は69A、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は淡桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerHot Spot」は、対照品種「ストップライト」と比較して、葉身の色2が176Aであること、つぼみの色がN57Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サンスポット」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さがやや浅であること、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）が短であること、花茎の主な色が152Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Nadine Egger

7 出願公表の年月日 平成30年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のホイヘレラ属の系統に出願者所有のティアレラ属の系統を交配し、選抜したものである。

x Heucherella H. R. Wehrh.
TerHot Spot

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 株幅	04 やや狭
03 葉の粗密	05 中
04 若葉の葉身の色1	RHSカラーチャート N144A
05 若葉の葉身の色1の分布	08 全体
06 若葉の葉身の色1の模様	05 均一
07 若葉の葉身の色1の面積	07 大
08 若葉の葉身の色2	RHSカラーチャート 175A
09 若葉の葉身の色2の分布	02 葉脈に沿う
10 若葉の葉身の色2の模様	02 小斑点
11 若葉の葉身の色2の面積	02 かなり小
12 若葉の葉身の色3	
13 若葉の葉身の色3の分布	01 無
14 若葉の葉身の色3の模様	
15 若葉の葉身の色3の面積	
16 若葉の葉身の色4	
17 若葉の葉身の色4の分布	01 無

x Heucherella H. R. Wehrh.
TerHot Spot

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若葉の葉身の色4の模様	
19 若葉の葉身の色4の面積	
20 葉柄の長さ	04 やや短
21 葉柄の毛の粗密	04 密
22 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 150B
23 葉身の長さ	05 中
24 葉身の幅	05 中
25 葉身の長さ／幅	05 中
26 葉身の先端部の形	02 鈍形
27 葉身裂片の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘ レラ属に限る。）	03 短
29 葉身の周縁部の欠刻の数	03 中
30 葉身の周縁部の欠刻の深さ	02 浅
31 葉身の周縁部の波打ちの強弱	02 かなり弱
32 葉身のしわ	01 無又は極弱
33 葉身の光沢	01 無又は極弱
34 葉身の毛の粗密	04 密

x Heucherella H. R. Wehrh.
TerHot Spot

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の裏面の毛の粗密	04 密
36 葉身の色1	RHSカラーチャート N144A
37 葉身の色1の分布	08 全体
38 葉身の色1の模様	05 均一
39 葉身の色1の面積	07 大
40 葉身の色2	RHSカラーチャート 176A
41 葉身の色2の分布	02 葉脈に沿う
42 葉身の色2の模様	02 小斑点
43 葉身の色2の面積	02 かなり小
44 葉身の色3	
45 葉身の色3の分布	01 無
46 葉身の色3の模様	
47 葉身の色3の面積	
48 葉身の色4	
49 葉身の色4の分布	01 無
50 葉身の色4の模様	
51 葉身の色4の面積	

x Heucherella H. R. Wehrh.
TerHot Spot

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉身の裏面の色	RHSカラーチャート N144D
53 花茎の向き	02 半直立
54 花茎の長さ	02 かなり短
55 花茎の主な色	RHSカラーチャート 152C
56 花茎の花の着生する部位の長さ	02 かなり短
57 花茎の花の着生する部位の幅	03 狭
58 花茎の花の着生する部位の長さ／幅	03 小
59 花茎の花の粗密	05 中
60 つぼみの色	RHSカラーチャート N57D
61 花の向き	02 やや上向き
62 花の長さ	06 やや長
63 花の幅	07 広
64 花の外面の色	RHSカラーチャート 69A
65 花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	03 淡桃

1 品種登録の番号及び年月日 第29436号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Mojito

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅は中、葉の粗密はやや密、若葉の葉身の色1はN144A、若葉の葉身の色1の分布は全体、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は大、若葉の葉身の色2は178A、若葉の葉身の色2の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色2の模様は小斑点、若葉の葉身の色2の面積はかなり小、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色は150C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鈍形、葉身裂片の切れ込みの深さは深、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）は中、葉身の周縁部の欠刻の数は少、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわはかなり弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN144B、葉身の色1の分布は全体、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積は大、葉身の色2は175A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は小斑点、葉身の色2の面積はかなり小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN144D、花茎の向きは半直立、花茎の長さは極短、花茎の主な色は150B、花茎の花の着生する部位の長さはかなり短、花茎の花の着生する部位の幅はかなり狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は小、花茎の花の粗密は中、つぼみの色は1D、花の向きは外向き、花の長さは中、花の幅は広、花の外面の色は155C、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Mojito」は、対照品種「ストップライト」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さが深であること、花茎の主な色が150Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ファイヤーフロスト」と比較して、葉身裂片の切れ込みの深さが深であること、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Nadine Egger

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「バタードラム」の変異株である。

x Heucherella H. R. Wehrh.
Mojito

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	06 やや高
02 株幅	05 中
03 葉の粗密	06 やや密
04 若葉の葉身の色1	RHSカラーチャート N144A
05 若葉の葉身の色1の分布	08 全体
06 若葉の葉身の色1の模様	05 均一
07 若葉の葉身の色1の面積	07 大
08 若葉の葉身の色2	RHSカラーチャート 178A
09 若葉の葉身の色2の分布	02 葉脈に沿う
10 若葉の葉身の色2の模様	02 小斑点
11 若葉の葉身の色2の面積	02 かなり小
12 若葉の葉身の色3	
13 若葉の葉身の色3の分布	01 無
14 若葉の葉身の色3の模様	
15 若葉の葉身の色3の面積	
16 若葉の葉身の色4	
17 若葉の葉身の色4の分布	01 無

x Heucherella H. R. Wehrh.
Mojito

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若葉の葉身の色4の模様	
19 若葉の葉身の色4の面積	
20 葉柄の長さ	05 中
21 葉柄の毛の粗密	04 密
22 葉柄の主な色	RHSカラーチャート 150C
23 葉身の長さ	05 中
24 葉身の幅	05 中
25 葉身の長さ／幅	05 中
26 葉身の先端部の形	02 鈍形
27 葉身裂片の切れ込みの深さ	07 深
28 葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘ レラ属に限る。）	05 中
29 葉身の周縁部の欠刻の数	02 少
30 葉身の周縁部の欠刻の深さ	03 中
31 葉身の周縁部の波打ちの強弱	02 かなり弱
32 葉身のしわ	02 かなり弱
33 葉身の光沢	01 無又は極弱
34 葉身の毛の粗密	03 中

x Heucherella H. R. Wehrh.
Mojito

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の裏面の毛の粗密	03 中
36 葉身の色1	RHSカラーチャート N144B
37 葉身の色1の分布	08 全体
38 葉身の色1の模様	05 均一
39 葉身の色1の面積	07 大
40 葉身の色2	RHSカラーチャート 175A
41 葉身の色2の分布	02 葉脈に沿う
42 葉身の色2の模様	02 小斑点
43 葉身の色2の面積	02 かなり小
44 葉身の色3	
45 葉身の色3の分布	01 無
46 葉身の色3の模様	
47 葉身の色3の面積	
48 葉身の色4	
49 葉身の色4の分布	01 無
50 葉身の色4の模様	
51 葉身の色4の面積	

x Heucherella H. R. Wehrh.
Mojito

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29436号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 葉身の裏面の色	RHSカラーチャート N144D
53 花茎の向き	02 半直立
54 花茎の長さ	01 極短
55 花茎の主な色	RHSカラーチャート 150B
56 花茎の花の着生する部位の長さ	02 かなり短
57 花茎の花の着生する部位の幅	02 かなり狭
58 花茎の花の着生する部位の長さ／幅	03 小
59 花茎の花の粗密	05 中
60 つぼみの色	RHSカラーチャート 1D
61 花の向き	03 外向き
62 花の長さ	05 中
63 花の幅	07 広
64 花の外面の色	RHSカラーチャート 155C
65 花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第29437号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Plum Cascade

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株幅は中、葉の粗密は密、若葉の葉身の色1はN200A、若葉の葉身の色1の分布は葉脈に沿う、若葉の葉身の色1の模様は均一、若葉の葉身の色1の面積は極小、若葉の葉身の色2はN200C、若葉の葉身の色2の分布は全体の葉脈間、若葉の葉身の色2の模様は均一、若葉の葉身の色2の面積はかなり大、若葉の葉身の色3の分布は無、若葉の葉身の色4の分布は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、葉柄の主な色はN186C、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の先端部の形は鋭形、葉身裂片の切れ込みの深さはやや深、葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘレラ属に限る。）はやや短、葉身の周縁部の欠刻の数は中、葉身の周縁部の欠刻の深さは中、葉身の周縁部の波打ちの強弱はかなり弱、葉身のしわは無又は極弱、葉身の光沢は無又は極弱、葉身の毛の粗密は中、葉身の裏面の毛の粗密は中、葉身の色1はN187C、葉身の色1の分布は全体の葉脈間、葉身の色1の模様は均一、葉身の色1の面積はかなり大、葉身の色2は200A、葉身の色2の分布は葉脈に沿う、葉身の色2の模様は均一、葉身の色2の面積は極小、葉身の色3の分布は無、葉身の色4の分布は無、葉身の裏面の色はN79A、花茎の向きは半直立、花茎の長さはやや短、花茎の主な色はN77A、花茎の花の着生する部位の長さは短、花茎の花の着生する部位の幅は狭、花茎の花の着生する部位の長さ／幅は中、花茎の花の粗密はやや密、つぼみの色は65C、花の向きは外向き、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の外側の色は69C、花卉の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Plum Cascade」は、対照品種「Gunsmoke」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、葉身裂片の切れ込みの深さがやや深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Nadine Egger

7 出願公表の年月日 令和元年6月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のホイヘラ属の系統に出願者所有のティアレラ属の系統を交配し、選抜したものである。

x Heucherella H. R. Wehrh.
Plum Cascade

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	04 やや低
02 株幅	05 中
03 葉の粗密	07 密
04 若葉の葉身の色1	RHSカラーチャート N200A
05 若葉の葉身の色1の分布	01 葉脈に沿う
06 若葉の葉身の色1の模様	05 均一
07 若葉の葉身の色1の面積	01 極小
08 若葉の葉身の色2	RHSカラーチャート N200C
09 若葉の葉身の色2の分布	04 全体の葉脈間
10 若葉の葉身の色2の模様	05 均一
11 若葉の葉身の色2の面積	08 かなり大
12 若葉の葉身の色3	
13 若葉の葉身の色3の分布	01 無
14 若葉の葉身の色3の模様	
15 若葉の葉身の色3の面積	
16 若葉の葉身の色4	
17 若葉の葉身の色4の分布	01 無

x Heucherella H. R. Wehrh.
Plum Cascade

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若葉の葉身の色4の模様	
19 若葉の葉身の色4の面積	
20 葉柄の長さ	05 中
21 葉柄の毛の粗密	04 密
22 葉柄の主な色	RHSカラーチャート N186C
23 葉身の長さ	05 中
24 葉身の幅	05 中
25 葉身の長さ／幅	05 中
26 葉身の先端部の形	01 鋭形
27 葉身裂片の切れ込みの深さ	06 やや深
28 葉身全体の長さに対する葉身の中央裂片の長さ（ホイヘ レラ属に限る。）	04 やや短
29 葉身の周縁部の欠刻の数	03 中
30 葉身の周縁部の欠刻の深さ	03 中
31 葉身の周縁部の波打ちの強弱	02 かなり弱
32 葉身のしわ	01 無又は極弱
33 葉身の光沢	01 無又は極弱
34 葉身の毛の粗密	03 中

x Heucherella H. R. Wehrh.
Plum Cascade

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の裏面の毛の粗密	03 中
36 葉身の色1	RHSカラーチャート N187C
37 葉身の色1の分布	03 全体の葉脈間
38 葉身の色1の模様	05 均一
39 葉身の色1の面積	08 かなり大
40 葉身の色2	RHSカラーチャート 200A
41 葉身の色2の分布	02 葉脈に沿う
42 葉身の色2の模様	05 均一
43 葉身の色2の面積	01 極小
44 葉身の色3	
45 葉身の色3の分布	01 無
46 葉身の色3の模様	
47 葉身の色3の面積	
48 葉身の色4	
49 葉身の色4の分布	01 無
50 葉身の色4の模様	
51 葉身の色4の面積	

x Heucherella H. R. Wehrh.
Plum Cascade

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉身の裏面の色	RHSカラーチャート N79A
53 花茎の向き	02 半直立
54 花茎の長さ	04 やや短
55 花茎の主な色	RHSカラーチャート N77A
56 花茎の花の着生する部位の長さ	03 短
57 花茎の花の着生する部位の幅	03 狭
58 花茎の花の着生する部位の長さ／幅	05 中
59 花茎の花の粗密	06 やや密
60 つぼみの色	RHSカラーチャート 65C
61 花の向き	03 外向き
62 花の長さ	06 やや長
63 花の幅	06 やや広
64 花の外面の色	RHSカラーチャート 69C
65 花弁の表面の色（ホイヘレラ属に限る。）	01 白

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 3 8 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SMHMTAU

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は青、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は100C（酸性区:101B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SMHMTAU」は、対照品種「ピンク マナスル」と比較して、枝の斑点の多少がかなり少であること、小花柄の色が淡青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Timothy D. Wood

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Robert」に「ES1」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	04 やや低
03 枝の斑点の多少	02 かなり少
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	02 鋭形
06 葉身基部の形	02 丸形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	04 やや細
09 葉身長	04 やや短
10 葉身幅	05 中
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	05 中
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	04 アジサイ型

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	04 やや小
19 両性花の明確	01 不明瞭
20 両性花の色	03 青
21 装飾花の数	06 やや多
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	07 強
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 100C (酸性区:101B)
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 100B
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	01 無

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	
36 装飾花のがく片の数	04 3から7
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	05 中
39 分枝性	05 中
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	04 やや細
42 節間長	04 やや短
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	05 中
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

Hydrangea L.
SMHMTAU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の湾曲	01 平滑
53 がく片の長さ	04 やや短
54 がく片の幅	05 中
55 小花柄の色	07 淡青
56 花の香り	01 無
57 発色の難易	
58 挿し木の難易	
59 落葉性	01 落葉

1 品種登録の番号及び年月日 第29439号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. あゆみ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はかなり小、両性花の色は淡紅（酸性区:淡青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は69D（酸性区:97D）、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あゆみ」は、対照品種「加茂セレ 泉鳥」と比較して、花序の直径がかなり小であること、成葉表面の毛が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川邊潔
富山県高岡市伏木古国府4番5号
渡辺義文
静岡県御殿場市永塚59番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

川邊潔

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の変異株である。

Hydrangea L.

あゆみ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 2 9 4 3 9 号
01 樹形 02 樹高 03 枝の斑点の多少 04 葉身全体の形 05 葉身先端の形 06 葉身基部の形 07 葉身の切れ込みの有無 08 葉縁の形 09 葉身長 10 葉身幅 11 成葉表面の色 12 成葉表面の色の濃さ 13 成葉表面の斑の有無 14 成葉表面の斑の色 15 成葉表面の光沢 16 花序の形 17 花序の花型	04 開張性	
	03 低	
	07 多	
	02 楕円形	
	01 鋭尖形	
	02 丸形	
	01 無	
	05 中	
	04 やや短	
	04 やや狭	
	01 緑	
	06 やや濃	
	01 無	
	01 無	
	01 平形	
	02 ガクアジサイ型	

Hydrangea L.

あゆみ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	02 かなり小
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	05 淡紅（酸性区:淡青）
21 装飾花の数	02 かなり少
22 装飾花の花型	03 八重咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	03 弱
25 装飾花の直径	03 小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 69D（酸性区:97D）
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 157A
32 装飾花の花色の移行性	09 有
33 装飾花のがく片の形	02 楕円形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	01 無

Hydrangea L.

あゆみ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	
36 装飾花のがく片の数	05 8 以上
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	05 中
39 分枝性	05 中
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	03 細
42 節間長	04 やや短
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	04 やや小
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	05 中
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	03 薄

あゆみ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

03 内曲

03 短

02 かなり狭

06 桃 (酸性区:淡緑)

01 無

--

--	--

01 落葉

--

--	--

--

--	--

--

--

--	--

1 品種登録の番号及び年月日 第29440号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 黄金あつひめ (オウゴンアツヒメ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少はやや少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はかなり小、両性花の色は淡紫（酸性区：青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は抱え咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はかなり小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（中斑）、装飾花の主色はN87B（酸性区：93B）、装飾花の複色の色は95C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「黄金あつひめ」は、対照品種「トカラの空」と比較して、成葉表面の色の濃さがかなり淡であること、がく片の湾曲が内曲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩田正樹

静岡県御殿場市保土沢1157番地の249

渡辺堯二

静岡県御殿場市永塚59番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田正樹

7 出願公表の年月日 平成30年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
黄金あつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	06 やや高
03 枝の斑点の多少	04 やや少
04 葉身全体の形	02 楕円形
05 葉身先端の形	02 鋭形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	07 粗
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	04 やや狭
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	02 かなり淡
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	01 無
16 花序の形	01 平形
17 花序の花型	02 ガクアジサイ型

Hydrangea L.
黄金あつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	02 かなり小
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	04 淡紫（酸性区：青）
21 装飾花の数	02 かなり少
22 装飾花の花型	02 抱え咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	07 強
25 装飾花の直径	02 かなり小
26 装飾花の単色・複色	09 複色
27 装飾花の複色のタイプ	09 その他（中斑）
28 装飾花の複色の割合	07 大
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート N87B（酸性区：93B）
30 装飾花の複色の色	RHSカラーチャート 95C
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート N80B, 94A（脈）
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	02 一部有

Hydrangea L.
黄金あつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	01 極浅
36 装飾花のがく片の数	01 3と4
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	08 かなり密
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	03 細
42 節間長	06 やや長
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	02 褐
46 葉の大きさ	04 やや小
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	05 中
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	02 かなり薄

Hydrangea L.
黄金あつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の湾曲	03 内曲
53 がく片の長さ	02 かなり短
54 がく片の幅	03 狭
55 小花柄の色	08 青
56 花の香り	01 無
57 発色の難易	
58 挿し木の難易	
59 落葉性	01 落葉

1 品種登録の番号及び年月日 第29441号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Ho2063

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡青、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN82A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ho2063」は、対照品種「ピンク マナスル」と比較して、樹高が極高であること、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andreas Pellens
St. Adelheid-weg 10 47608 Geldern, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Pellens

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統に「メッサリーナ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Ho2063

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	09 極高
03 枝の斑点の多少	01 無
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	02 丸形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	04 やや細
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	06 やや広
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	05 中
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	04 アジサイ型

Hydrangea L.
Ho2063

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	04 やや小
19 両性花の明確	01 不明瞭
20 両性花の色	02 淡青
21 装飾花の数	07 多
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	04 やや弱
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート N82A
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート N82C
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	02 一部有

Hydrangea L.
Ho2063

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
36 装飾花のがく片の数	04 3から7
37 花色の変化性	01 無
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	03 粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	06 やや太
42 節間長	08 かなり長
43 新梢の色	09 その他（紫褐）
44 枝の斑点の色	
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

Ho2063

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29441号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29442号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Ho2069

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は84A（酸性区:94B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ho2069」は、対照品種「STRAWBERRIES AND CREAM」と比較して、樹高が極高であること、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andreas Pellens
St. Adelheid-weg 10 47608 Geldern, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Pellens

7 出願公表の年月日 平成30年4月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統に「メッサリーナ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Ho2069

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	09 極高
03 枝の斑点の多少	01 無
04 葉身全体の形	02 楕円形
05 葉身先端の形	03 微突形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	05 中
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	06 やや広
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	07 濃
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	01 平形
17 花序の花型	02 ガクアジサイ型

Hydrangea L.
Ho2069

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	05 中
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	03 青
21 装飾花の数	03 少
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	06 やや強
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 84A (酸性区:94B)
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 91B (酸性区:97A)
32 装飾花の花色の移行性	09 有
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	01 無

Hydrangea L.
Ho2069

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	
36 装飾花のがく片の数	01 3と4
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	04 やや粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	06 やや太
42 節間長	08 かなり長
43 新梢の色	09 その他（紫褐）
44 枝の斑点の色	
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	02 紫褐
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	07 厚

Ho2069

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29442号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29443号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Ho2066

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（ぼかし）、装飾花の主色はNN155A（酸性区:97D）、装飾花の複色の色は97C（酸性区:97B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ho2066」は、対照品種「霊峰の雪」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andreas Pellens
St. Adelheid-weg 10 47608 Geldern, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Pellens

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統に「メッサリーナ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Ho2066

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	07 高
03 枝の斑点の多少	01 無
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	03 微突形
06 葉身基部の形	02 丸形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	05 中
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	06 やや広
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	06 やや濃
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	01 平形
17 花序の花型	02 ガクアジサイ型

Hydrangea L.
Ho2066

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	05 中
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	02 淡青
21 装飾花の数	02 かなり少
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	06 やや強
25 装飾花の直径	05 中
26 装飾花の単色・複色	09 複色
27 装飾花の複色のタイプ	09 その他（ぼかし）
28 装飾花の複色の割合	03 小
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート NN155A（酸性区：97D）
30 装飾花の複色の色	RHSカラーチャート 97C（酸性区：97B）
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート NN155C, 97B（ぼかし）
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	02 一部有

Hydrangea L.
Ho2066

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	03 浅
36 装飾花のがく片の数	04 3から7
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	03 粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	06 やや太
42 節間長	09 極長
43 新梢の色	09 その他（紫褐）
44 枝の斑点の色	
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	07 大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

Ho2066

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 4 4 3 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29444号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Ho3030

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は84A（酸性区:94B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は晩である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ho3030」は、対照品種「KS2」と比較して、葉身基部の形が丸形であること、葉の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリーハートピンク」と比較して、樹高がやや高であること、葉の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Andreas Pellens
St. Adelheid-weg 10 47608 Geldern, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Pellens

7 出願公表の年月日 平成30年5月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統に「メッサリーナ」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Ho3030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	06 やや高
03 枝の斑点の多少	03 少
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	02 丸形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	04 やや細
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	06 やや広
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	04 やや淡
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	01 無
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	04 アジサイ型

Hydrangea L.
Ho3030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	05 中
19 両性花の明確	01 不明瞭
20 両性花の色	03 青
21 装飾花の数	06 やや多
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	04 やや弱
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 84A（酸性区:94B）
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート N82B（酸性区:94B）
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	03 有

Hydrangea L.
Ho3030

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
36 装飾花のがく片の数	04 3から7
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	07 晩
39 分枝性	04 やや粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	05 中
42 節間長	05 中
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

Ho3030

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29444号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29445号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. PL P DIANA

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はやや少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は75A（酸性区:93C）、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PL P DIANA」は、対照品種「美咲小町」と比較して、枝の斑点の多少がやや少であること、節間長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

入江亮次

京都府京都市右京区鳴滝本町3番地7

6 登録品種の育成をした者の氏名

入江亮次

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
PL P DIANA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	05 中
03 枝の斑点の多少	04 やや少
04 葉身全体の形	02 楕円形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	06 やや粗
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	05 中
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	05 中
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	04 アジサイ型

Hydrangea L.
PL P DIANA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	05 中
19 両性花の明確	01 不明瞭
20 両性花の色	
21 装飾花の数	06 やや多
22 装飾花の花型	03 八重咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	03 弱
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 75A (酸性区:93C)
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 75B (酸性区:94B)
32 装飾花の花色の移行性	09 有
33 装飾花のがく片の形	03 卵形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	01 無

Hydrangea L.
PL P DIANA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	
36 装飾花のがく片の数	05 8以上
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	04 やや粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	04 やや細
42 節間長	04 やや短
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	02 褐
46 葉の大きさ	05 中
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	06 やや厚

Hydrangea L.
PL P DIANA

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 2 9 4 4 5 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29446号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. PL P ANNE

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はNN155C、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PL P ANNE」は、対照品種「ポージブーケ グレイス」と比較して、枝の斑点の多少がやや多であること、花序の形が半球形であること等で区別性が認められる。対照品種「ダンシングスノー」と比較して、花序の形が半球形であること、花序の花型がアジサイ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

入江亮次

京都府京都市右京区鳴滝本町3番地7

6 登録品種の育成をした者の氏名

入江亮次

7 出願公表の年月日 平成30年12月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
PL P ANNE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	05 中
03 枝の斑点の多少	06 やや多
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	03 微突形
06 葉身基部の形	02 丸形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	07 粗
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	05 中
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	07 濃
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	09 有
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	04 アジサイ型

Hydrangea L.
PL P ANNE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	04 やや小
19 両性花の明確	01 不明瞭
20 両性花の色	01 白
21 装飾花の数	07 多
22 装飾花の花型	03 八重咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	04 やや弱
25 装飾花の直径	03 小
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート NN155C
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート NN155C
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	03 卵形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	02 一部有

Hydrangea L.
PL P ANNE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	01 極浅
36 装飾花のがく片の数	05 8以上
37 花色の変化性	01 無
38 開花の開始時期	05 中
39 分枝性	03 粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	05 中
42 節間長	05 中
43 新梢の色	02 緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	04 やや薄

PL P ANNE

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第29446号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第29447号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HOA-1

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型は中間型、花序の直径はやや大、両性花の色は青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はかなり大、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は76D（酸性区:85C）、装飾花の複色の色は77B（酸性区:N82B）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HOA-1」は、対照品種「HBAティファニー」と比較して、枝の斑点の多少が少であること、装飾花のがく片の重なり程度が中であること、節間長がかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小内晶代

群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

小内晶代

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ロートシュバント」に「清澄沢」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	07 高
03 枝の斑点の多少	03 少
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	04 やや細
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	05 中
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	07 濃
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	01 無
16 花序の形	02 半球形
17 花序の花型	03 中間型

Hydrangea L.
HOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	06 やや大
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	03 青
21 装飾花の数	03 少
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	05 中
25 装飾花の直径	08 かなり大
26 装飾花の単色・複色	09 複色
27 装飾花の複色のタイプ	03 覆輪
28 装飾花の複色の割合	03 小
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 76D (酸性区:85C)
30 装飾花の複色の色	RHSカラーチャート 77B (酸性区:N82B)
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 76D, N80B(覆輪)
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	03 有

Hydrangea L.
HOA-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	01 極浅
36 装飾花のがく片の数	03 4 と 5
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	05 中
39 分枝性	03 粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	05 中
42 節間長	08 かなり長
43 新梢の色	02 緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	02 褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	02 紫褐
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	02 かなり少
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

HOA-1

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

重要な形質に係る特性

03 内曲

08 かなり長

09 極広

07 淡青

01 無

--

--	--

01 落葉

--

--	--

--

--

--

--

--	--

1 品種登録の番号及び年月日 第29448号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HOA-2

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は極高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや細、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型は中間型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、装飾花の主色は96B、装飾花の複色の色は97C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は無、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HOA-2」は、対照品種「SY2」と比較して、樹高が極高であること、装飾花のがく片の重なり程度がやや強であること、がく片の湾曲が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小内晶代

群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

小内晶代

7 出願公表の年月日 平成30年9月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「プファウ」に「肥後絞り」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HOA-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	09 極高
03 枝の斑点の多少	03 少
04 葉身全体の形	03 卵形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	04 やや細
09 葉身長	05 中
10 葉身幅	05 中
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	07 濃
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	01 無
16 花序の形	01 平形
17 花序の花型	03 中間型

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	05 中
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	03 青
21 装飾花の数	04 やや少
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	06 やや強
25 装飾花の直径	04 やや小
26 装飾花の単色・複色	09 複色
27 装飾花の複色のタイプ	01 絞り
28 装飾花の複色の割合	04 やや小
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 96B
30 装飾花の複色の色	RHSカラーチャート 97C
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 96D, 97C(絞り)
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	02 一部有

Hydrangea L.
HOA-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	04 やや浅
36 装飾花のがく片の数	03 4 と 5
37 花色の変化性	01 無
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	04 やや粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	05 中
42 節間長	08 かなり長
43 新梢の色	01 淡緑
44 枝の斑点の色	02 紫褐
45 前年枝の色	01 灰褐
46 葉の大きさ	06 やや大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	05 中

Hydrangea L.
HOA-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の湾曲	01 平滑
53 がく片の長さ	04 やや短
54 がく片の幅	06 やや広
55 小花柄の色	08 青
56 花の香り	01 無
57 発色の難易	
58 挿し木の難易	
59 落葉性	01 落葉

1 品種登録の番号及び年月日 第29449号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. マーチ4

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はかなり高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はかなり長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は淡青（酸性区；青）、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は極大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は97A（酸性区98C）、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マーチ4」は、対照品種「スプリングエンジェルブルーエレガンス」と比較して、樹高がかなり高であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さがやや深であること、新梢の色がその他（紫）であること等で区別性が認められる。対照品種「スプリングエンジェルフリルエレガンス」と比較して、樹高がかなり高であること、新梢の色がその他（紫）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

久保田正夫
群馬県伊勢崎市国定町1-141-42

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田正夫

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のHydrangea chinensis（在来系統）に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
マーチ4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	04 開張性
02 樹高	08 かなり高
03 枝の斑点の多少	03 少
04 葉身全体の形	02 楕円形
05 葉身先端の形	01 鋭尖形
06 葉身基部の形	01 鋭形
07 葉身の切れ込みの有無	01 無
08 葉縁の形	05 中
09 葉身長	08 かなり長
10 葉身幅	06 やや広
11 成葉表面の色	01 緑
12 成葉表面の色の濃さ	05 中
13 成葉表面の斑の有無	01 無
14 成葉表面の斑の色	
15 成葉表面の光沢	01 無
16 花序の形	01 平形
17 花序の花型	02 ガクアジサイ型

Hydrangea L.
マーチ4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の直径	07 大
19 両性花の明確	02 明瞭
20 両性花の色	02 淡青（酸性区;青）
21 装飾花の数	02 かなり少
22 装飾花の花型	01 普通咲
23 装飾花のがく片の重なり	09 有
24 装飾花のがく片の重なり程度	07 強
25 装飾花の直径	09 極大
26 装飾花の単色・複色	01 単色
27 装飾花の複色のタイプ	
28 装飾花の複色の割合	
29 装飾花の主色	RHSカラーチャート 97A（酸性区98C）
30 装飾花の複色の色	
31 装飾花の開花終期の花色	RHSカラーチャート 97A
32 装飾花の花色の移行性	01 無
33 装飾花のがく片の形	04 かぶ形
34 装飾花のがく片の縁の切れ込み	03 有

Hydrangea L.
マーチ4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さ	06 やや深
36 装飾花のがく片の数	03 4 と 5
37 花色の変化性	09 有
38 開花の開始時期	06 やや晩
39 分枝性	03 粗
40 雲竜性の有無	01 無
41 枝の太さ	06 やや太
42 節間長	04 やや短
43 新梢の色	09 その他（紫）
44 枝の斑点の色	01 淡緑
45 前年枝の色	02 褐
46 葉の大きさ	09 極大
47 新葉表面の色	01 緑
48 成葉表面の斑のタイプ	
49 成葉表面の毛	01 無
50 花序の向き	07 上向き
51 花序の厚さ	07 厚

Hydrangea L.
マーチ4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の湾曲	03 内曲
53 がく片の長さ	09 極長
54 がく片の幅	09 極広
55 小花柄の色	05 紫
56 花の香り	01 無
57 発色の難易	
58 挿し木の難易	
59 落葉性	03 常緑

1 品種登録の番号及び年月日 第29450号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet ASKW-1

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや高、樹姿の幅はやや広、茎の太さはやや太、茎の色は褐緑、節間長はやや長、葉全体の形は長楕円形、葉身先端部の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅、つぼみの色は濃桃、花序の形は集散、花房の長径はやや小、花房の高さは中、1花房の花数はやや少、花形は平咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色はN66D、花筒の長さはやや短、花筒の色は桃、花弁全体の形状は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形は丸型、がくの長さはやや短、がく全体の形は閉じる、がくの色は緑に赤、柱頭のタイプは長花柱花、花の香りは中、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ASKW-1」は、対照品種「リメイク」と比較して、花弁表面の色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「紅富士」と比較して、花弁表面の色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅川浩史
山梨県北杜市大泉町谷戸3738

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅川浩史

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Luculia Sweet
ASKW-1

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29450号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 樹高	06 やや高
03 樹姿の幅	06 やや広
04 茎の太さ	06 やや太
05 茎の色	03 褐緑
06 茎の毛の多少	03 少
07 節間長	06 やや長
08 葉全体の形	02 長楕円形
09 葉身先端部の形	01 鋭尖形
10 葉身基部の形	02 鋭形
11 葉縁の形	01 全縁
12 葉身の曲がり	03 外曲
13 葉縁の波打ち	01 無
14 葉身の長さ	05 中
15 葉身の幅	05 中
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

Luculia Sweet
ASKW-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の光沢	03 弱
19 成葉表面の毛の有無	01 無
20 成葉裏面の毛の有無	01 無
21 成葉裏面の脈の毛の有無	09 有
22 葉柄の長さ	05 中
23 葉柄の色	05 紅
24 つばみの色	05 濃桃
25 花序の形	01 集散
26 花房の長径	04 やや小
27 花房の高さ	05 中
28 1花房の花数	04 やや少
29 花形	02 平咲
30 花のタイプ	01 一重咲
31 花の大きさ	05 中
32 花弁表面の色	RHSカラーチャート N66D
33 花筒中間部の太さ	05 中
34 花筒の長さ	04 やや短

Luculia Sweet
ASKW-1

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29450号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	04 桃
36 花弁全体の形状	03 広卵形
37 花弁先端の形	04 円形
38 花弁の曲がり	01 内曲
39 花弁のしわ	03 少
40 花弁の長さ	05 中
41 花弁の幅	04 やや狭
42 花弁の裂片数	01 5枚
43 副花冠の形	01 丸型
44 がくの長さ	04 やや短
45 がく全体の形	01 閉じる
46 がくの色	04 緑に赤
47 柱頭のタイプ	02 長花柱花
48 花の香り	05 中
49 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29451号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet TSK-2

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は高、樹姿の幅は中、茎の太さは中、茎の色は褐緑、節間長は長、葉全体の形は長楕円形、葉身先端部の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅、つぼみの色は桃、花序の形は集散、花房の長径は中、花房の高さは中、1花房の花数はやや少、花形は受け咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色は62B、花筒の長さは中、花筒の色は桃、花弁全体の形状は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形はフリル型、がくの長さはやや短、がく全体の形はやや開く、がくの色は淡緑褐、柱頭のタイプは短花柱花、花の香りは中、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSK-2」は、対照品種「ガーネット」と比較して、茎の毛の多少が少であること、副花冠の形がフリル型であること等で区別性が認められる。対照品種「TSK-1」と比較して、葉縁の波打ちが弱であること、葉柄の色が紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

登坂初夫
群馬県吾妻郡中之条町山田3055

6 登録品種の育成をした者の氏名

登坂初夫

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のL. pinceana(在来系統)に「スイートルビー」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29451号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 樹高	07 高
03 樹姿の幅	05 中
04 茎の太さ	05 中
05 茎の色	03 褐緑
06 茎の毛の多少	03 少
07 節間長	07 長
08 葉全体の形	02 長楕円形
09 葉身先端部の形	01 鋭尖形
10 葉身基部の形	02 鋭形
11 葉縁の形	01 全縁
12 葉身の曲がり	03 外曲
13 葉縁の波打ち	03 弱
14 葉身の長さ	05 中
15 葉身の幅	04 やや狭
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29451号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の光沢	04 やや弱
19 成葉表面の毛の有無	01 無
20 成葉裏面の毛の有無	01 無
21 成葉裏面の脈の毛の有無	09 有
22 葉柄の長さ	04 やや短
23 葉柄の色	05 紅
24 つばみの色	04 桃
25 花序の形	01 集散
26 花房の長径	05 中
27 花房の高さ	05 中
28 1花房の花数	04 やや少
29 花形	01 受け咲
30 花のタイプ	01 一重咲
31 花の大きさ	05 中
32 花弁表面の色	RHSカラーチャート 62B
33 花筒中間部の太さ	06 やや太
34 花筒の長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29451号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	04 桃
36 花弁全体の形状	03 広卵形
37 花弁先端の形	04 円形
38 花弁の曲がり	01 内曲
39 花弁のしわ	03 少
40 花弁の長さ	05 中
41 花弁の幅	04 やや狭
42 花弁の裂片数	01 5枚
43 副花冠の形	03 フリル型
44 がくの長さ	04 やや短
45 がく全体の形	02 やや開く
46 がくの色	05 淡緑褐
47 柱頭のタイプ	01 短花柱花
48 花の香り	05 中
49 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第29452号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet TSK-3

3 登録品種の特性の概要

樹姿は平開、樹高は中、樹姿の幅は中、茎の太さはやや細、茎の色は紅褐、節間長は中、葉全体の形は長楕円形、葉身先端部の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅、つぼみの色は桃、花序の形は集散、花房の長径はやや小、花房の高さはやや低、1花房の花数は少、花形は受け咲、花のタイプは一重咲、花の大きさはやや小、花弁表面の色は62B、花筒の長さは中、花筒の色は桃、花弁全体の形状は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形はフリル型、がくの長さは短、がく全体の形はやや開く、がくの色は赤褐、柱頭のタイプは短花柱花、花の香りは中、開花始期は中である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSK-3」は、対照品種「TSK-1」と比較して、茎の色が紅褐であること、葉縁の波打ちが弱であること、葉柄の色が紅であること等で区別性が認められる。対照品種「長後GJ1」と比較して、1花房の花数が少であること、副花冠の形がフリル型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

登坂初夫

群馬県吾妻郡中之条町山田3055

6 登録品種の育成をした者の氏名

登坂初夫

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スイートルビー」に育成者所有のL. pinceana(在来系統)を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29452号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 平開
02 樹高	05 中
03 樹姿の幅	05 中
04 茎の太さ	04 やや細
05 茎の色	04 紅褐
06 茎の毛の多少	03 少
07 節間長	05 中
08 葉全体の形	02 長楕円形
09 葉身先端部の形	01 鋭尖形
10 葉身基部の形	02 鋭形
11 葉縁の形	01 全縁
12 葉身の曲がり	03 外曲
13 葉縁の波打ち	03 弱
14 葉身の長さ	05 中
15 葉身の幅	04 やや狭
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29452号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の光沢	04 やや弱
19 成葉表面の毛の有無	01 無
20 成葉裏面の毛の有無	01 無
21 成葉裏面の脈の毛の有無	09 有
22 葉柄の長さ	04 やや短
23 葉柄の色	05 紅
24 つばみの色	04 桃
25 花序の形	01 集散
26 花房の長径	04 やや小
27 花房の高さ	04 やや低
28 1花房の花数	03 少
29 花形	01 受け咲
30 花のタイプ	01 一重咲
31 花の大きさ	04 やや小
32 花弁表面の色	RHSカラーチャート 62B
33 花筒中間部の太さ	06 やや太
34 花筒の長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29452号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	04 桃
36 花弁全体の形状	03 広卵形
37 花弁先端の形	04 円形
38 花弁の曲がり	01 内曲
39 花弁のしわ	03 少
40 花弁の長さ	04 やや短
41 花弁の幅	04 やや狭
42 花弁の裂片数	01 5枚
43 副花冠の形	03 フリル型
44 がくの長さ	03 短
45 がく全体の形	02 やや開く
46 がくの色	06 赤褐
47 柱頭のタイプ	01 短花柱花
48 花の香り	05 中
49 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第29453号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet TSK-4

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや高、樹姿の幅は中、茎の太さは中、茎の色は褐緑、節間長はやや長、葉全体の形は長楕円形、葉身先端部の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅褐、つぼみの色は淡桃、花序の形は集散、花房の長径はやや小、花房の高さは中、1花房の花数は少、花形は受け咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色は75C、花筒の長さは中、花筒の色は淡桃、花弁全体の形状は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形はフリル型、がくの長さはやや短、がく全体の形はやや開く、がくの色は淡緑褐、柱頭のタイプは短花柱花、花の香りは中、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TSK-4」は、対照品種「長後GJ1」と比較して、花弁表面の色が75Cであること、副花冠の形がフリル型であること等で区別性が認められる。対照品種「L. pinceana」と比較して、柱頭のタイプが短花柱花であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

登坂初夫
群馬県吾妻郡中之条町山田3055

6 登録品種の育成をした者の氏名

登坂初夫

7 出願公表の年月日 平成30年7月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ココ」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29453号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 樹高	06 やや高
03 樹姿の幅	05 中
04 茎の太さ	05 中
05 茎の色	03 褐緑
06 茎の毛の多少	03 少
07 節間長	06 やや長
08 葉全体の形	02 長楕円形
09 葉身先端部の形	01 鋭尖形
10 葉身基部の形	02 鋭形
11 葉縁の形	01 全縁
12 葉身の曲がり	03 外曲
13 葉縁の波打ち	03 弱
14 葉身の長さ	06 やや長
15 葉身の幅	05 中
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29453号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の光沢	03 弱
19 成葉表面の毛の有無	01 無
20 成葉裏面の毛の有無	01 無
21 成葉裏面の脈の毛の有無	09 有
22 葉柄の長さ	04 やや短
23 葉柄の色	04 紅褐
24 つばみの色	03 淡桃
25 花序の形	01 集散
26 花房の長径	04 やや小
27 花房の高さ	05 中
28 1花房の花数	03 少
29 花形	01 受け咲
30 花のタイプ	01 一重咲
31 花の大きさ	05 中
32 花弁表面の色	RHSカラーチャート 75C
33 花筒中間部の太さ	06 やや太
34 花筒の長さ	05 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29453号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花筒の色	03 淡桃
36 花弁全体の形状	03 広卵形
37 花弁先端の形	04 円形
38 花弁の曲がり	01 内曲
39 花弁のしわ	03 少
40 花弁の長さ	05 中
41 花弁の幅	04 やや狭
42 花弁の裂片数	01 5枚
43 副花冠の形	03 フリル型
44 がくの長さ	04 やや短
45 がく全体の形	02 やや開く
46 がくの色	05 淡緑褐
47 柱頭のタイプ	01 短花柱花
48 花の香り	05 中
49 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第29454号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. Hoogi031

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや低、樹幅は中、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、枝の主な色は144A、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の先端部の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の鋸歯の形は円鋸歯状、葉身の切れ込みの深さは深、幼葉の表面の主な色は137A、幼葉の裏面の主な色は147C、成葉の表面の主な色は137A、成葉の裏面の主な色は138B、成葉の表面の斑の有無は無、葉身の裏面の毛の有無は無、葉柄の長さは短、葉柄の色は144B、花の直径は小、花卉の表面の主な色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Hoogi031」は、対照品種「SMNPOTWG」と比較して、幼葉の表面の主な色が137Aであること、成葉の表面の主な色が137Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Mark Sebastiaan Hoogenraad
Rijksweg 30a 6744 WB Ederveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Sebastiaan Hoogenraad

7 出願公表の年月日 平成30年7月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Hoogi021」の変異株である。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
Hoogi031

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	04 やや低
03 樹幅	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 144A
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	02 かなり短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の長さ／幅	06 やや高
10 葉身の先端部の形	01 鋭形
11 葉身の基部の形	01 鈍形
12 葉身の鋸歯の形	03 円鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	07 深
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 137A
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 147C
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 137A
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 138B

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
Hoogi031

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 2 9 4 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 成葉の表面の斑の有無	01 無
19 成葉の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
20 葉身の裏面の毛の有無	01 無
21 葉身の裏面の毛の粗密（毛のある品種に限る。）	
22 葉柄の長さ	03 短
23 葉柄の色	RHSカラーチャート 144B
24 花の直径	03 小
25 花卉の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D

1 品種登録の番号及び年月日 第29455号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. ストロベリー サンデー

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形は広楕円形、新葉の色は緑、新葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、成葉の表面の色は緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さはやや短、成葉の幅はやや狭、成葉の形は長楕円形、成葉の横断面の形は凸、成葉の表面の光沢の強弱は中、一花序当たりの着花数は多、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）は球、小花柄の長さは中、小花柄の色は淡緑、がくの有無は有、がく片の長さは中、花の形は漏斗形、花の直径は中、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は一重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN66B、花冠裂片の表面の二次色は69C、花冠裂片の裏面の主な色はN57A、花冠裂片の表面の二次色の分布は基部、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度はやや弱、花冠裂片の花喉部の斑点の型は独立したスポット、花冠裂片の花喉部の斑点の色は61B、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は淡、やくの色は紫、雌ずいの長さはやや長、柱頭の色は赤、開花始期は中、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）は緑、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）はやや短、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）はやや狭、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）は長楕円形、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）はやや凸である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ストロベリー サンデー」は、対照品種「パープルレインボー」と比較して、成葉の表面の光沢の強弱が中であること、花冠裂片の表面の主な色がN66Bであること、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「アルタイル」と比較して、成葉の表面の光沢の強弱が中であること、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コーラルムーン」に「アトラス」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
ストロベリー サンデー

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29455号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	07 広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	02 長楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	01 無又は粗
16 成葉の横断面の形	07 凸
17 成葉の表面の光沢の強弱	05 中

Rhododendron L.
ストロベリー サンデー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	07 多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	03 球
20 小花柄の長さ	05 中
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	05 中
24 花の形	03 漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	05 中
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	04 やや弱
31 花冠裂片の表面の色数	02 2
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N66B
33 花冠裂片の表面の二次色	RHSカラーチャート 69C
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N57A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	01 基部
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	04 やや弱
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	01 独立したスポット
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 61B
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	01 淡
40 やくの色	06 紫
41 雌ずいの長さ	06 やや長
42 柱頭の色	04 赤
43 開花始期	05 中
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	02 長楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	01 無又は極粗
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	06 やや凸
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	04 やや弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29456号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. ラブ スノー

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形はやや広楕円形、新葉の色は緑、新葉のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、成葉の表面の色は濃緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さはやや短、成葉の幅はやや狭、成葉の形は楕円形、成葉の横断面の形は平、成葉の表面の光沢の強弱はやや弱、一花序当たりの着花数はやや多、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）は球、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は淡緑、がくの有無は有、がく片の長さはかなり短、花の形は漏斗形、花の直径は中、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は一重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155C、花冠裂片の裏面の主な色はNN155C、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度は中、花冠裂片の花喉部の斑点の型は独立したスポット、花冠裂片の花喉部の斑点の色は59A、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は同色、やくの色は白、雌ずいの長さは同等、柱頭の色は黄、開花始期はやや晩、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）は濃緑、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）はやや短、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）はやや狭、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）は楕円形、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）は平である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ラブ スノー」は、対照品種「ウェディングブーケ」と比較して、やくの色が白であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成29年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スノーバード」に「ピンクアイス」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
ラブ スノー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	06 やや広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
07 成葉の表面の色	04 濃緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	05 楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	02 やや粗
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	06 やや多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	03 球
20 小花柄の長さ	04 やや短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	02 かなり短
24 花の形	03 漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	05 中
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN155C

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第29456号
35 花冠裂片の表面の二次色の分布		
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	05 中	
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	01 独立したスポット	
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 59A	
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色	
40 やくの色	01 白	
41 雌ずいの長さ	05 同等	
42 柱頭の色	02 黄	
43 開花始期	06 やや晩	
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	04 濃緑	
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑	
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短	
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭	
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	05 楕円形	
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	02 粗	
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平	
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	05 中	

1 品種登録の番号及び年月日 第29457号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. プロミネンス

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形はやや広楕円形、新葉の色は濃緑、新葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、成葉の表面の色は緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さはやや短、成葉の幅はやや狭、成葉の形は長楕円形、成葉の横断面の形は平、成葉の表面の光沢の強弱はやや強、一花序当たりの着花数はやや多、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）は球、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は淡緑、がくの有無は有、がく片の長さはやや短、花の形は開いた漏斗形、花の直径はやや広、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は一重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN57A、花冠裂片の裏面の主な色は58B、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度は中、花冠裂片の花喉部の斑点の型は独立したスポット、花冠裂片の花喉部の斑点の色は187A、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は同色、やくの色は赤、雌ずいの長さはやや長、柱頭の色は赤、開花始期はやや早、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）は緑、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）はやや短、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）はやや狭、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）は長楕円形、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）は平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プロミネンス」は、対照品種「ジンマリー」と比較して、成葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「マキタースプライス」と比較して、成葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「コーラルムーン」に「アトラス」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
プロミネンス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	06 やや広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	04 濃緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	03 緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	02 長楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	02 やや粗
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	06 やや強

Rhododendron L.
プロミネンス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	06 やや多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	03 球
20 小花柄の長さ	04 やや短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	04 やや短
24 花の形	02 開いた漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	06 やや広
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	05 中
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N57A
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 58B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	05 中
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	01 独立したスポット
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 187A
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	04 赤
41 雌ずいの長さ	06 やや長
42 柱頭の色	04 赤
43 開花始期	04 やや早
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	03 緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	02 長楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	02 粗
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第29458号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. マリアン

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形は広楕円形、新葉の色は緑、新葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、成葉の表面の色は濃緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さはやや短、成葉の幅はやや狭、成葉の形は長楕円形、成葉の横断面の形は平、成葉の表面の光沢の強弱はやや弱、一花序当たりの着花数はやや多、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）は球、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は淡緑、がくの有無は有、がく片の長さは中、花の形は広い漏斗形、花の直径は中、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は一重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は69C、花冠裂片の表面の二次色はNN74D、花冠裂片の裏面の主な色はNN74D、花冠裂片の表面の二次色の分布は縁部、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度は中、花冠裂片の花喉部の斑点の型は独立したスポット、花冠裂片の花喉部の斑点の色は60D, 171A（中央側）、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は同色、やくの色は黄、雌ずいの長さは長、柱頭の色は赤、開花始期は極晩、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）は濃緑、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）はやや短、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）はやや狭、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）は長楕円形、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）は平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリアン」は、対照品種「ミセスフジイ」と比較して、やくの色が黄であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「桜狩」と比較して、やくの色が黄であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスジョイナー」と比較して、成葉の裏面の色が淡緑であること、開花始期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社赤塚植物園
三重県津市高野尾町1868-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉林雪夫

7 出願公表の年月日 平成29年4月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「スターダスト」に「羽衣」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
マリアン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	07 広楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	03 緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	04 濃緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	02 長楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	03 中
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱

Rhododendron L.
マリアン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	06 やや多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	03 球
20 小花柄の長さ	04 やや短
21 小花柄の色	02 淡緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	05 中
24 花の形	01 広い漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	05 中
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	07 強
31 花冠裂片の表面の色数	02 2
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 69C
33 花冠裂片の表面の二次色	RHSカラーチャート NN74D
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN74D

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	03 縁部
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	05 中
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	01 独立したスポット
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート 60D, 171A (中央側)
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	02 黄
41 雌ずいの長さ	07 長
42 柱頭の色	04 赤
43 開花始期	09 極晩
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	04 濃緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	02 長楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	03 中
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	05 平
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29459号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhododendron L. 名月 (メイゲツ)

3 登録品種の特性の概要

葉の持続性は常緑、樹姿は叢生、つぼみの形は楕円形、新葉の色は濃緑、新葉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、成葉の表面の色は濃緑、成葉の斑の有無は無、成葉の長さはやや短、成葉の幅はやや狭、成葉の形は長楕円形、成葉の横断面の形は平、成葉の表面の光沢の強弱は弱、一花序当たりの着花数はやや多、花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）は球、小花柄の長さは中、小花柄の色は赤緑、がくの有無は有、がく片の長さはかなり長、花の形は開いた漏斗形、花の直径は中、花の香りの強弱は無又は極弱、花型は一重、花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は4C、花冠裂片の裏面の主な色は4C、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度は強、花冠裂片の花喉部の斑点の型は独立したスポット、花冠裂片の花喉部の斑点の色はN144A、花冠裂片の花喉部の色の濃淡は同色、やくの色は茶、雌ずいの長さはかなり長、柱頭の色は緑、開花始期は晩、成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）は濃緑、成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）はやや短、成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）はやや狭、成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）は長楕円形、成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）はやや凹である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「名月」は、対照品種「カレントリプレット」と比較して、小花柄の色が赤緑であること、花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「サフロンクイーン」と比較して、成葉の裏面の色が淡緑であること、小花柄の色が赤緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

樋口昭男
新潟県五泉市本田屋2166番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

樋口昭男

7 出願公表の年月日 平成29年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「金晃」に「オルガ」を交配し、選抜したものである。

Rhododendron L.
名月

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第29459号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の持続性	03 常緑
02 樹姿	02 叢生
03 つぼみの形	05 楕円形
04 新葉のろう質粉の多少	01 無又は極少
05 新葉の色	04 濃緑
06 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 成葉の表面の色	04 濃緑
08 成葉の裏面の色	02 淡緑
09 成葉の斑の有無	01 無
10 成葉の斑の模様	
11 成葉の斑の色	
12 成葉の長さ	04 やや短
13 成葉の幅	04 やや狭
14 成葉の形	02 長楕円形
15 成葉の表面の毛じの粗密	01 無又は粗
16 成葉の横断面の形	05 平
17 成葉の表面の光沢の強弱	03 弱

Rhododendron L.
名月

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 一花序当たりの着花数	06 やや多
19 花序の形（一花序当たりの着花数が6以上の品種に限る。）	03 球
20 小花柄の長さ	05 中
21 小花柄の色	04 赤緑
22 がくの有無	09 有
23 がく片の長さ	08 かなり長
24 花の形	02 開いた漏斗形
25 花の形2	
26 花の直径	05 中
27 花の香りの強弱	01 無又は極弱
28 花型	01 一重
29 花冠裂片の数（八重品種に限る。）	
30 花冠裂片の周縁部の波打ちの強弱	03 弱
31 花冠裂片の表面の色数	01 1
32 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 4C
33 花冠裂片の表面の二次色	
34 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 4C

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠裂片の表面の二次色の分布	
36 花冠裂片の花喉部の斑点の明瞭度	07 強
37 花冠裂片の花喉部の斑点の型	01 独立したスポット
38 花冠裂片の花喉部の斑点の色	RHSカラーチャート N144A
39 花冠裂片の花喉部の色の濃淡	02 同色
40 やくの色	05 茶
41 雌ずいの長さ	08 かなり長
42 柱頭の色	03 緑
43 開花始期	07 晩
44 成葉（秋葉）の表面の色（常緑品種に限る。）	04 濃緑
45 成葉（秋葉）の裏面の色（常緑品種に限る。）	02 淡緑
46 成葉（秋葉）の長さ（常緑品種に限る。）	04 やや短
47 成葉（秋葉）の幅（常緑品種に限る。）	04 やや狭
48 成葉（秋葉）の形（常緑品種に限る。）	02 長楕円形
49 成葉（秋葉）の表面の毛じの粗密（常緑品種に限る。）	01 無又は極粗
50 成葉（秋葉）の横断面の形（常緑品種に限る。）	04 やや凹
51 成葉（秋葉）の表面の光沢の強弱（常緑品種に限る。）	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第29460号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. ES103

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈は低、分枝の位置は下部、第1果までの節数は極多、葉身長は中、葉幅はやや狭、葉身の長さとの比率は中、複葉の着生程度は中、葉身の緑色の程度は中、葉腋当たりの花数は2花以上、花筒部外面の色は極淡、下唇弁先端部の色は極淡、さく果の房室数は4房室、さく果の長さはやや短、さく果の最大幅は中、さく果の裂開の有無は無、種皮の色は白色、開花始めはやや早、成熟期は極晩である。

出願品種「ES103」は、対照品種「ごまぞう」と比較して、草丈が低であること、花筒部外面の色が極淡であること、下唇弁先端部の色が極淡であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「真瀬金」と比較して、草丈が低であること、花筒部外面の色が極淡であること、下唇弁先端部の色が極淡であること、種皮の色が白色であること、開花始めがやや早であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Equinom Ltd.

Kibbutz Givat Brenner, 6094800, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oron Gar

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アメリカ合衆国農務省（USDA）識別子PI 599439の系統」と「USDA PI 599447、USDA PI 173955、USDA PI 254699、USDA PI 599438及びUSDA PI 157158の交配種子」を交配し、選抜したものである。

Sesamum indicum L.
ES103

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 伸育性	01 無限
02 草丈	03 低
03 分枝の位置	02 下部
04 茎の毛の密度	05 中
05 第1果までの節数	09 極多
06 茎頂部の帯化の有無	01 無
07 葉身長	05 中
08 葉幅	04 やや狭
09 葉身の長さとの比率	05 中
10 複葉の着生程度	05 中
11 葉身の緑色の程度	05 中
12 葉柄の長さ	04 やや短
13 葉柄のアントシアニン着色の有無	01 無
14 葉腋当たりの花数	02 2花以上
15 密腺の有無	01 無
16 花筒部外面の色	01 極淡
17 下唇弁先端部の色	01 極淡

Sesamum indicum L.
ES103

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花筒部外面の毛の粗密	07 密
19 さく果の房室数	01 4房室
20 さく果の長さ	04 やや短
21 さく果の最大幅	05 中
22 さく果の毛の粗密	03 粗
23 さく果の裂開の有無	01 無
24 種皮の色	01 白色
25 セサミン含有量	
26 開花始め	04 やや早
27 成熟期	09 極晩

1 品種登録の番号及び年月日 第29461号 令和4年11月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. ES107

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈はやや低、分枝の位置は下部、第1果までの節数はやや多、葉身長は中、葉幅は中、葉身の長さとの比率はやや小、複葉の着生程度は中、葉身の緑色の程度は中、葉腋当たりの花数は2花以上、花筒部外面の色は極淡、下唇弁先端部の色は極淡、さく果の房室数は4房室、さく果の長さは中、さく果の最大幅は中、さく果の裂開の有無は無、種皮の色は白色、開花始めは早、成熟期はかなり晩である。

出願品種「ES107」は、対照品種「ES103」と比較して、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「まるひめ」と比較して、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「真瀬金」と比較して、分枝の位置が下部であること、花筒部外面の色が極淡であること、下唇弁先端部の色が極淡であること、種皮の色が白色であること、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Equinom Ltd.

Kibbutz Givat Brenner, 6094800, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oron Gar

7 出願公表の年月日 令和3年3月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アメリカ合衆国農務省（USDA）識別子PI 532845の系統」と「USDA PI 599447、USDA PI 173955、USDA PI 254699、USDA PI 599438及びUSDA PI 157158の交配種子」を交配し、選抜したものである。

Sesamum indicum L.
ES107

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 伸育性	01 無限
02 草丈	04 やや低
03 分枝の位置	02 下部
04 茎の毛の密度	05 中
05 第1果までの節数	06 やや多
06 茎頂部の帯化の有無	01 無
07 葉身長	05 中
08 葉幅	05 中
09 葉身の長さとの比率	04 やや小
10 複葉の着生程度	05 中
11 葉身の緑色の程度	05 中
12 葉柄の長さ	05 中
13 葉柄のアントシアニン着色の有無	01 無
14 葉腋当たりの花数	02 2花以上
15 密腺の有無	01 無
16 花筒部外面の色	01 極淡
17 下唇弁先端部の色	01 極淡

Sesamum indicum L.
ES107

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花筒部外面の毛の粗密	07 密
19 さく果の房室数	01 4房室
20 さく果の長さ	05 中
21 さく果の最大幅	05 中
22 さく果の毛の粗密	03 粗
23 さく果の裂開の有無	01 無
24 種皮の色	01 白色
25 セサミン含有量	
26 開花始め	03 早
27 成熟期	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 9 4 6 2 号 令和 4 年 1 1 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. ES108

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈はやや低、分枝の位置は下部、第 1 果までの節数はやや少、葉身長はやや長、葉幅は中、葉身の長さとの比率は中、複葉の着生程度は中、葉身の緑色の程度は中、葉腋当たりの花数は 2 花以上、花筒部外面の色は極淡、下唇弁先端部の色は極淡、さく果の房室数は 4 房室、さく果の長さはやや長、さく果の最大幅は中、さく果の裂開の有無は無、種皮の色は白色、開花始めは早、成熟期はかなり晩である。

出願品種「ES108」は、対照品種「ES107」と比較して、第 1 果までの節数がやや少であること、さく果の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「まるひめ」と比較して、さく果の長さがやや長であること、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「関東 1 号」と比較して、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Equinom Ltd.

Kibbutz Givat Brenner, 6094800, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oron Gar

7 出願公表の年月日 令和 3 年 3 月 4 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アメリカ合衆国農務省 (USDA) 識別子 PI 531236 の系統」と「USDA PI 599447、USDA PI 173955、USDA PI 254699、USDA PI 599438 及び USDA PI 157158 の交配種子」を交配し、選抜したものである。

Sesamum indicum L.
ES108

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 伸育性	01 無限
02 草丈	04 やや低
03 分枝の位置	02 下部
04 茎の毛の密度	05 中
05 第1果までの節数	04 やや少
06 茎頂部の帯化の有無	01 無
07 葉身長	06 やや長
08 葉幅	05 中
09 葉身の長さとの比率	05 中
10 複葉の着生程度	05 中
11 葉身の緑色の程度	05 中
12 葉柄の長さ	05 中
13 葉柄のアントシアニン着色の有無	01 無
14 葉腋当たりの花数	02 2花以上
15 密腺の有無	01 無
16 花筒部外面の色	01 極淡
17 下唇弁先端部の色	01 極淡

Sesamum indicum L.
ES108

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 2 9 4 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花筒部外面の毛の粗密	07 密
19 さく果の房室数	01 4房室
20 さく果の長さ	06 やや長
21 さく果の最大幅	05 中
22 さく果の毛の粗密	03 粗
23 さく果の裂開の有無	01 無
24 種皮の色	01 白色
25 セサミン含有量	
26 開花始め	03 早
27 成熟期	08 かなり晩