

1 品種登録の番号及び年月日 第31108号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia Lindl. RS1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「RS1」は、対照品種「ヘイワード」と比較して、熟梢表皮による芽の被覆の有無が無であること、果実の宿存がくの有無が無であること、倍数性が二倍体であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、果実の甘さがかなり高であること、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sichuan Provincial Natural Resources Research Institute
24 South Second Section, Yihuan Road, Chengdu, Sichuan, China

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wang Mingzhong Li Mingchang

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

野生のActinidia chinensis Planch. の種子から選抜したものである。

Actinidia Lindl.

RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 花性	01 雌
02 自家結実性の有無	01 無
03 樹勢	03 弱
04 幼梢の毛じの密度	03 粗
05 幼梢の毛じの種類	01 極短い軟毛
06 新梢先端部位のアントシアン着色の程度	01 無又は極弱
07 熟梢の太さ	07 太
08 熟梢の陽光面における色	07 紫褐
09 熟梢の樹皮の粗さ	03 滑
10 熟梢の皮目の大きさ	05 中
11 熟梢の皮目の多少	03 少
12 熟梢の皮目の色相	03 褐
13 熟梢の冬芽支持部の大きさ	06 やや大
14 熟梢表皮による芽の被覆の有無	01 無
15 熟梢の芽の開口部の大きさ	09 極大
16 熟梢の葉柄痕の深さ	01 平
17 葉身の形	04 広卵形

Actinidia Lindl.

RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身先端の形	03 鋭形
19 葉脚部の重なり	04 僅かに重なる
20 葉身上面の毛じの密度	01 無又は極粗
21 葉身裏面の毛じの密度	03 粗
22 葉身表面の凹凸の状態	04 やや弱
23 葉身表面の緑色の濃淡	02 かなり淡
24 葉身裏面の色	02 淡緑
25 葉色の複色の有無	01 無
26 葉色の複色の状態	
27 葉柄の相対長(葉柄長／葉身長)	04 やや小
28 葉柄上面のアントシアニン着色の強さ	01 無又は極弱
29 1花穂中の花蕾数	03 少
30 花梗の長さ	06 やや長
31 がくの全体的な色	02 緑
32 花の直径	03 小
33 花弁の重なり具合	03 重なる
34 花弁の湾曲	03 強く湾曲する

Actinidia Lindl.
RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の着色の状態(基部)	02 複色
36 花弁の主な色	03 黄白
37 花弁の着色のぼかしの有無 (単色の品種に限る。)	
38 花弁の色の変化 (単色の品種に限る。)	
39 花糸の色	02 淡緑
40 やくの色	01 黄
41 花柱の姿勢	02 やや直立
42 果実の重さ	05 中
43 果実の形	04 倒卵形
44 果実中央部の横断面の形(扁平の程度)	02 扁円 (中)
45 果頂部の形	02 ややくぼむ
46 果実のがくの周囲のリング	03 明らかに見える
47 果梗部の形	01 角張る
48 果梗の長さ	06 やや長
49 果梗の相対長(果梗長／果実縦径)	04 やや小
50 果実の宿存がくの有無	01 無
51 果皮の色	04 緑褐

Actinidia Lindl.
RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 果皮の色2	
53 果実の毛じの粗密	03 粗
54 果実の毛じの種類	01 極短い軟毛
55 果実の毛じの分布	02 主に果頂部に分布
56 果実の毛じの色	03 黄褐
57 果実の毛じの脱落の難易	07 難
58 果皮の色(可食時期)	07 緑褐
59 果皮の色(可食時期)2	
60 外果皮の色	04 緑黄
61 外果皮の色2	
62 内果皮の色	09 赤
63 内果皮の色2	
64 果実横径に占める果心の直径の比率	07 大
65 果心の全体的な形(横断面)	02 扁円
66 果心の色	03 黄白
67 果実の甘さ	08 かなり高
68 果実の酸度	03 低

Actinidia Lindl.
RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 発芽期	05 中
70 開花期	03 早
71 収穫期	03 早
72 倍数性	02 二倍体
73 熟梢の毛じの密度	01 無～僅
74 熟梢の毛じの種類	01 極短い軟毛
75 熟梢表面の白粉の多少	03 少
76 熟梢の冬芽支持部枝先側の傾斜度	02 傾斜
77 熟梢の冬芽支持部の形状(傾斜のあるものに限る)	03 凸状
78 熟梢の中心髓の種類	02 隔片状
79 葉の鋸歯の大きさ	03 小
80 葉の鋸歯の多少	05 中
81 葉身の大きさ	08 かなり大
82 葉身裏面の葉脈間の棘の有無	01 無～僅
83 葉柄の長さ	05 中
84 葉柄の毛じの密度	01 無又は極粗
85 花芽着生開始の節位	03 基部

Actinidia Lindl.
RS1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花穂の着生節位数	06 やや多
87 がく片裂開初期のつぼみのアントシアン着色の強さ	03 弱
88 花梗の毛じの密度	01 無又は極粗
89 花梗の毛じの長さ	03 短
90 がく片の数	03 5 以上
91 がくの毛じの密度	05 中
92 がくの毛じの長さ	03 短
93 花弁の枚数	05 中
94 花弁の二次色(複色の品種に限る)	02 緑
95 花弁の二次色の分布(複色の品種に限る)	03 基部
96 花柱の数	05 中
97 花柱の曲がり	03 弱
98 花柱の色	01 白
99 やくの数	03 少
100 果実の果皮の皮目の明瞭さ	02 明瞭
101 果実の子室数	08 かなり多
102 可食時期における果皮と果肉の離れやすさ	03 易

Actinidia Lindl.
RS1

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 1 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
103 果心横断面の凹凸形状の有無 104 果梗の太さ	01 無
	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31109号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alocasia (Schott) G. Don ESPE2005

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ESPE2005」は、対照品種「A. lauterbachiana」と比較して、草丈がやや低であること、耳の開度が極狭であること、成葉裏面の色が137Bであること等で区別性が認められる。対照品種「A. ×amazonica」と比較して、成葉裏面の色が137Bであること、斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

J. van Geest Holding B.V.

Perzikenlaan 1, 2691JP 's-Gravenzande, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Geest

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

A. lauterbachiana（在来系統）の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	03 開張
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	(茎なし)
04 茎の太さ	(茎なし)
05 分けつ数	03 少
06 分球性	05 中
07 葉の向き	05 水平
08 葉身と葉柄のなす角度	06 やや広
09 葉柄の付き方	01 盾着
10 幼葉と成葉の葉柄の付き方の差	01 無
11 葉の全体の形	02 卵形
12 幼葉と成葉の形の差	01 不明瞭
13 葉の先端の形 1	09 有
14 葉の先端の形 2	02 鋭形
15 葉の先端の形 3	09 有
16 葉の基部の形	04 矢じり形
17 葉基部の切れ込みの有無	09 有

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31109号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉基部の切れ込みの深さ	09 極深
19 耳の先端の形	02 鈍形
20 耳の開度	01 極狭
21 耳の長さ	05 中
22 葉縁の切れ込み	03 浅
23 葉縁の波打ち	05 中
24 葉面のしわの有無	09 有
25 葉脈の凹凸	03 平滑
26 葉脈周辺部の凹凸	03 平滑
27 葉面の凹凸	02 凹凸
28 葉身長 1	03 短
29 葉身長 2	04 やや短
30 葉身幅	02 かなり狭
31 新葉表面の色	RHSカラーチャート 139A
32 成葉表面の色	RHSカラーチャート 139A
33 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137B
34 主脈の色	RHSカラーチャート 138B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 側脈の色	RHSカラーチャート 138B
36 斑の有無	01 無
37 斑のタイプ	
38 主脈上の斑の有無	
39 側脈上の斑の有無	
40 葉縁の斑の有無	
41 脈間の斑の有無	
42 細脈間の斑の有無	
43 葉の雲形斑の有無	
44 葉のその他の斑の有無	
45 斑の明・不明瞭	
46 斑の幅	
47 葉の主な斑の色	
48 葉脈の数	06 やや多
49 葉の光沢	09 有
50 葉の厚さ	04 やや薄
51 葉のビロード感	01 無

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31109号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 葉の硬さ	05 中
53 葉表面の毛の有無	01 無
54 葉柄の長さ	04 やや短
55 葉柄の太さ	03 細
56 葉柄の色	02 黄緑
57 葉柄の斑の有無	09 有
58 葉柄の斑の形	05 斑点
59 葉柄の斑の色	04 褐
60 葉鞘の有無	09 有
61 葉の香	01 無
62 苞の色	(苞なし)
63 苞の脱落性	(苞なし)
64 肉穂花序の形	(肉穂花序なし)
65 仏炎苞の色	(仏炎苞なし。形質66から69について同様)
66 仏炎苞の形	
67 仏炎苞の大きさ	
68 仏炎苞の厚さ	

ESPE2005

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 1 0 9 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31110号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alocasia (Schott) G. Don ESPE1904

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ESPE1904」は、対照品種「tigrina superba」と比較して、葉身長1が短であること、葉身長2がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「A. zebrina」と比較して、耳の開度の中であること、葉身長1が短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
J. van Geest Holding B.V.
Perzikenlaan 1, 2691JP 's-Gravenzande, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan van Geest

7 出願公表の年月日 令和4年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
A. zebrina（在来系統）の変異株である。

Alocasia (Schott) G. Don
ESPE1904

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 半開張
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	(茎なし)
04 茎の太さ	(茎なし)
05 分けつ数	05 中
06 分球性	06 やや強
07 葉の向き	04 やや上向き
08 葉身と葉柄のなす角度	06 やや広
09 葉柄の付き方	01 盾着
10 幼葉と成葉の葉柄の付き方の差	01 無
11 葉の全体の形	05 矢じり形
12 幼葉と成葉の形の差	01 不明瞭
13 葉の先端の形 1	09 有
14 葉の先端の形 2	01 鋭尖形
15 葉の先端の形 3	09 有
16 葉の基部の形	04 矢じり形
17 葉基部の切れ込みの有無	09 有

Alocasia (Schott) G. Don
ESPE1904

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31110号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉基部の切れ込みの深さ	09 極深
19 耳の先端の形	01 鋭形
20 耳の開度	05 中
21 耳の長さ	05 中
22 葉縁の切れ込み	01 無
23 葉縁の波打ち	02 かなり弱
24 葉面のしわの有無	01 無
25 葉脈の凹凸	02 凸
26 葉脈周辺部の凹凸	03 平滑
27 葉面の凹凸	01 平滑
28 葉身長 1	03 短
29 葉身長 2	02 かなり短
30 葉身幅	02 かなり狭
31 新葉表面の色	RHSカラーチャート N189A
32 成葉表面の色	RHSカラーチャート N189A
33 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137B
34 主脈の色	RHSカラーチャート N189A

Alocasia (Schott) G. Don
ESPE1904

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 側脈の色	RHSカラーチャート N189A
36 斑の有無	01 無
37 斑のタイプ	
38 主脈上の斑の有無	
39 側脈上の斑の有無	
40 葉縁の斑の有無	
41 脈間の斑の有無	
42 細脈間の斑の有無	
43 葉の雲形斑の有無	
44 葉のその他の斑の有無	
45 斑の明・不明瞭	
46 斑の幅	
47 葉の主な斑の色	
48 葉脈の数	03 少
49 葉の光沢	09 有
50 葉の厚さ	06 やや厚
51 葉のビロード感	01 無

Alocasia (Schott) G. Don
ESPE1904

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31110号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 葉の硬さ	05 中
53 葉表面の毛の有無	01 無
54 葉柄の長さ	07 長
55 葉柄の太さ	04 やや細
56 葉柄の色	02 黄緑
57 葉柄の斑の有無	09 有
58 葉柄の斑の形	03 斜め縞
59 葉柄の斑の色	04 褐
60 葉鞘の有無	09 有
61 葉の香	01 無
62 苞の色	(苞なし)
63 苞の脱落性	(苞なし)
64 肉穂花序の形	(肉穂花序なし)
65 仏炎苞の色	(仏炎苞なし。形質66から69について同様)
66 仏炎苞の形	
67 仏炎苞の大きさ	
68 仏炎苞の厚さ	

Alocasia (Schott) G. Don
ESPE1904

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 1 1 0号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31111号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alocasia (Schott) G. Don ESAL1801

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ESAL1801」は、対照品種「tigrina superba」と比較して、葉柄の色がその他（黒）であること、葉柄の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「A. zebrina」と比較して、葉柄の色がその他（黒）であること、葉柄の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
J. van Geest Holding B.V.
Perzikenlaan 1, 2691JP 's-Gravenzande, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan van Geest

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要
A. zebrina（在来系統）の変異株である。

Alocasia (Schott) G. Don
ESAL1801

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31111号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 直立
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	(茎なし)
04 茎の太さ	(茎なし)
05 分けつ数	02 かなり少
06 分球性	05 中
07 葉の向き	03 上向き
08 葉身と葉柄のなす角度	06 やや広
09 葉柄の付き方	01 盾着
10 幼葉と成葉の葉柄の付き方の差	01 無
11 葉の全体の形	05 矢じり形
12 幼葉と成葉の形の差	01 不明瞭
13 葉の先端の形 1	09 有
14 葉の先端の形 2	02 鋭形
15 葉の先端の形 3	09 有
16 葉の基部の形	04 矢じり形
17 葉基部の切れ込みの有無	09 有

Alocasia (Schott) G. Don
ESAL1801

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31111号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉基部の切れ込みの深さ	08 かなり深
19 耳の先端の形	01 鋭形
20 耳の開度	03 狭
21 耳の長さ	07 長
22 葉縁の切れ込み	01 無
23 葉縁の波打ち	01 無
24 葉面のしわの有無	01 無
25 葉脈の凹凸	02 凸
26 葉脈周辺部の凹凸	03 平滑
27 葉面の凹凸	01 平滑
28 葉身長 1	05 中
29 葉身長 2	02 かなり短
30 葉身幅	03 狭
31 新葉表面の色	RHSカラーチャート N189A
32 成葉表面の色	RHSカラーチャート N189A
33 成葉裏面の色	RHSカラーチャート 137B
34 主脈の色	RHSカラーチャート N189A

Alocasia (Schott) G. Don
ESAL1801

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 側脈の色	RHSカラーチャート N189A
36 斑の有無	01 無
37 斑のタイプ	
38 主脈上の斑の有無	
39 側脈上の斑の有無	
40 葉縁の斑の有無	
41 脈間の斑の有無	
42 細脈間の斑の有無	
43 葉の雲形斑の有無	
44 葉のその他の斑の有無	
45 斑の明・不明瞭	
46 斑の幅	
47 葉の主な斑の色	
48 葉脈の数	03 少
49 葉の光沢	09 有
50 葉の厚さ	06 やや厚
51 葉のビロード感	01 無

Alocasia (Schott) G. Don
ESAL1801

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉の硬さ	05 中
53 葉表面の毛の有無	01 無
54 葉柄の長さ	08 かなり長
55 葉柄の太さ	05 中
56 葉柄の色	09 その他（黒）
57 葉柄の斑の有無	01 無
58 葉柄の斑の形	
59 葉柄の斑の色	
60 葉鞘の有無	09 有
61 葉の香	01 無
62 苞の色	（苞なし）
63 苞の脱落性	（苞なし）
64 肉穂花序の形	（肉穂花序なし）
65 仏炎苞の色	（仏炎苞なし。形質66から69について同様）
66 仏炎苞の形	
67 仏炎苞の大きさ	
68 仏炎苞の厚さ	

Alocasia (Schott) G. Don
ESAL1801

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 1 1 1号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31112号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Begonia rhizomatous group KM2021-02

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KM2021-02」は、対照品種「ベニトチバ」と比較して、葉身の表面の脈上模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
木村亮祐
愛知県あま市乙之子屋敷54番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名
木村亮祐

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ベニトチバ」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31112号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 半木立型
02 草丈	07 高
03 葉の型	03 掌状複葉
04 葉の長さ	08 かなり長
05 葉の幅	09 極広
06 葉身の厚さ	05 中
07 葉身の形(単葉の品種に限る。)	
08 葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)	
09 葉身の基部の形(葉柄が葉縁に着生する品種に限る。)	
10 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
11 葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)	
12 葉身の周縁の形	03 重複鋸歯状
13 葉身の周縁の鋸歯の深さ	07 深
14 葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)	
15 葉身の表面の色数	03 3色
16 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート NN137B
17 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 200A

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31112号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面の二次色の分布	01 周縁部
19 葉身の表面の三次色	
20 葉身の表面の三次色の分布	
21 葉身の表面の模様の有無	01 無
22 葉身の表面の主な模様の型	
23 葉身の表面の主な模様の分布	
24 葉身の表面の主な模様の色	
25 葉身の表面の二次の模様の型	
26 葉身の表面の二次の模様の分布	
27 葉身の表面の二次の模様の色	
28 葉身の表面の脈上模様の有無	01 無
29 葉身の表面の脈上模様の分布	
30 葉身の表面の脈上模様の幅	
31 葉身の表面の脈上模様の色	
32 葉身の表面の葉底の色	04 赤
33 葉身の表面の毛の粗密	05 中
34 葉身の表面の毛の色	05 紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31112号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の表面の突起の粗密	01 無又は極粗
36 葉身の凹凸の強弱	02 かなり弱
37 葉身の表面の葉底からの不定芽の発生の有無	09 有
38 葉身の裏面の主な色	02 淡緑
39 葉身の裏面の二次色	07 赤紫
40 葉身の裏面の主脈の色	07 赤紫
41 葉柄の長さ	09 極長
42 葉柄の太さ	05 中
43 葉柄の色	06 赤褐
44 葉柄の模様の有無	01 無
45 葉柄の毛の有無	09 有
46 葉柄の毛の色	01 白
47 葉柄の鱗片の着生の有無	01 無
48 花房の向き	01 上向き
49 花柄の長さ	03 短
50 花柄の分枝回数	02 中
51 雄花の花弁の数	02 4 (5個体のみ開花。形質52～61について同様。)

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31112号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 雄花の直径	
53 雄花の表面の色数	01 1色
54 雄花の外花卉の形	02 卵形
55 雄花の外花卉の表面の先端部の色	RHSカラーチャート 58C
56 雄花の外花卉の表面の基部の色	RHSカラーチャート 58C
57 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の有無	09 有
58 雄花の外花卉の裏面の毛状突起の色	01 白
59 雄花の内花卉の表面の先端部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート 63B
60 雄花の内花卉の表面の基部の色(2弁花を除く。)	RHSカラーチャート 62A
61 やくの色(八重品種を除く。)	01 黄
62 子房の長さ	04 やや短
63 子房の幅	04 やや狭
64 子房の中央部の色	02 淡緑
65 子房の翼の色	08 赤
66 開花習性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31113号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia sinensis (L.) Kuntze りんめい (リンメイ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「りんめい」は、対照品種「せいめい」と比較して、ほう芽期（一番茶）が中であること、一心一葉始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「やぶきた」と比較して、一心三葉期の第三葉の色が濃緑であること、摘採期の茶芽の芽数がやや多であること、葉身の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
吉田克志 荻野暁子 根角厚司 山下修矢 田中淳一 谷口郁也 佐波哲次 高山
和大 大井彩子 萬屋宏 松永明子 武田善行 岡本毅 吉富均

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
「さきみどり」に「さえみどり」を交配し、選抜したものである。

Camellia sinensis (L.) Kuntze
りんめい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹型	01 灌木性
03 樹姿	03 半直立
04 分枝の粗密	07 密
05 枝の屈曲の有無	01 無
06 ほう芽期（一番茶）	05 中
07 一心一葉始期	05 中
08 一心三葉期の第三葉の色	05 濃緑
09 新芽の毛じの有無	09 有
10 新芽の毛じの粗密	05 中
11 新芽の葉柄基部のアントシアニン着色の有無	01 無
12 一心三葉期の新芽長	05 中
13 摘採期（一番茶）	05 中
14 摘採期の茶芽の芽数	06 やや多
15 枝条の太さ	05 中
16 葉の着生角度	02 上向き～水平
17 葉身の長さ	05 中

Camellia sinensis (L.) Kuntze
りんめい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の幅	05 中
19 葉身の形	03 楕円形
20 葉身の緑色の濃淡	07 濃
21 葉身の横断面の形	02 平
22 葉身の表面のしわの強弱	02 中
23 葉身の先端の形	02 鋭形
24 葉の周縁部の波打ちの強弱	01 無又は弱
25 葉の周縁部の鋸歯の強弱	05 中
26 葉身の基部の形	02 鈍形
27 開花期	06 やや晩
28 花柄の長さ	05 中
29 がくの外面の毛じの有無	01 無
30 がくの外面のアントシアニン着色の有無	01 無
31 花の直径	04 やや小
32 内花卉の色	02 白
33 子房の毛じの有無	09 有
34 子房の毛じの粗密	07 密

Camellia sinensis (L.) Kuntze
りんめい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花柱の長さ 36 花柱の分岐点の位置 37 雄ずいに対する柱頭の位置 38 発酵性 39 カフェイン含量	05 中
	04 やや低
	03 同位
	04 やや弱
	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31114号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Castanea Mill. 輝味司（キミツサ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「輝味司」は、対照品種「キダマ」と比較して、果実の形が広卵形であること、果実の座の大きさが中であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「筑波」と比較して、果実の座の大きさが中であること、果皮の色が淡褐であること等で区別性が認められる。対照品種「美玖里」と比較して、雄花穂の長さがかなり長であること、果実の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
宮内宰
茨城県かすみがうら市宍倉2249番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮内宰

7 出願公表の年月日 平成28年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
不明品種の自然交雑実生である。

Castanea Mill.
輝味司

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹姿	02 斜上
03 枝の太さ	03 中
04 節間長	05 中
05 葉序	02 互生
06 枝の色	02 褐
07 枝の皮目の粗密	03 中
08 雌花の数	01 少
09 雄花の花糸の長さ	03 中
10 雄花穂の長さ	08 かなり長
11 若葉の着色の有無	01 無
12 葉の大きさ	07 大
13 葉の横断面の形	02 やや内曲
14 葉の対称性	01 対称又はほぼ対称
15 葉の長さ/葉の幅	05 中
16 葉の着生の向き	02 水平
17 葉の表面の緑色の濃淡	03 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の裏面の色	02 淡緑
19 葉の形	02 狭楕円形
20 葉の先端部の形	03 鋭形
21 葉の基部の形	03 心形
22 葉の周縁部の形	01 針状
23 葉の基部の対称性	01 対称又はほぼ対称
24 葉柄の色	01 黄
25 葉身の長さ／葉柄の長さ	04 やや小
26 きゅう果の形	03 円柱形
27 きゅう果のとげの粗密	03 中
28 果実の胚	01 単胚
29 果実の胚の密着の強弱（多胚品種に限る。）	
30 果実の渋皮の胚への侵入	03 弱
31 果実の形	01 広卵形
32 果実上部の毛の着生部の大きさ	01 小
33 果実の座の大きさ	05 中
34 果実の座と鬼皮の境界線の形	03 波状

Castanea Mill.
輝味司

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の座の明瞭度	02 明瞭
36 果実の光沢の有無	09 有
37 果皮の色	01 淡褐
38 果実の大きさ	08 かなり大
39 渋皮の接着の強弱	07 強
40 果肉の色	03 黄
41 果肉の内部の空洞の有無（単胚品種に限る。）	01 無
42 ほう芽期	05 中
43 雄花の開花期	07 晩
44 雌花の開花期	05 中
45 成熟期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31115号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don セと福BUMR (セトフクBUMR)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セと福BUMR」は、対照品種「セと福 RMR」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花の表面の主な色が59Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
未来アグリス株式会社
愛知県長久手市山越606番地
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久
- 7 出願公表の年月日 令和4年8月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統にイオンビームを照射して得られた変異株である。

Catharanthus roseus (L.) G. Don
せと福BUMR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
05 茎の一次分枝の数	03 少
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の形	02 長楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	03 短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	04 やや小
17 花弁の重なり	02 接する

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	02 2
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 59A
20 花の表面の二次色	RHSカラーチャート 52D
21 花の表面の二次色の分布	04 部分又は縞
22 花の表面の二次色の割合	02 かなり少
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の色数	02 2
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート 65D
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 45B
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	01 明瞭
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	02 黄
32 花弁の幅	04 やや狭
33 花弁の形	02 広倒卵形又は横楕円形
34 花弁の切れ込みの有無	09 有

Catharanthus roseus (L.) G. Don
せと福BUMR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31116号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ22 (サクライ22)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サクライ22」は、対照品種「流星」と比較して、副花冠の有無が有であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北島和幸
奈良県磯城郡田原本町382-1クリオコートⅢ102号室

6 登録品種の育成をした者の氏名
北島和幸

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配した中のこぼれ種の実生を選抜したものである。

Catharanthus roseus (L.) G. Don
サクライ22

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
05 茎の一次分枝の数	05 中
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	04 やや短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	05 中
15 副花冠の有無	09 有
16 花の直径	04 やや小
17 花弁の重なり	01 離れる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	03 3以上
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N82A
20 花の表面の二次色	RHSカラーチャート N81A ; 155A(三次色)
21 花の表面の二次色の分布	04 部分又は縞
22 花の表面の二次色の割合	07 多
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	02 かなり小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	01 明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート N79B
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	06 紫
32 花弁の幅	04 やや狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	09 有

Catharanthus roseus (L.) G. Don
サクライ22

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	01 非対称
	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31117号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don T01028

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「T01028」は、対照品種「T0904」と比較して、花の表面の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Suncatha 2460」と比較して、花の表面の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
木幡龍弥 向井豊 橋本翔

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ミヨVIKA20-129-1」の自然交雑実生より選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	05 中
04 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 茎の一次分枝の数	04 やや少
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅	04 やや狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	04 やや短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	03 小
17 花弁の重なり	01 離れる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N57C
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	02 かなり小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	02 不明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート N155B
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	02 黄
32 花弁の幅	03 狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
T01028

登 録 番 号 第 3 1 1 1 7 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31118号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don T01029
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「T01029」は、対照品種「Suncatfe 23」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ビットシャーナ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
木幡龍弥 向井豊 橋本翔
- 7 出願公表の年月日 令和5年2月9日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ミヨVIKA20-129-1」の自然交雑実生より選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
05 茎の一次分枝の数	05 中
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	03 短
08 葉の幅	03 狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	04 やや短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	03 小
17 花弁の重なり	01 離れる

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31118号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	03 小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	01 明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート 67A
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	05 赤
32 花弁の幅	03 狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
T01029

登 録 番 号 第 3 1 1 1 8 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31119号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don MYCAT028

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYCAT028」は、対照品種「Suncatha 2460」と比較して、花の表面の主な色が53Cであること、花の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「T0904」と比較して、花の表面の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	03 狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 茎の一次分枝の数	05 中
06 茎の二次分枝の数	02 かなり少
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅	03 狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	03 短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	02 かなり小
17 花弁の重なり	01 離れる

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31119号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 53C
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	01 無
24 花の目の大きさ	
25 花の目の色数	
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	
27 花の内側の目の色	
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	02 黄
32 花弁の幅	02 かなり狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
MYCAT028

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31120号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. 精寒ゆりか（セイカンユリカ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「精寒ゆりか」は、対照品種「精いちよう」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の長さが短であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。対照品種「精寒ちふゆ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の紅色系一重の育成系統に混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	06 やや大
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	06 やや長
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	06 やや深
14 葉の裂片縁部の重なり	05 重なる
15 葉の基部の形	05 凹形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	05 中
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	05 中
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 70A
30 頭花の型	03 半八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	01 デイジー
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	03 小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	03 短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	01 極少
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	03 少
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	03 斜上
45 舌状花の表面の状態	02 うね状
46 舌状花のキールの数	
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	03 短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	01 1
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 72A
65 舌状花の表面の二次色	
66 舌状花の表面の二次色の分布	
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 70B
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 72A
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 70B
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	05 中
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	06 やや大
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	02 平
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	03 黄緑
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	01 無
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.

精寒ゆりか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	06 黄橙
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（寒ギク）
97 各開花習性における早晩性	03 早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

精寒ゆりか

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

03 浅

1 品種登録の番号及び年月日 第31121号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイミラク (セイラク)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイミラク」は、対照品種「ビジュー」と比較して、頭花の型が八重であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クレル」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のピンク色系のポンポン咲き育成系統にデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイミラク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	07 高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	04 紫
06 たく葉の大きさ	03 小
07 葉柄の向き	02 かなり斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	04 やや短
09 葉の長さ	04 やや短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	06 やや高
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	06 やや長
13 葉の一次欠刻の深さ	08 かなり深
14 葉の裂片縁部の重なり	03 接近する
15 葉の基部の形	03 円形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Chrysanthemum L.
セイミラク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	08 かなり多
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	07 深
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	03 小
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 71B
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	05 中

Chrysanthemum L.
セイミラク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	05 中
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	04 平（巻かない）
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	03 外反
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	05 先端部1/2
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	03 弱
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	03 先端部1/4
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	04 やや狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 70B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155B
66 舌状花の表面の二次色の分布	08 基部
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	01 一様又はほぼ一様

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	01 類似する
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 73D:70B(中央部の縦線)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 72C:NN155B(基部)
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 76D:71A(先端)
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

Chrysanthemum L.
セイミラク

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（寒ギク）
97 各開花習性における早晩性	02 かなり早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイミラク

第3 1 1 2 1号

06 やや斜下

1 品種登録の番号及び年月日 第31122号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum L. セイトリマン (セトリマン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「セイトリマン」は、対照品種「ビジュー」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の型が八重であること、舌状花の表面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クレル」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、舌状花の表面の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
イノチオ精興園株式会社
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田謙久

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のピンク色系のデコラ咲き育成系統にデコラ咲き系統の混合花粉を交配し、選抜したものである。

Chrysanthemum L.
セイトリマン

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	08 かなり高
02 草型	01 叢生でない
03 草姿（叢生品種に限る）	
04 分枝の粗密（叢生品種に限る）	
05 茎の色	02 紫又は褐を帯びた緑
06 たく葉の大きさ	06 やや大
07 葉柄の向き	03 斜上
08 葉柄の葉長に対する長さ	05 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	05 中
11 葉の長さ／幅	05 中
12 葉の先端裂片の相対的な長さ	04 やや短
13 葉の一次欠刻の深さ	05 中
14 葉の裂片縁部の重なり	01 広がる
15 葉の基部の形	02 鈍形
16 葉の表面の光沢の強弱	02 弱
17 葉の表面の緑色の濃淡	05 中

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の表面の周縁淡色部の顕著さ (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
19 葉の裏面の毛の粗密 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
20 葉の裏面の色 (Chrysanthemum × morifolium品種を除く)	
21 葉の周縁の二次欠刻の数	03 少
22 葉の周縁の二次欠刻の深さ	05 中
23 花序の形 (叢生でない品種に限る)	04 散房花序型
24 花序の最大幅 (叢生でない品種に限る)	03 狭
25 花序の一次分枝の着生角度 (叢生でない品種に限る)	05 中
26 花序の側枝の頭花の向き (叢生でない品種に限る)	01 上
27 一茎当たりの頭花の総数 (叢生でない品種に限る)	03 少
28 株当たりの頭花の総数 (叢生品種に限る)	
29 花らしい外面の色	RHSカラーチャート 18A
30 頭花の型	05 八重
31 花盤の型 (八重及び露心する八重品種を除く)	
32 頭花の直径 (摘らいしていないもの)	04 やや小
33 頭花の直径 (摘らいしたもの)	
34 頭花の高さ (摘らいしていないもの)	03 低

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 頭花の高さ（摘らいしたもの）	
36 頭花の花柄の長さ	04 やや短
37 頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）	
38 頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）	
39 頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）	05 中
40 頭花の舌状花の形の数	01 1
41 頭花の舌状花の主要な形	01 舌状
42 頭花の舌状花の二次的な形	
43 頭花の舌状花の三次的な形	
44 舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）	
45 舌状花の表面の状態	03 キール
46 舌状花のキールの数	02 2
47 舌状花の花筒の長さ	02 かなり短
48 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）	06 平
49 舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）2	
50 舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）	05 弱い外巻き
51 舌状花の周縁の巻く部分の位置（管状でない舌状花）	06 先端部1/2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 舌状花の筒部の形（ロート状、さじ状及び管状の舌状花）	
53 舌状花の縦断面の形状	02 平
54 舌状花の縦断面の平でない部位（平でない舌状花）	
55 舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）	
56 舌状花の内花弁の縦断面の形状（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
57 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の平でない部位（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
58 舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	
59 舌状花の長さ	04 やや短
60 舌状花の幅	03 狭
61 舌状花の長さ／幅	04 やや低
62 舌状花の先端の形	06 突起状
63 舌状花の表面の色数	02 2
64 舌状花の表面の主な色	RHSカラーチャート 12B
65 舌状花の表面の二次色	RHSカラーチャート 173B
66 舌状花の表面の二次色の分布	02 先端部1/4
67 舌状花の表面の二次色の分布2	
68 舌状花の表面の二次色の型	02 ぼかし

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 舌状花の表面の三次色	
70 舌状花の表面の三次色の分布	
71 舌状花の表面の三次色の分布2	
72 舌状花の表面の三次色の型	
73 舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）	02 著しく異なる
74 舌状花の裏面の色	RHSカラーチャート 173D:185B(中央部の縦線)
75 舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート N167C
76 舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）	RHSカラーチャート 178C
77 花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）	
78 花盤の直径（アネモネ型の一重及び半八重品種に限る）	
79 花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）	
80 花盤の断面の形（デイジー型の品種に限る）	
81 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）	
82 花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る） 2	
83 花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）	
84 花盤と比較した開やく前の中央暗色スポットの大きさ（デイジー型の品種に限る）	
85 花盤の開やく前の中央暗色スポットの色（デイジー型の品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）	
87 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）	
88 花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）2	
89 花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）	
90 管状花の形（アネモネ型の品種に限る）	
91 管状花の長さ（アネモネ型の品種に限る）	
92 管状花の色（アネモネ型の品種に限る）	
93 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）	
94 日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）2	
95 自然の開花時期（正確な日長制御なしで栽培された場合に限る）	08 かなり晩
96 開花習性	04 12月～2月咲き（寒ギク）
97 各開花習性における早晩性	02 かなり早
98 側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）	
99 頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）	
100 頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）	
101 頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）	
102 頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）	

セイトリマン

第3 1 1 2 2号

05 水平

1 品種登録の番号及び年月日 第31123号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. Wt141205

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Wt141205」は、対照品種「レモンベル」と比較して、がく片の裏面の主な色が3Dであること等で区別性が認められる。対照品種「コーリー」と比較して、葉型が三出複葉であること、花型が半八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Marco de Wit
Halve Raak 27 2771 AC Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Marco de Wit

7 出願公表の年月日 平成29年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Love Child」の自然交雑実生から、選抜したものである。

Clematis L.
Wt141205

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 1 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	07 強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	07 密
06 葉型	02 三出複葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	05 中
09 葉身の形	06 心臓形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	04 心形
12 葉身の周縁の形	05 鋸歯状
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	01 2
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
Wt141205

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	03 下向き
23 花型	02 半八重
24 花の直径	04 やや小
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	02 鐘形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	
29 花の香り	02 弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	04 やや狭
32 がく片の形	01 卵形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	

Clematis L.
Wt141205

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	03 弱
36 がく片の先端部の形	03 鋭形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	01 無又は極弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	01 1
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 2C
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	02 均一
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 3D
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 177A
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	06 基部

Clematis L.
Wt141205

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	09 有
55 弁化した仮雄ずいの多少	03 少
56 弁化した仮雄ずいの主な色	03 黄
57 花糸の色	(雄ずいなし)
58 花糸の色2	
59 やくの色	(雄ずいなし)
60 やくの色2	
61 柱頭の色	02 黄
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31124号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. オエフジトーチライト (オエフジトーチライト)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「オエフジトーチライト」は、対照品種「火岳」と比較して、葉型が単葉であること、花糸の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「キャッツアイ」と比較して、がく片の形がへら形であること、花糸の色が淡黄であること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラグリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要
「アフロディテエレガフミナ」に「ヘンダーソニー」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.
オエフジトーチライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 無つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	01 直立
03 草勢（つる性品種に限る。）	
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	01 単葉
07 葉身の長さ	08 かなり長
08 葉身の幅	07 広
09 葉身の形	02 卵形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	03 円形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	09 極深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
オエフジトーチライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	08 かなり長
22 花の向き	02 横向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	05 中
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	01 凹形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	01 4枚のみ
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	04 やや狭
32 がく片の形	06 へら形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	07 外曲

Clematis L.
オエフジトーチライト

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート N81B
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N82B
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	01 覆輪状
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N82B
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 83B
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	04 脈沿い

Clematis L.
オエフジトーチライト

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31124号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	02 淡黄
58 花糸の色2	
59 やくの色	04 黄、08 紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	03 当年伸長枝
64 開花始期	05 中

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31125号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. 風の方位 (かぜノほうい)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「風の方位」は、対照品種「流星」と比較して、がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）が中斑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社及川フラググリーン
岩手県花巻市東和町砂子1区403番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
及川洋磨
- 7 出願公表の年月日 令和4年1月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「フロリダ」に「流星」を交配し、選抜したものである。

Clematis L.

風の方位

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	06 やや強
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	03 粗
06 葉型	03 2回三出複葉
07 葉身の長さ	04 やや短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の形	01 披針形
10 葉身の先端の形	01 鋭先形
11 葉身の基部の形	01 鋭形
12 葉身の周縁の形	01 全縁
13 葉身の切れ込みの有無	09 有
14 葉身の裂片の数	02 3又は4
15 葉身の切れ込みの深さ	07 深
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.

風の方位

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	01 無又は弱
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	02 中間部
21 小花柄の長さ	06 やや長
22 花の向き	01 上向き
23 花型	01 一重
24 花の直径	06 やや大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	02 4～6枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	01 離れる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	06 やや長
31 がく片の幅	05 中
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	01 凹形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	07 外曲

Clematis L.
風の方位

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	01 1 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート 91D
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 94D
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 91C
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 86B
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.

風の方位

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	01 無
55 弁化した仮雄ずいの多少	
56 弁化した仮雄ずいの主な色	
57 花糸の色	01 白、08 紫
58 花糸の色2	
59 やくの色	09 青紫
60 やくの色2	
61 柱頭の色	05 紫
62 花柱の色	02 黄緑
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	06 やや晩

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31126号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Clematis L. 紅焰 (コウエン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「紅焰」は、対照品種「エヴィジョーヒル」と比較して、がく片の表面の主な色がN78Aであること、がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）がN82Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社はなせきぐち
群馬県前橋市北代田町497番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
関口雄二 佐々木正
- 7 出願公表の年月日 令和4年1月24日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「ドクターラッペル」の変異株である。

Clematis L.

紅焰

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 つる性
02 草姿（無つる性品種に限る。）	
03 草勢（つる性品種に限る。）	05 中
04 新しょうの毛の有無	09 有
05 新しょうの毛の粗密	07 密
06 葉型	02 三出複葉
07 葉身の長さ	05 中
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の形	01 披針形
10 葉身の先端の形	03 鋭形
11 葉身の基部の形	03 円形
12 葉身の周縁の形	02 波状
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の裂片の数	
15 葉身の切れ込みの深さ	
16 葉身の表面の主な色	03 緑
17 葉身の斑の有無	01 無

Clematis L.
紅焰

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の表面のしわ	02 中
19 花の着き方	01 単花
20 着花の位置	03 先端部
21 小花柄の長さ	03 短
22 花の向き	01 上向き
23 花型	02 半八重
24 花の直径	07 大
25 花の形（一重又は半八重品種に限る。）	04 車形
26 花の側面の形（車形の品種に限る。）	02 平形
27 がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）	04 6～8枚
28 がく片の着き方（車形の品種に限る。）	03 重なる
29 花の香り	01 無又は極弱
30 がく片の長さ	07 長
31 がく片の幅	06 やや広
32 がく片の形	03 楕円形
33 がく片の横断面の形	02 平形
34 がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）	05 平

Clematis L.
紅焰

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）	
36 がく片の先端部の形	02 突形
37 がく片の基部の形	02 2 型
38 がく片の周縁部の波打ち	03 弱
39 がく片の縦軸方向のねじれの有無	01 無
40 がく片の縦軸方向のねじれの強弱	
41 がく片の表面の色数	02 2 以上
42 がく片の表面の主な色	RHSカラーチャート N78A
43 がく片の表面の主な色の分布（色数が1の品種に限る。）	
44 がく片の表面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート N82C
45 がく片の表面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	01 覆輪状
46 がく片の表面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
47 がく片の表面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
48 がく片の裏面の色数	02 2 以上
49 がく片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N82D
50 がく片の裏面の二次色（色数が2以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 145C
51 がく片の裏面の二次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	02 中斑

Clematis L.

紅焰

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 がく片の裏面の三次色（色数が2以上の品種に限る。）	
53 がく片の裏面の三次色の分布（色数が2以上の品種に限る。）	
54 弁化した仮雄ずいの有無	09 有
55 弁化した仮雄ずいの多少	07 多
56 弁化した仮雄ずいの主な色	07 紫（二次色；N78A）
57 花糸の色	（雄ずいなし）
58 花糸の色2	
59 やくの色	（雄ずいなし）
60 やくの色2	
61 柱頭の色	（雌ずいなし）
62 花柱の色	（雌ずいなし）
63 開花習性	02 前年及び当年伸長枝
64 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31127号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cordyline Comm. ex Juss. ドラゴ (ﾄﾞﾗｺﾞ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ドラゴ」は、対照品種「グローカル」と比較して、幼葉の地色がN77Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Cordyline stricta（在来系統）」と比較して、葉の展開状態が斜上であること、葉の先端の形が鋭尖形であること、幼葉の地色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
奥山裕司
東京都八丈島八丈町檜立416番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
奥山裕司

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
「グローカル」の自然交雑実生から選抜したものである。

Cordyline Comm. ex Juss.

ドラゴ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹高	05 普通
02 茎の分枝性	01 無
03 葉の展開状態	03 斜上
04 脱葉性	05 中
05 茎の太さ	07 太
06 節間	05 普通
07 茎の色	RHSカラーチャート 199C
08 葉の全体の形	03 倒披針形
09 葉の先端の形	03 鋭尖形
10 葉の基部の抱合	05 中
11 葉縁の波打ち	01 無
12 葉身の反り	04 IV型
13 葉身のねじれ	01 無
14 葉柄の長さ	01 無
15 葉身の長さ	04 31～50cm
16 葉身の幅	04 3.1～5.0cm
17 葉形指数	05 5.1～10.0

重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉脈の型	01 平行脈
19 葉脈の明瞭度	09 明瞭
20 葉の厚さ	05 中
21 幼葉の地色	RHSカラーチャート N77A
22 葉の新旧による斑の安定度	
23 葉の季節による斑の安定度	
24 成葉の表面の地色	RHSカラーチャート 137A
25 成葉の裏面の地色	RHSカラーチャート 137B
26 成葉の斑の有無	01 無
27 成葉の斑の鮮明度	
28 成葉の斑の型	
29 葉の基本斑の模様	
30 葉の二次斑の模様	
31 葉の三次斑の模様	
32 成葉の斑の基本色	
33 成葉の斑の二次的な色	
34 成葉の斑の三次的な色	

ドラゴ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重要な性質

重要な形質に係る特性

05 申

05 中

05 普通

05 中

07 難

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31128号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cupressus L. Havfrego
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Havfrego」は、対照品種「ゴールドクレスト」と比較して、第1次枝の分枝密度が疎であること等で区別性が認められる。対照品種「ウィルマ」と比較して、第1次枝の出方が鈍角であること、第1次枝の分枝密度が疎であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Marcus J.W.M. Verschuren
Putselaarstraat 4a, 5443 NG Haps, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Marcus J.W.M. Verschuren
- 7 出願公表の年月日 令和元年11月5日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「GoldCrest」の実生株から選抜したものである。

Cupressus L.
Havfrego

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹形	01 広円錐形
02 樹幹	02 単幹
03 樹高	04 やや低
04 樹皮の色	05 灰茶
05 枝の長さ	09 極長
06 第1次枝の出方	03 鈍角
07 第1次枝の分枝密度	03 疎
08 高次枝の出方	02 中
09 高次枝の分枝密度	03 疎
10 高次枝のねじれ	01 無
11 高次枝の分枝の扁平度	03 弱
12 高次枝の重なり	03 薄
13 葉形	03 針状葉
14 鱗状葉の発現程度	01 無
15 鱗状葉の着生密度	
16 針状葉の着生密度	09 極密
17 針状葉の長さ	03 短

Cupressus L.
Havfrego

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 針状葉の幅	04 やや狭
19 新梢の葉の色	04 黄緑（二次色：162D）
20 枝先の冬の葉の色	04 黄緑
21 雌花の色	
22 雄花の色	
23 着花の難易	07 難
24 球果の形	
25 球果の大きさ	
26 球果の色	
27 成長の早さ	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31129号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresi21800

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi21800」は、対照品種「Bresh20523」と比較して、二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数が少であること、花序の配列が平又はわずかに凸であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。対照品種「KS13307-03」と比較して、花序の配列が平又はわずかに凸であること、子房の表面がやや肋状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21800

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31129号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	01 4
09 節間の長さ	04 やや短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21800

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21800

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31129号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	01 タイプ1
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21800

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 2 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31130号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresg21448

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresg21448」は、対照品種「Bresg19442」と比較して、花卉の主な色がN79Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresg21448

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	01 円形
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresg21448

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresg21448

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	06 やや大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	04 タイプ4
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N79B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N79C

Dianthus caryophyllus L.
Bresg21448

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31130号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	04 大
57 花弁の三次色の模様	05 ぼかし
58 花弁の三次色	RHSカラーチャート 76D
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31131号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh21301
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresh21301」は、対照品種「Bresd18132」と比較して、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21301

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31131号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21301

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31131号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	07 広
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21301

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31131号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 55C
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21301

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31132号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresi219
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi219」は、対照品種「BAROSBORNE」と比較して、花卉の切れ込みの深さが浅であること、花柱の数が2．3．4．5本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi219

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi219

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31132号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi219

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31132号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	06 やや大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	02 中
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	03 浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 42A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi219

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31132号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	05 桃
66 開花期	03 早
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31133号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresh21869
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresh21869」は、対照品種「Brese17710」と比較して、子房の表面が平滑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21869

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31133号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	07 多
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21869

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21869

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31133号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 73D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresh21869

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31134号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresi21650
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi21650」は、対照品種「INGU ギャレット」と比較して、がくの裂片の縦軸の形が外反であること、花卉の縁の形が波状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21650

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21650

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21650

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	04 やや少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 1D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 52B

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21650

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	07 晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31135号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresi21953
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Bresi21953」は、対照品種「ベガ」と比較して、葉の長さがやや短であること、花柱の肩の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21953

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	03 短
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21953

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	01 平又はわずかに凸
22 つぼみの形	04 長楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	02 弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	01 裂片の周縁

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21953

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	01 波状
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート N74A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21953

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	02 2～3本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	03 白に紫ぼかし
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31136号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresi211535
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Bresi211535」は、対照品種「BREWAVE」と比較して、花卉の覆輪部の幅が無であること、子房の表面が強い肋状であること、花柱の数が2．3．4．5本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211535

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31136号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	03 少
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	04 強い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211535

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	05 倒卵形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211535

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31136号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	01 タイプ1
44 花弁の波打ち	01 無又は弱
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 24D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 33D

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211535

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31136号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	02 小
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	04 斑点
58 花弁の三次色	RHSカラーチャート 52A
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	05 中
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31137号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresi211596

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi211596」は、対照品種「KS14215-03」と比較して、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること、花卉の二次色が55Aであること、花卉の条の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211596

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	06 やや長
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	03 6
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211596

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	02 外反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211596

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31137号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 19D
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 55A

Dianthus caryophyllus L.
Bresi211596

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31137号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	04 広
53 花弁の条の多少	03 中
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	08 かなり晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31138号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. Bresi21687
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi21687」は、対照品種「Bresh20866」と比較して、葉の幅が極狭であること、がくの裂片の縦軸の形が直であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Breier Haim Ilan
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21687

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	09 有
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	05 中
07 花房形成した側枝の割合	01 無
08 節間の数	02 5
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21687

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31138号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	03 強
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	02 凸
22 つばみの形	04 長楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	05 中
30 がくの幅	03 狭
31 がくの形	02 円筒形
32 がくの裂片の縦軸の形	01 直
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21687

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31138号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	04 やや小
39 花弁の数（八重品種に限る。）	03 少
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	04 やや短
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 68D
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21687

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	01 2本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	01 無
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	08 かなり晩
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31139号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. Bresi21333

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bresi21333」は、対照品種「ミュンヘン」と比較して、花卉の切れ込みの深さがかなり浅であること、花卉の主な色が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Breier Haim Ilan
Bnei Zion 6091000, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Breier Haim Ilan

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	02 楕円形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21333

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 3 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	02 暗緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	07 長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21333

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31139号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	04 やや低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 4C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 55C

Dianthus caryophyllus L.
Bresi21333

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31139号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31140号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. NATifor

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「NATifor」は、対照品種「フォルゴーレ」と比較して、茎の長さが中であること、花卉の数（八重品種に限る。）がやや多であること、花卉の二次色が43Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SB TALEE DE COLOMBIA SAS

C1 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bogota, D.C., Colombia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandra Medina Parodi

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
NATifor

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	05 中
10 茎の太さ	07 太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
NATifor

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	02 円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	02 やや鋭尖
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	06 やや広
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
NATifor

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	08 かなり大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	03 多
46 花弁の縁の形	04 鋸歯
47 花弁の切れ込みの深さ	08 かなり深
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 3C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 43C

Dianthus caryophyllus L.
NATifor

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	02 狭
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	02 やや肋状
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	02 白に赤ぼかし
66 開花期	06 やや晩
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31141号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. NATsona
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NATsona」は、対照品種「スピリッツ ブランコローサ」と比較して、花卉の二次色がN57Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
SB TALEE DE COLOMBIA SAS
Cl 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bogota, D.C., Colombia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Sandra Medina Parodi
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
NATsona

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	06 やや長
15 葉の幅	03 狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
NATsona

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31141号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	02 円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	03 離れる
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	02 短
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	05 中
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
NATsona

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	06 やや高
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	03 強
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	05 中
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート NN155C
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート N57C

Dianthus caryophyllus L.
NATsona

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	03 中
53 花弁の条の多少	02 少
54 花弁の斑点の多少	02 少
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	01 平滑
62 花柱の数	06 2. 3. 4. 5本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31142号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. NATance

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NATance」は、対照品種「Bresg19442」と比較して、花卉の切れ込みの深さが極浅であること、花卉の主な色が186Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
SB TALEE DE COLOMBIA SAS
Cl 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bogota, D.C., Colombia

6 登録品種の育成をした者の氏名
Sandra Medina Parodi

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
NATance

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31142号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	04 やや短
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	05 中
11 茎の横断面の形	03 角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	04 やや短
15 葉の幅	01 極狭
16 葉の巻き	01 無又は反曲が極弱
17 葉の横断面の形	02 弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
NATance

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つぼみの形	03 楕円形
23 つぼみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	02 やや鋭尖
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	01 漏斗形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
NATance

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31142号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	04 やや短
37 花型	02 八重
38 花の直径	05 中
39 花弁の数（八重品種に限る。）	05 中
40 花冠の高さ	03 低
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	02 平
43 花弁の主な形	03 タイプ3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	01 極浅
48 花弁の長さ	05 中
49 花弁の幅	04 やや狭
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 186A
51 花弁の二次色	

Dianthus caryophyllus L.
NATance

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	01 無
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	01 無
58 花弁の三次色	
59 子房の形	03 楕円形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	01 短
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	06 赤
66 開花期	02 かなり早
67 日持ち性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31143号 令和7年8月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. NATeta
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NATeta」は、対照品種「レージェマロン」と比較して、花卉の三次色の模様が条、斑点であること、花柱の数が3～4本であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
SB TALEE DE COLOMBIA SAS
Cl 95 71 31 To 4 Ap 1401, Bogota, D.C., Colombia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Sandra Medina Parodi
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Dianthus caryophyllus L.
NATeta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 草丈	
03 植物体の粗密	
04 花の位置	
05 つばみ又は花のない側枝の有無	
06 二次的なつばみ又は花を有する側枝の数	
07 花房形成した側枝の割合	
08 節間の数	
09 節間の長さ	06 やや長
10 茎の太さ	06 やや太
11 茎の横断面の形	02 やや角張る
12 茎の中空の有無	01 無
13 葉の形	03 線形
14 葉の長さ	05 中
15 葉の幅	02 かなり狭
16 葉の巻き	02 弱い反曲
17 葉の横断面の形	01 平又は極弱い凹

Dianthus caryophyllus L.
NATeta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の色	03 灰緑
19 葉の白粉の強弱	02 中
20 葉の縁の繊毛の有無	01 無
21 花序の配列	
22 つばみの形	03 楕円形
23 つばみの花柱の露出	01 無
24 ほう葉の外裂片のがくに対する密着度	01 密着
25 ほう葉の外裂片の先端の形	01 鋭
26 ほう葉の外裂片の先端の長さ	03 中
27 ほう葉の内裂片の先端の形	01 鋭
28 ほう葉の内裂片の先端の長さ	02 短
29 がくの長さ	06 やや長
30 がくの幅	04 やや狭
31 がくの形	03 鐘形
32 がくの裂片の縦軸の形	04 内反
33 がくのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
34 がくのアントシアニン着色の分布	

Dianthus caryophyllus L.
NATeta

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの裂片の先端部の形	01 鋭
36 がくの裂片の長さ	03 短
37 花型	02 八重
38 花の直径	07 大
39 花弁の数（八重品種に限る。）	06 やや多
40 花冠の高さ	05 中
41 花冠上部の側面の形	03 やや凸
42 花冠下部の側面の形	01 凹
43 花弁の主な形	03 タイプ 3
44 花弁の波打ち	02 中
45 花弁の縁の切れ込みの多少	01 無又は少
46 花弁の縁の形	05 鈍鋭混在
47 花弁の切れ込みの深さ	02 かなり浅
48 花弁の長さ	06 やや長
49 花弁の幅	06 やや広
50 花弁の主な色	RHSカラーチャート 56B
51 花弁の二次色	RHSカラーチャート 27C

Dianthus caryophyllus L.
NATeta

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31143号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 花弁の覆輪部の幅	01 無
53 花弁の条の多少	01 無
54 花弁の斑点の多少	01 無
55 花弁のぼかしの大きさ	03 中
56 花弁の基部斑の大きさ	01 無
57 花弁の三次色の模様	03 条、04 斑点
58 花弁の三次色	RHSカラーチャート 53D
59 子房の形	02 ひし形
60 子房の下部の色	01 白系
61 子房の表面	03 強い肋状
62 花柱の数	04 3～4本
63 花柱の長さ	02 中
64 花柱の肩の有無	09 有
65 柱頭の色	01 白
66 開花期	04 やや早
67 日持ち性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31144号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia milii Des Moul. BAO-CHAI

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BAO-CHAI」は、対照品種「Bao-Yu」と比較して、葉の表面の色がやや淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「エムEuis」と比較して、葉の長さが極長であること、苞花葉の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chien-Young Chu

155 5A, North Minseng Road, West District, 403 Taichung, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chien-Young Chu

7 出願公表の年月日 令和5年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Bao-Yu」の変異株である。

Euphorbia milii Des Moul.
BAO-CHAI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 株の幅	09 極広
03 側枝の有無	09 有
04 側枝の数	05 中
05 開花枝の向き	05 斜上
06 枝の太さ	04 やや細
07 茎のとげの着生状態	02 群生
08 茎のとげの長さ	03 短
09 葉の長さ	09 極長
10 葉の幅	05 中
11 葉の表面の色	04 やや淡緑
12 葉の裏面の色	03 淡緑
13 花柄の長さ	06 やや長
14 花柄の色	02 赤
15 花柄の緑色の濃淡	07 濃
16 花序の段数	01 1 段又は2段
17 苞花葉の重なりの有無	09 有

BAO-CHAI

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 1 4 4号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31145号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch NPCW22387

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NPCW22387」は、対照品種「EURZ0014」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「LAZZP01319」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Guido von Tubeuf

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「NPCW12197」に「LAZZP01319」を交配し、選抜したものである。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW22387

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	06 やや多
03 樹高	03 低
04 樹の幅	03 狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	08 かなり濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	01 緑のみ

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW22387

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31145号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	03 多
19 葉身の切れ込みの深さ	05 中
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	03 短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	03 淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	03 少
26 完全着色葉の数	03 少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	05 中
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	04 やや狭
32 最大ほうの形	02 楕円形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 4D

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW22387

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 2D
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	09 有
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	04 やや弱
49 集散花序の幅	04 やや狭
50 蜜腺の大きさ	04 やや小
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW22387

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 1 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31146号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch NPCW23396

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「NPCW23396」は、対照品種「PER1549」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が12Aであること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「EURZ0014」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クリスマス ビューティー ライム」と比較して、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Guido von Tubeuf

7 出願公表の年月日 令和6年4月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「NPCW14225」に「PER1409」を交配し、選抜したものである。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW23396

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	09 有
02 分枝の数	06 やや多
03 樹高	03 低
04 樹の幅	03 狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	03 切形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	06 やや濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	01 緑のみ

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW23396

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31146号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の切れ込みの数	02 中
19 葉身の切れ込みの深さ	04 やや浅
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
21 葉柄の長さ	03 短
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	03 淡
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
25 部分着色葉の数	04 やや少
26 完全着色葉の数	04 やや少
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱
29 ほうの数	05 中
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短
31 最大ほうの幅	05 中
32 最大ほうの形	01 卵形
33 ほうの表面の色数	01 1色
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 12A

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW23396

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 10A
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	09 有
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	05 中
49 集散花序の幅	04 やや狭
50 蜜腺の大きさ	06 やや大
51 蜜腺の色	01 黄

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
NPCW23396

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 1 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 蜜線の変形の有無 53 開花の早晩	01 無
	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31147号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. 香醇 (コウジュン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「香醇」は、対照品種「鳥取大山2001」と比較して、茎の節数が極多であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
佐藤友紀子
京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町78番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤友紀子

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「みずくぐり」に「Stress Land」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.
香醇

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
03 伸育型	04 無限
04 分枝の数	05 中
05 草姿	01 直立
06 茎の毛じの色	02 褐
07 茎の長さ	09 極長
08 茎の節数	09 極多
09 葉の表面の凹凸の強弱	04 やや弱
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	05 中
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	03 粗
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	03 淡

Glycine max (L.) Merr.
香醇

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	06 やや長
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	05 中
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	01 淡緑
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	01 極低
22 さやの数	04 やや少
23 裂きょうの難易	07 難
24 熟さやの色の濃淡	07 濃
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	07 大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	02 偏球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	02 黄
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	07 黒
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.
香醇

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	06 やや晩
36 成熟期	07 晩
37 生態型	
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

1 品種登録の番号及び年月日 第31148号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 嘉肴 (カウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「嘉肴」は、対照品種「香醇」と比較して、茎の長さが中であること、茎の節数がやや多であること、子実のへその色が暗褐であること等で区別性が認められる。対照品種「京白丹波」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）がやや大であること、子実のへその色が暗褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

斎藤嘉人
新潟県新潟市中央区米山3丁目1番60-705号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斎藤嘉人

7 出願公表の年月日 令和3年9月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「エンレイ」に「みずくぐり」を交配し、選抜したものである。

Glycine max (L.) Merr.

嘉肴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 分枝の数	04 やや少
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 白
07 茎の長さ	05 中
08 茎の節数	06 やや多
09 葉の表面の凹凸の強弱	04 やや弱
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	07 高
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	04 やや粗
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	03 淡

Glycine max (L.) Merr.

嘉肴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	07 長
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	07 広
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	01 淡緑
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	01 極低
22 さやの数	04 やや少
23 裂きょうの難易	07 難
24 熟さやの色の濃淡	06 やや濃
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	06 やや大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	02 偏球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	02 黄
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	05 暗褐
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

嘉肴

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	06 やや晩
36 成熟期	07 晩
37 生態型	
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

1 品種登録の番号及び年月日 第31149号 令和7年8月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KB-W5

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KB-W5」は、対照品種「ホクト白1号菌」と比較して、菌さんの直径がやや大であること、菌柄の形が太長であること等で区別性が認められる。対照品種「KB-W2」と比較して、菌さんの直径がやや大であること、菌さんの高さが極大であること、菌柄の最大径がかなり太であること等で区別性が認められる。対照品種「大木侍N-1」と比較して、菌さんの直径がやや大であること、菌柄の最大径がかなり太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 畑中智大

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有株に「KB-W2」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31149号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌叢表面の着色の有無	01 無
02 菌叢裏面の着色の有無	01 無
03 菌糸体の成長最適温度	04 23℃
04 菌糸体の温度別成長量 (10℃)	05 中
05 菌糸体の温度別成長量 (15℃)	06 やや速
06 菌糸体の温度別成長量 (20℃)	06 やや速
07 菌糸体の温度別成長量 (25℃)	04 やや遅
08 菌糸体の温度別成長量 (30℃)	03 遅
09 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
10 菌さんの直径	06 やや大
11 菌さんの高さ	09 極大
12 菌さんの直径／高さ	07 大
13 菌さんの中央部の色	01 白
14 菌さん周縁部の色	01 白
15 菌さん表面の斑紋の大きさ	02 中
16 菌さん表面の斑紋の分布	01 中央
17 菌さん表面の斑紋の明瞭度	01 不明瞭

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 1 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの硬さ	06 やや硬
19 ひだの並び方	01 直
20 ひだの密度	02 中
21 ひだの色	01 白
22 菌柄の形	04 太長
23 菌柄の長さ	03 短
24 菌さんの直径／菌柄の長さ	08 かなり大
25 菌柄の最大径	08 かなり太
26 菌柄の最大径／菌さん基部の菌柄径	04 やや小
27 菌柄の色	01 白
28 菌柄の毛羽の有無	09 有
29 菌柄の硬さ	07 硬
30 子実体の平均乾燥重量	03 軽
31 発生処理までの期間	06 やや長
32 菌掻きから子実体収穫までの期間	06 やや長