

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31150号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Lactuca sativa L. SAKLET015
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「SAKLET015」は、対照品種「SAKLET010」と比較して、球の大きさが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
田中康夫 西川盾士
- 7 出願公表の年月日 令和2年4月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有のサリナス系の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.  
SAKLET015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 種子の色                                                 | 03 茶       |
| 02 子葉の大きさ                                               | 06 やや大     |
| 03 子葉の形                                                 | 02 楕円形     |
| 04 株の幅                                                  | 05 中       |
| 05 株の葉上部の重なり                                            | 03 強       |
| 06 葉数                                                   |            |
| 07 葉の姿勢                                                 | 03 斜上      |
| 08 葉の裂片の数                                               | 01 無又は極少   |
| 09 葉の形                                                  | 03 扁円形     |
| 10 葉の形                                                  |            |
| 11 葉の先端部の形                                              | 03 円形      |
| 12 葉の縦断面                                                | 01 内曲      |
| 13 葉の裂片の幅                                               |            |
| 14 葉のアントシアニン着色                                          | 01 無又は極弱   |
| 15 葉のアントシアニンの色相                                         |            |
| 16 葉のアントシアニン着色の面積                                       |            |
| 17 葉の色                                                  | 01 緑       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 19 葉の光沢                                                 | 05 中       |
| 20 葉の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 21 葉の幅                                                  | 07 広       |
| 22 葉の厚さ                                                 | 02 薄       |
| 23 葉の凹凸                                                 | 03 弱       |
| 24 葉の凹凸の大きさ                                             | 05 中       |
| 25 葉の周縁部の波打ち                                            | 03 弱       |
| 26 葉の周縁部の切れ込みの型                                         | 03 不規則な歯状  |
| 27 葉の周縁部の切れ込みの深さ                                        | 04 やや浅     |
| 28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ                                      | 01 極浅      |
| 29 葉の周縁部の切れ込みの粗密                                        | 03 粗       |
| 30 葉脈の型                                                 | 03 扇状      |
| 31 球の大きさ                                                | 05 中       |
| 32 球の縦断面の形                                              | 04 扁円形     |
| 33 球のしまり                                                | 06 やや固い    |
| 34 芯の大きさ                                                | 03 中       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 茎の長さ                                                 |            |
| 36 茎の太さ                                                 |            |
| 37 茎の縦断面の形                                              |            |
| 38 茎の色                                                  |            |
| 39 茎の内部の色                                               |            |
| 40 収穫期                                                  | 05 中       |
| 41 抽だい始期                                                | 07 晩       |
| 42 腋芽の発生                                                | 01 無又は弱    |
| 43 帯化の発生                                                | 01 無又は極弱   |
| 44 ベと病レースB1:16EU抵抗性                                     |            |
| 45 ベと病レースB1:17EU抵抗性                                     |            |
| 46 ベと病レースB1:20EU抵抗性                                     |            |
| 47 ベと病レースB1:21EU抵抗性                                     |            |
| 48 ベと病レースB1:22EU抵抗性                                     |            |
| 49 ベと病レースB1:23EU抵抗性                                     |            |
| 50 ベと病レースB1:24EU抵抗性                                     |            |
| 51 ベと病レースB1:25EU抵抗性                                     |            |

Lactuca sativa L.  
SAKLET015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 ベと病レースB1:26EU抵抗性                                     |            |
| 53 ベと病レースB1:27EU抵抗性                                     |            |
| 54 ベと病レースB1:29EU抵抗性                                     |            |
| 55 ベと病レースB1:30EU抵抗性                                     |            |
| 56 ベと病レースB1:31EU抵抗性                                     |            |
| 57 ベと病レースB1:33EU抵抗性                                     |            |
| 58 ベと病レースB1:35EU抵抗性                                     |            |
| 59 レタスモザイクウイルス抵抗性                                       |            |
| 60 根腐病菌レース1抵抗性                                          |            |
| 61 根腐病菌レース2抵抗性                                          |            |
| 62 レタスビッグベイン病抵抗性                                        |            |
| 63 アブラムシ耐性                                              |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31151号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Lactuca sativa L. SAKLET017

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLET017」は、対照品種「SAKLET011」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さがやや浅であること、抽だい始期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
田中康夫 西川盾士

7 出願公表の年月日 令和2年4月2日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有のサリナス系の選抜系統に、出願者所有のサリナス系の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.  
SAKLET017

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 種子の色                                                 | 01 白       |
| 02 子葉の大きさ                                               | 05 中       |
| 03 子葉の形                                                 | 02 楕円形     |
| 04 株の幅                                                  | 05 中       |
| 05 株の葉上部の重なり                                            | 03 強       |
| 06 葉数                                                   |            |
| 07 葉の姿勢                                                 | 03 斜上      |
| 08 葉の裂片の数                                               | 01 無又は極少   |
| 09 葉の形                                                  | 03 扁円形     |
| 10 葉の形                                                  |            |
| 11 葉の先端部の形                                              | 03 円形      |
| 12 葉の縦断面                                                | 01 内曲      |
| 13 葉の裂片の幅                                               |            |
| 14 葉のアントシアニン着色                                          | 01 無又は極弱   |
| 15 葉のアントシアニンの色相                                         |            |
| 16 葉のアントシアニン着色の面積                                       |            |
| 17 葉の色                                                  | 01 緑       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET017

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 19 葉の光沢                                                 | 05 中       |
| 20 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 21 葉の幅                                                  | 07 広       |
| 22 葉の厚さ                                                 | 03 中       |
| 23 葉の凹凸                                                 | 04 やや弱     |
| 24 葉の凹凸の大きさ                                             | 05 中       |
| 25 葉の周縁部の波打ち                                            | 04 やや弱     |
| 26 葉の周縁部の切れ込みの型                                         | 03 不規則な歯状  |
| 27 葉の周縁部の切れ込みの深さ                                        | 04 やや浅     |
| 28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ                                      | 01 極浅      |
| 29 葉の周縁部の切れ込みの粗密                                        | 03 粗       |
| 30 葉脈の型                                                 | 03 扇状      |
| 31 球の大きさ                                                | 05 中       |
| 32 球の縦断面の形                                              | 04 扁円形     |
| 33 球のしまり                                                | 06 やや固い    |
| 34 芯の大きさ                                                | 03 中       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET017

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 茎の長さ                                                 |            |
| 36 茎の太さ                                                 |            |
| 37 茎の縦断面の形                                              |            |
| 38 茎の色                                                  |            |
| 39 茎の内部の色                                               |            |
| 40 収穫期                                                  | 05 中       |
| 41 抽だい始期                                                | 07 晩       |
| 42 腋芽の発生                                                | 01 無又は弱    |
| 43 帯化の発生                                                | 01 無又は極弱   |
| 44 ベと病レースB1:16EU抵抗性                                     |            |
| 45 ベと病レースB1:17EU抵抗性                                     |            |
| 46 ベと病レースB1:20EU抵抗性                                     |            |
| 47 ベと病レースB1:21EU抵抗性                                     |            |
| 48 ベと病レースB1:22EU抵抗性                                     |            |
| 49 ベと病レースB1:23EU抵抗性                                     |            |
| 50 ベと病レースB1:24EU抵抗性                                     |            |
| 51 ベと病レースB1:25EU抵抗性                                     |            |

Lactuca sativa L.  
SAKLET017

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 ベと病レースB1:26EU抵抗性                                     |            |
| 53 ベと病レースB1:27EU抵抗性                                     |            |
| 54 ベと病レースB1:29EU抵抗性                                     |            |
| 55 ベと病レースB1:30EU抵抗性                                     |            |
| 56 ベと病レースB1:31EU抵抗性                                     |            |
| 57 ベと病レースB1:33EU抵抗性                                     |            |
| 58 ベと病レースB1:35EU抵抗性                                     |            |
| 59 レタスモザイクウイルス抵抗性                                       |            |
| 60 根腐病菌レース1抵抗性                                          |            |
| 61 根腐病菌レース2抵抗性                                          |            |
| 62 レタスビッグベイン病抵抗性                                        |            |
| 63 アブラムシ耐性                                              |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31152号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET018

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLET018」は、対照品種「SAKLET011」と比較して、葉の周縁部の波打ちが弱であること、葉の周縁部の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKLET017」と比較して、葉の凹凸が弱であること、葉の凹凸の大きさがやや大であること、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 西川盾士

7 出願公表の年月日 令和2年4月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有のサリナス系の選抜系統に、出願者所有のサリナス系の育成系統を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.  
SAKLET018

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重            要            な            形            質   | 重要な形質に係る特性 |
| 01 種子の色                                                 | 01 白       |
| 02 子葉の大きさ                                               | 05 中       |
| 03 子葉の形                                                 | 02 楕円形     |
| 04 株の幅                                                  | 05 中       |
| 05 株の葉上部の重なり                                            | 03 強       |
| 06 葉数                                                   |            |
| 07 葉の姿勢                                                 | 03 斜上      |
| 08 葉の裂片の数                                               | 01 無又は極少   |
| 09 葉の形                                                  | 03 扁円形     |
| 10 葉の形                                                  |            |
| 11 葉の先端部の形                                              | 03 円形      |
| 12 葉の縦断面                                                | 01 内曲      |
| 13 葉の裂片の幅                                               |            |
| 14 葉のアントシアニン着色                                          | 01 無又は極弱   |
| 15 葉のアントシアニンの色相                                         |            |
| 16 葉のアントシアニン着色の面積                                       |            |
| 17 葉の色                                                  | 01 緑       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET018

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 19 葉の光沢                                                 | 05 中       |
| 20 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 21 葉の幅                                                  | 07 広       |
| 22 葉の厚さ                                                 | 03 中       |
| 23 葉の凹凸                                                 | 03 弱       |
| 24 葉の凹凸の大きさ                                             | 06 やや大     |
| 25 葉の周縁部の波打ち                                            | 03 弱       |
| 26 葉の周縁部の切れ込みの型                                         | 03 不規則な歯状  |
| 27 葉の周縁部の切れ込みの深さ                                        | 04 やや浅     |
| 28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ                                      | 01 極浅      |
| 29 葉の周縁部の切れ込みの粗密                                        | 03 粗       |
| 30 葉脈の型                                                 | 03 扇状      |
| 31 球の大きさ                                                | 05 中       |
| 32 球の縦断面の形                                              | 04 扁円形     |
| 33 球のしまり                                                | 05 中       |
| 34 芯の大きさ                                                | 03 中       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET018

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 茎の長さ                                                 |            |
| 36 茎の太さ                                                 |            |
| 37 茎の縦断面の形                                              |            |
| 38 茎の色                                                  |            |
| 39 茎の内部の色                                               |            |
| 40 収穫期                                                  | 05 中       |
| 41 抽だい始期                                                | 09 極晩      |
| 42 腋芽の発生                                                | 01 無又は弱    |
| 43 帯化の発生                                                | 01 無又は極弱   |
| 44 ベと病レースB1:16EU抵抗性                                     |            |
| 45 ベと病レースB1:17EU抵抗性                                     |            |
| 46 ベと病レースB1:20EU抵抗性                                     |            |
| 47 ベと病レースB1:21EU抵抗性                                     |            |
| 48 ベと病レースB1:22EU抵抗性                                     |            |
| 49 ベと病レースB1:23EU抵抗性                                     |            |
| 50 ベと病レースB1:24EU抵抗性                                     |            |
| 51 ベと病レースB1:25EU抵抗性                                     |            |

Lactuca sativa L.  
SAKLET018

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 ベと病レースB1:26EU抵抗性                                     |            |
| 53 ベと病レースB1:27EU抵抗性                                     |            |
| 54 ベと病レースB1:29EU抵抗性                                     |            |
| 55 ベと病レースB1:30EU抵抗性                                     |            |
| 56 ベと病レースB1:31EU抵抗性                                     |            |
| 57 ベと病レースB1:33EU抵抗性                                     |            |
| 58 ベと病レースB1:35EU抵抗性                                     |            |
| 59 レタスモザイクウイルス抵抗性                                       |            |
| 60 根腐病菌レース1抵抗性                                          |            |
| 61 根腐病菌レース2抵抗性                                          |            |
| 62 レタスビッグベイン病抵抗性                                        |            |
| 63 アブラムシ耐性                                              |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31153号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Lactuca sativa L. SAKLET019

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKLET019」は、対照品種「SAKLET013」と比較して、葉の凹凸がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKLET017」と比較して、葉の凹凸がやや強であること、球の縦断面の形が円形であること、抽だい始期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社サカタのタネ  
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
田中康夫 西川盾士

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.  
SAKLET019

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 種子の色                                                 | 01 白       |
| 02 子葉の大きさ                                               | 06 やや大     |
| 03 子葉の形                                                 | 02 楕円形     |
| 04 株の幅                                                  | 05 中       |
| 05 株の葉上部の重なり                                            | 03 強       |
| 06 葉数                                                   |            |
| 07 葉の姿勢                                                 | 03 斜上      |
| 08 葉の裂片の数                                               | 01 無又は極少   |
| 09 葉の形                                                  | 03 扁円形     |
| 10 葉の形                                                  |            |
| 11 葉の先端部の形                                              | 03 円形      |
| 12 葉の縦断面                                                | 01 内曲      |
| 13 葉の裂片の幅                                               |            |
| 14 葉のアントシアニン着色                                          | 01 無又は極弱   |
| 15 葉のアントシアニンの色相                                         |            |
| 16 葉のアントシアニン着色の面積                                       |            |
| 17 葉の色                                                  | 01 緑       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET019

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 19 葉の光沢                                                 | 05 中       |
| 20 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 21 葉の幅                                                  | 07 広       |
| 22 葉の厚さ                                                 | 03 中       |
| 23 葉の凹凸                                                 | 06 やや強     |
| 24 葉の凹凸の大きさ                                             | 04 やや小     |
| 25 葉の周縁部の波打ち                                            | 04 やや弱     |
| 26 葉の周縁部の切れ込みの型                                         | 03 不規則な歯状  |
| 27 葉の周縁部の切れ込みの深さ                                        | 05 中       |
| 28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ                                      | 01 極浅      |
| 29 葉の周縁部の切れ込みの粗密                                        | 03 粗       |
| 30 葉脈の型                                                 | 03 扇状      |
| 31 球の大きさ                                                | 05 中       |
| 32 球の縦断面の形                                              | 03 円形      |
| 33 球のしまり                                                | 08 かなり固い   |
| 34 芯の大きさ                                                | 03 中       |

Lactuca sativa L.  
SAKLET019

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 茎の長さ                                                 |            |
| 36 茎の太さ                                                 |            |
| 37 茎の縦断面の形                                              |            |
| 38 茎の色                                                  |            |
| 39 茎の内部の色                                               |            |
| 40 収穫期                                                  | 05 中       |
| 41 抽だい始期                                                | 08 かなり晩    |
| 42 腋芽の発生                                                | 01 無又は弱    |
| 43 帯化の発生                                                | 01 無又は極弱   |
| 44 べと病レースB1:16EU抵抗性                                     |            |
| 45 べと病レースB1:17EU抵抗性                                     |            |
| 46 べと病レースB1:20EU抵抗性                                     |            |
| 47 べと病レースB1:21EU抵抗性                                     |            |
| 48 べと病レースB1:22EU抵抗性                                     |            |
| 49 べと病レースB1:23EU抵抗性                                     |            |
| 50 べと病レースB1:24EU抵抗性                                     |            |
| 51 べと病レースB1:25EU抵抗性                                     |            |

Lactuca sativa L.  
SAKLET019

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 ベと病レースB1:26EU抵抗性                                     |            |
| 53 ベと病レースB1:27EU抵抗性                                     |            |
| 54 ベと病レースB1:29EU抵抗性                                     |            |
| 55 ベと病レースB1:30EU抵抗性                                     |            |
| 56 ベと病レースB1:31EU抵抗性                                     |            |
| 57 ベと病レースB1:33EU抵抗性                                     |            |
| 58 ベと病レースB1:35EU抵抗性                                     |            |
| 59 レタスモザイクウイルス抵抗性                                       |            |
| 60 根腐病菌レース1抵抗性                                          |            |
| 61 根腐病菌レース2抵抗性                                          |            |
| 62 レタスビッグベイン病抵抗性                                        |            |
| 63 アブラムシ耐性                                              |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31154号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. ブルーキャッスル (ブルーキャッスル)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ブルーキャッスル」は、対照品種「富良野3号」と比較して、がくの毛の粗密が中であること、花冠の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。対照品種「スーパー」と比較して、花茎の長さがやや短であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

学校法人名城大学  
愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

津呂正人 南山泰宏

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.  
ブルーキャッスル

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31154号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 樹姿                                                                     | 02 叢生      |
| 02 株の大きさ                                                                  | 05 中       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                                                | 05 中       |
| 04 葉の灰色の強弱                                                                | 05 中       |
| 05 花茎の伸長方向                                                                | 01 直立      |
| 06 株の枝の粗密                                                                 | 05 中       |
| 07 葉の長さ                                                                   | 04 やや短     |
| 08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）                                                | 04 やや狭     |
| 09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）                                                |            |
| 10 葉の周縁の切れ込み                                                              | 01 無       |
| 11 葉の斑の有無                                                                 | 01 無       |
| 12 葉の斑の分布                                                                 |            |
| 13 葉の斑の色                                                                  |            |
| 14 花茎の長さ                                                                  | 04 やや短     |
| 15 花茎の太さ                                                                  | 03 細       |
| 16 花茎の緑色の濃淡                                                               | 03 淡       |
| 17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）                                               | 05 中       |

Lavandula L.  
ブルーキャッスル

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31154号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）                     |            |
| 19 花茎の分枝の有無                                                  | 01 無       |
| 20 花茎の分枝数                                                    |            |
| 21 花茎の最長分枝の長さ                                                |            |
| 22 花穂の最大幅                                                    | 04 やや狭     |
| 23 花穂の長さ                                                     | 04 やや短     |
| 24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）                             | 03 短       |
| 25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）                                 | 04 やや少     |
| 26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）                                | 03 短       |
| 27 花穂の形                                                      | 04 円筒形     |
| 28 花穂の花の数                                                    | 04 やや少     |
| 29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）                             | 05 中       |
| 30 ほう葉の幅                                                     | 05 中       |
| 31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）                       |            |
| 32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）                                   | 02 常に有     |
| 33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）                                   | 03 短       |
| 34 先端ほう葉の有無                                                  | 01 無       |

Lavandula L.  
ブルーキャッスル

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31154号</div> |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性        |
| 35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）                                   |                   |
| 36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）                                    |                   |
| 37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）                                  |                   |
| 38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）                            |                   |
| 39 がくの色                                                      | 02 紫              |
| 40 がくの毛の粗密                                                   | 05 中              |
| 41 花冠の色数                                                     | 02 2色以上           |
| 42 花冠の主な色                                                    | RHSカラーチャート 92B    |
| 43 花冠の二次色                                                    | RHSカラーチャート NN155C |
| 44 花冠の二次色の分布                                                 | 04 基部             |
| 45 開花始期                                                      | 04 やや早            |
|                                                              |                   |
|                                                              |                   |
|                                                              |                   |
|                                                              |                   |
|                                                              |                   |
|                                                              |                   |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31155号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Lavandula L. LAVVAL
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「LAVVAL」は、対照品種「LABLUSA」と比較して、花冠の主な色が93Bである  
こと等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
Valerie Pouillart  
62, Rue Georges Clemenceau, 45500 Gien, France
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
Valerie Pouillart
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.  
LAVVAL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 樹姿                                                   | 03 球形      |
| 02 株の大きさ                                                | 05 中       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉の灰色の強弱                                              | 05 中       |
| 05 花茎の伸長方向                                              | 02 斜上      |
| 06 株の枝の粗密                                               | 06 やや密     |
| 07 葉の長さ                                                 | 03 短       |
| 08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）                              | 04 やや狭     |
| 09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）                              |            |
| 10 葉の周縁の切れ込み                                            | 01 無       |
| 11 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 12 葉の斑の分布                                               |            |
| 13 葉の斑の色                                                |            |
| 14 花茎の長さ                                                | 04 やや短     |
| 15 花茎の太さ                                                | 03 細       |
| 16 花茎の緑色の濃淡                                             | 03 淡       |
| 17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）                             | 05 中       |

Lavandula L.  
LAVVAL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花茎の毛の粗密 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)               |            |
| 19 花茎の分枝の有無                                             | 01 無       |
| 20 花茎の分枝数                                               |            |
| 21 花茎の最長分枝の長さ                                           |            |
| 22 花穂の最大幅                                               | 04 やや狭     |
| 23 花穂の長さ                                                | 03 短       |
| 24 花穂の第二輪生花からの長さ (Lavandula節に限る。)                       | 03 短       |
| 25 花穂の輪生花の段数 (Lavandula節に限る。)                           | 04 やや少     |
| 26 花穂の輪生花間の距離 (Lavandula節に限る。)                          | 02 かなり短    |
| 27 花穂の形                                                 | 04 円筒形     |
| 28 花穂の花の数                                               | 03 少       |
| 29 花穂の最上位輪生花の花の数 (Lavandula節に限る。)                       | 04 やや少     |
| 30 ほう葉の幅                                                | 05 中       |
| 31 ほう葉の色 (Stoechas及びPterostoechas節に限る。)                 |            |
| 32 小ほう葉の有無 (Lavandula節に限る。)                             | 02 常に有     |
| 33 小ほう葉の長さ (Lavandula節に限る。)                             | 03 短       |
| 34 先端ほう葉の有無                                             | 01 無       |

Lavandula L.  
LAVVAL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 5 号 |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性     |
| 35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）                              |                |
| 36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）                               |                |
| 37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）                             |                |
| 38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）                       |                |
| 39 がくの色                                                 | 02 紫           |
| 40 がくの毛の粗密                                              | 07 密           |
| 41 花冠の色数                                                | 01 1色          |
| 42 花冠の主な色                                               | RHSカラーチャート 93B |
| 43 花冠の二次色                                               |                |
| 44 花冠の二次色の分布                                            |                |
| 45 開花始期                                                 | 04 やや早         |
|                                                         |                |
|                                                         |                |
|                                                         |                |
|                                                         |                |
|                                                         |                |
|                                                         |                |
|                                                         |                |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31156号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Lavandula L. Anouk Deluxe 1225
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「Anouk Deluxe 1225」は、対照品種「LABZ0004」と比較して、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）がN80Aであること等で区別性が認められる。対照品種「南の輝き」と比較して、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）がN80Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
L. Koning Beheer B.V.  
Lietsweg 4, 9364TB Nuis, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
Lammert Koning
- 7 出願公表の年月日 令和4年7月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「Anouk」の自然交雑実生から選抜したものである。

Lavandula L.  
Anouk Deluxe 1225

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 樹姿                                                   | 03 球形      |
| 02 株の大きさ                                                | 05 中       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉の灰色の強弱                                              | 03 弱       |
| 05 花茎の伸長方向                                              | 02 斜上      |
| 06 株の枝の粗密                                               | 06 やや密     |
| 07 葉の長さ                                                 | 02 かなり短    |
| 08 葉の幅（Pterostoechas節を除く。）                              | 03 狭       |
| 09 葉の幅（Pterostoechas節に限る。）                              |            |
| 10 葉の周縁の切れ込み                                            | 01 無       |
| 11 葉の斑の有無                                               | 01 無       |
| 12 葉の斑の分布                                               |            |
| 13 葉の斑の色                                                |            |
| 14 花茎の長さ                                                | 01 極短      |
| 15 花茎の太さ                                                | 02 かなり細    |
| 16 花茎の緑色の濃淡                                             | 02 かなり淡    |
| 17 花茎の基部の強さ（Lavandula節に限る。）                             |            |

Lavandula L.  
Anouk Deluxe 1225

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花茎の毛の粗密（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）                | 06 やや密     |
| 19 花茎の分枝の有無                                             | 09 有       |
| 20 花茎の分枝数                                               | 03 少       |
| 21 花茎の最長分枝の長さ                                           | 03 短       |
| 22 花穂の最大幅                                               | 02 かなり狭    |
| 23 花穂の長さ                                                | 02 かなり短    |
| 24 花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）                        |            |
| 25 花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）                            |            |
| 26 花穂の輪生花間の距離（Lavandula節に限る。）                           |            |
| 27 花穂の形                                                 | 04 円筒形     |
| 28 花穂の花の数                                               | 04 やや少     |
| 29 花穂の最上位輪生花の花の数（Lavandula節に限る。）                        |            |
| 30 ほう葉の幅                                                | 08 かなり広    |
| 31 ほう葉の色（Stoechas及びPterostoechas節に限る。）                  | 04 赤紫      |
| 32 小ほう葉の有無（Lavandula節に限る。）                              |            |
| 33 小ほう葉の長さ（Lavandula節に限る。）                              |            |
| 34 先端ほう葉の有無                                             | 09 有       |

Lavandula L.  
Anouk Deluxe 1225

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 6 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 35 先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る。）                              | 03 短            |
| 36 先端ほう葉の形（Stoechas節に限る。）                               | 03 長楕円形         |
| 37 先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る。）                             | RHSカラーチャート N80A |
| 38 先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る。）                       | 05 中            |
| 39 がくの色                                                 | 01 緑            |
| 40 がくの毛の粗密                                              | 05 中            |
| 41 花冠の色数                                                | 01 1色           |
| 42 花冠の主な色                                               | RHSカラーチャート N92C |
| 43 花冠の二次色                                               |                 |
| 44 花冠の二次色の分布                                            |                 |
| 45 開花始期                                                 | 04 やや早          |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |
|                                                         |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31157号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler QH147

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「QH147」は、対照品種「CA901」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、菌さんの直径／厚さがやや大であること、菌柄の太さがかなり太であること等で区別性が認められる。対照品種「XYAB56」と比較して、菌さんの大きさがやや大であること、菌柄の長さがやや長であること、子実体の平均乾燥重量がやや軽であること等で区別性が認められる。対照品種「七河2号」と比較して、菌さんの縦断面形が平形であること、菌さんの大きさがやや大であること、菌柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「HS73」と比較して、ひだの並び方がちぢれであること、ひだの幅がかなり狭であること、菌柄の太さがかなり太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Shandong Qihe Biotechnology Co., Ltd.

No.496, Songling West Road, Zichuan Economic Development Zone, Zibo City,  
Shandong Province, China

6 登録品種の育成をした者の氏名

LI JIE ZHANG ZHENYU ZHANG LUJUN LIU QING HAO YUQING WANG CHEN

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「七河2号」と「申香215」の一核菌糸どうしを交配し、得られた二核菌糸から選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler  
QH147

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31157号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 01 菌糸密度                                                                   | 05 中       |
| 02 菌叢表面の着色の有無                                                             | 09 有       |
| 03 菌糸体の生長最適温度                                                             | 03 中       |
| 04 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)                                                  | 03 中       |
| 05 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)                                                  | 04 速       |
| 06 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)                                                  | 03 中       |
| 07 菌糸体の温度別生長速度 (25℃/日)                                                    | 03 中       |
| 08 菌糸体の温度別生長速度 (30℃/日)                                                    | 04 速       |
| 09 菌さんの縦断面形                                                               | 02 平形      |
| 10 菌さんの大きさ                                                                | 06 やや大     |
| 11 菌さん表面の地色                                                               | 03 褐色      |
| 12 菌さんの厚さ                                                                 | 04 やや薄     |
| 13 菌さんの直径／厚さ                                                              | 06 やや大     |
| 14 菌さんの硬さ                                                                 | 02 中       |
| 15 りん皮の付着部位                                                               | 02 周縁      |
| 16 りん皮の大きさ                                                                | 01 無又は小    |
| 17 りん皮の着色の有無                                                              | 09 有       |

Lentinula edodes (Berk.) Pegler  
QH147

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31157号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 18 ひだの有無                                                     | 09 有       |
| 19 ひだの形                                                      | 01 離柄形     |
| 20 ひだの並び方                                                    | 02 ちぢれ     |
| 21 ひだのちぢれ割合（率）                                               | 05 極多      |
| 22 ひだの幅                                                      | 02 かなり狭    |
| 23 ひだの密度                                                     | 03 密       |
| 24 ひだの色                                                      | 03 淡黄橙色    |
| 25 菌柄の形                                                      | 02 円柱      |
| 26 菌柄の長さ                                                     | 06 やや長     |
| 27 菌柄の太さ                                                     | 08 かなり太    |
| 28 菌柄の表面の着色の有無                                               | 09 有       |
| 29 菌柄の毛羽の密度                                                  | 03 密       |
| 30 菌柄の毛羽の着色の有無                                               | 09 有       |
| 31 菌柄の硬さ                                                     | 03 中       |
| 32 菌柄の色                                                      | 02 淡橙色     |
| 33 菌さん直径の菌柄の長さに対する比                                          | 05 中       |
| 34 子実体の平均乾燥重量                                                | 04 やや軽     |

Lentinula edodes (Berk.) Pegler  
QH147

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 発生処理までの期間<br><br>36 発生処理から収穫最盛期までの期間                 | 06 やや長     |
|                                                         | 03 短       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31158号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. TSユウカラブルー (TSユウカラブルー)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「TSユウカラブルー」は、対照品種「ミヨラスアメジスト」と比較して、花茎の色が濃緑であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名  
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和3年6月15日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
TSユウカラブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31158号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                        | 06 やや高     |
| 02 花序の数                                                      | 05 中       |
| 03 葉の長さ                                                      | 05 中       |
| 04 葉の幅                                                       | 04 やや狭     |
| 05 葉身の形                                                      | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                                   | 06 やや濃     |
| 07 葉の光沢の強弱                                                   | 06 やや強     |
| 08 葉の毛の有無                                                    | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                                 | 03 粗       |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                                 | 03 粗       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                               | 04 やや弱     |
| 12 葉の切れ込みの有無                                                 | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                                 | 06 やや強     |
| 14 葉柄の有無                                                     | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                     | 04 やや短     |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                           | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                                    | 01 無       |

Limonium Mill.  
TSユウカラブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31158号</div> |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                    | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花茎の長さ                                                     | 07 長            |
| 19 花茎の太さ                                                     | 04 やや細          |
| 20 花茎の毛の密度                                                   | 03 粗            |
| 21 花茎の色                                                      | 03 濃緑           |
| 22 花茎の翼の幅                                                    | 03 狭            |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱                                               | 04 やや弱          |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ                                              | 03 短            |
| 25 花序の型                                                      | 02 II型          |
| 26 一次分枝の長さ                                                   | 05 中            |
| 27 花序の分枝性                                                    | 04 やや弱          |
| 28 分枝の方向                                                     | 01 直立           |
| 29 花序の花数                                                     | 05 中            |
| 30 がくの長さ                                                     | 05 中            |
| 31 がくの直径                                                     | 05 中            |
| 32 がくの形                                                      | 02 漏斗形          |
| 33 がくの主な色                                                    | RHSカラーチャート N89D |
| 34 がくの中肋の色                                                   | RHSカラーチャート N88D |

Limonium Mill.  
TSユウカラブルー

| 登録番号<br>第 3 1 1 5 8 号                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部                                                                                                |                   |
| 重<br>要<br>な<br>形<br>質                                                                                         | 重要な形質に係る特性        |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 05 中              |
|                                                                                                               | 01 I 型            |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート NN155B |
|                                                                                                               | 02 同位             |
|                                                                                                               | 02 乳頭状            |
|                                                                                                               | 01 無              |
|                                                                                                               | 01 極早             |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31159号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. フレンチブルー（フレンチブルー）
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「フレンチブルー」は、対照品種「FB1524」と比較して、葉の切れ込みの強弱が中であること、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーインパルス」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱が中であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
進藤俊英
- 7 出願公表の年月日 令和3年3月4日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「フレンチバイオレット」の変異株である。

Limonium Mill.  
フレンチブルー

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                   | 06 やや高     |
| 02 花序の数                                                 | 05 中       |
| 03 葉の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 04 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                 | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 07 葉の光沢の強弱                                              | 06 やや強     |
| 08 葉の毛の有無                                               | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                            | 02 かなり粗    |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                            | 05 中       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                          | 04 やや弱     |
| 12 葉の切れ込みの有無                                            | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                            | 05 中       |
| 14 葉柄の有無                                                | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                | 06 やや長     |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                      | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                               | 09 有       |

Limonium Mill.  
フレンチブルー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31159号</div> |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花茎の長さ                                                     | 07 長            |
| 19 花茎の太さ                                                     | 05 中            |
| 20 花茎の毛の密度                                                   | 05 中            |
| 21 花茎の色                                                      | 03 濃緑           |
| 22 花茎の翼の幅                                                    | 04 やや狭          |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱                                               | 05 中            |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ                                              | 07 長            |
| 25 花序の型                                                      | 02 II型          |
| 26 一次分枝の長さ                                                   | 05 中            |
| 27 花序の分枝性                                                    | 05 中            |
| 28 分枝の方向                                                     | 01 直立           |
| 29 花序の花数                                                     | 05 中            |
| 30 がくの長さ                                                     | 06 やや長          |
| 31 がくの直径                                                     | 06 やや大          |
| 32 がくの形                                                      | 02 漏斗形          |
| 33 がくの主な色                                                    | RHSカラーチャート N82A |
| 34 がくの中肋の色                                                   | RHSカラーチャート N82D |

Limonium Mill.  
フレンチブルー

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 5 9 号                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                     | 重要な形質に係る特性        |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 05 中              |
|                                                                                                               | 01 I 型            |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート NN155B |
|                                                                                                               | 03 下位             |
|                                                                                                               | 02 乳頭状            |
|                                                                                                               | 01 無              |
|                                                                                                               | 01 極早             |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31160号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. ピンクスパークル (ピンクスパークル)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ピンクスパークル」は、対照品種「KP1415」と比較して、がくの主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アテナピンク」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
ティー・エス・メリクロン株式会社  
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名  
進藤俊英

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
ピンクスパークル

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31160号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                        | 05 中       |
| 02 花序の数                                                      | 07 多       |
| 03 葉の長さ                                                      | 04 やや短     |
| 04 葉の幅                                                       | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                      | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                                   | 05 中       |
| 07 葉の光沢の強弱                                                   | 05 中       |
| 08 葉の毛の有無                                                    | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                                 | 03 粗       |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                                 | 03 粗       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                               | 04 やや弱     |
| 12 葉の切れ込みの有無                                                 | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                                 | 06 やや強     |
| 14 葉柄の有無                                                     | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                     | 04 やや短     |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                           | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                                    | 01 無       |

Limonium Mill.  
ピンクスパークル

| 登録品種の植物体の特性記録部  |                   | 登録番号    |
|-----------------|-------------------|---------|
|                 |                   | 第31160号 |
| 重　　要　　な　　形　　質   | 重要な形質に係る特性        |         |
| 18 花茎の長さ        | 06                | やや長     |
| 19 花茎の太さ        | 05                | 中       |
| 20 花茎の毛の密度      | 05                | 中       |
| 21 花茎の色         | 03                | 濃緑      |
| 22 花茎の翼の幅       | 02                | かなり狭    |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱  | 02                | かなり弱    |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ | 03                | 短       |
| 25 花序の型         | 02                | Ⅱ型      |
| 26 一次分枝の長さ      | 04                | やや短     |
| 27 花序の分枝性       | 05                | 中       |
| 28 分枝の方向        | 01                | 直立      |
| 29 花序の花数        | 05                | 中       |
| 30 がくの長さ        | 06                | やや長     |
| 31 がくの直径        | 06                | やや大     |
| 32 がくの形         | 02                | 漏斗形     |
| 33 がくの主な色       | RHSカラーチャート 75A    |         |
| 34 がくの中肋の色      | RHSカラーチャート NN155A |         |

Limonium Mill.  
ピンクスパークル

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31160号</div>                                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                     | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 04 やや小          |
|                                                                                                               | 02 II型          |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート 155D |
|                                                                                                               | 03 下位           |
|                                                                                                               | 01 トウモロコシ状      |
|                                                                                                               | 01 無            |
|                                                                                                               | 01 極早           |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31161号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. MYLIM014

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYLIM014」は、対照品種「エターナルピンク」と比較して、花序の数が多い  
であること、葉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種  
「TSオーキッドフレール」と比較して、葉の切れ込みの強弱が強であること、花茎の翼  
の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
齋藤卓也 宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
MYLIM014

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                   | 04 やや低     |
| 02 花序の数                                                 | 07 多       |
| 03 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                 | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 07 葉の光沢の強弱                                              | 05 中       |
| 08 葉の毛の有無                                               | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                            | 02 かなり粗    |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                            | 03 粗       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                          | 03 弱       |
| 12 葉の切れ込みの有無                                            | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                            | 07 強       |
| 14 葉柄の有無                                                | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                | 03 短       |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                      | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                               | 01 無       |

Limonium Mill.  
MYLIM014

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 1 号 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性        |
| 18 花茎の長さ                                                | 05 中              |
| 19 花茎の太さ                                                | 05 中              |
| 20 花茎の毛の密度                                              | 04 やや粗            |
| 21 花茎の色                                                 | 03 濃緑             |
| 22 花茎の翼の幅                                               | 02 かなり狭           |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱                                          | 02 かなり弱           |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ                                         | 03 短              |
| 25 花序の型                                                 | 02 II型            |
| 26 一次分枝の長さ                                              | 04 やや短            |
| 27 花序の分枝性                                               | 04 やや弱            |
| 28 分枝の方向                                                | 01 直立             |
| 29 花序の花数                                                | 04 やや少            |
| 30 がくの長さ                                                | 05 中              |
| 31 がくの直径                                                | 05 中              |
| 32 がくの形                                                 | 02 漏斗形            |
| 33 がくの主な色                                               | RHSカラーチャート 72C    |
| 34 がくの中肋の色                                              | RHSカラーチャート NN155D |

Limonium Mill.  
MYLIM014

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 1 号                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                     | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 05 中            |
|                                                                                                               | 02 II型          |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート 155D |
|                                                                                                               | 03 下位           |
|                                                                                                               | 01 トウモロコシ状      |
|                                                                                                               | 01 無            |
|                                                                                                               | 01 極早           |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31162号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. ルミナスピンク (ルミナスピンク)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ルミナスピンク」は、対照品種「TSスプラッシュピンク」と比較して、葉の長さがやや短であること、がくの主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ミョアスピンク」と比較して、花序の花数の中であること、がくの主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
住化農業資材株式会社  
大阪府大阪市中心区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
可児隆裕

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
ルミナスピンク

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31162号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                        | 05 中       |
| 02 花序の数                                                      | 05 中       |
| 03 葉の長さ                                                      | 04 やや短     |
| 04 葉の幅                                                       | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                      | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                                   | 04 やや淡     |
| 07 葉の光沢の強弱                                                   | 05 中       |
| 08 葉の毛の有無                                                    | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                                 | 02 かなり粗    |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                                 | 02 かなり粗    |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                               | 03 弱       |
| 12 葉の切れ込みの有無                                                 | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                                 | 06 やや強     |
| 14 葉柄の有無                                                     | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                     | 04 やや短     |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                           | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                                    | 01 無       |

Limonium Mill.  
ルミナスピンク

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31162号</div> |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性        |
| 18 花茎の長さ                                                     | 05 中              |
| 19 花茎の太さ                                                     | 05 中              |
| 20 花茎の毛の密度                                                   | 02 かなり粗           |
| 21 花茎の色                                                      | 02 緑              |
| 22 花茎の翼の幅                                                    | 03 狭              |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱                                               | 01 無又は極弱          |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ                                              | 03 短              |
| 25 花序の型                                                      | 02 II型            |
| 26 一次分枝の長さ                                                   | 04 やや短            |
| 27 花序の分枝性                                                    | 04 やや弱            |
| 28 分枝の方向                                                     | 01 直立             |
| 29 花序の花数                                                     | 05 中              |
| 30 がくの長さ                                                     | 04 やや短            |
| 31 がくの直径                                                     | 06 やや大            |
| 32 がくの形                                                      | 02 漏斗形            |
| 33 がくの主な色                                                    | RHSカラーチャート 68B    |
| 34 がくの中肋の色                                                   | RHSカラーチャート NN155C |

Limonium Mill.  
ルミナスピンク

| 登録番号<br>第 3 1 1 6 2 号                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 登録品種の植物体の特性記録部                                                                                                |                   |
| 重<br>要<br>な<br>形<br>質                                                                                         | 重要な形質に係る特性        |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 05 中              |
|                                                                                                               | 01 I 型            |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート NN155A |
|                                                                                                               | 02 同位             |
|                                                                                                               | 01 トウモロコシ状        |
|                                                                                                               | 01 無              |
|                                                                                                               | 01 極早             |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |
|                                                                                                               |                   |

1 品種登録の番号及び年月日 第31163号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. エーデルラベンダー (エーデルハベンダー)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「エーデルラベンダー」は、対照品種「TSバイオレットブルー」と比較して、葉の切れ込みの強弱が中であること、花茎の翼の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「紀州ファインブルー」と比較して、花茎の翼の波打ちの強弱がやや弱であること、がくの主な色が85Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
住化農業資材株式会社  
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
可児隆裕

7 出願公表の年月日 令和3年11月22日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
エーデルラベンダー

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31163号</div> |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                        | 05 中       |
| 02 花序の数                                                      | 06 やや多     |
| 03 葉の長さ                                                      | 05 中       |
| 04 葉の幅                                                       | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                      | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                                   | 05 中       |
| 07 葉の光沢の強弱                                                   | 05 中       |
| 08 葉の毛の有無                                                    | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                                 | 02 かなり粗    |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                                 | 03 粗       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                               | 05 中       |
| 12 葉の切れ込みの有無                                                 | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                                 | 05 中       |
| 14 葉柄の有無                                                     | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                     | 06 やや長     |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                           | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                                    | 01 無       |

Limonium Mill.  
エーデルラベンダー

| 登録品種の植物体の特性記録部  |                | 登録番号    |
|-----------------|----------------|---------|
| 重要な形質           |                | 第31163号 |
| 18 花茎の長さ        | 06 やや長         |         |
| 19 花茎の太さ        | 05 中           |         |
| 20 花茎の毛の密度      | 05 中           |         |
| 21 花茎の色         | 02 緑           |         |
| 22 花茎の翼の幅       | 03 狭           |         |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱  | 04 やや弱         |         |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ | 04 やや短         |         |
| 25 花序の型         | 02 II型         |         |
| 26 一次分枝の長さ      | 05 中           |         |
| 27 花序の分枝性       | 04 やや弱         |         |
| 28 分枝の方向        | 01 直立          |         |
| 29 花序の花数        | 05 中           |         |
| 30 がくの長さ        | 05 中           |         |
| 31 がくの直径        | 05 中           |         |
| 32 がくの形         | 02 漏斗形         |         |
| 33 がくの主な色       | RHSカラーチャート 85A |         |
| 34 がくの中肋の色      | RHSカラーチャート 85D |         |

Limonium Mill.  
エーデルラベンダー

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31163号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31164号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. MYLIM015

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MYLIM015」は、対照品種「アルテミスピンク」と比較して、花序の数がかなり多であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「TSオーキッドフレール」と比較して、葉の切れ込みの強弱が強であること、花茎の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤卓也 宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
MYLIM015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                   | 05 中       |
| 02 花序の数                                                 | 08 かなり多    |
| 03 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 05 葉身の形                                                 | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 07 葉の光沢の強弱                                              | 05 中       |
| 08 葉の毛の有無                                               | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                            | 02 かなり粗    |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                            | 02 かなり粗    |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                          | 03 弱       |
| 12 葉の切れ込みの有無                                            | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                            | 07 強       |
| 14 葉柄の有無                                                | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                | 05 中       |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                      | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                               | 01 無       |

Limonium Mill.  
MYLIM015

| 登録品種の植物体の特性記録部  |                 | 登録番号    |
|-----------------|-----------------|---------|
| 重要な形質           |                 | 第31164号 |
| 18 花茎の長さ        | 05 中            |         |
|                 | 05 中            |         |
|                 | 02 かなり粗         |         |
|                 | 03 濃緑           |         |
|                 | 03 狭            |         |
|                 | 03 弱            |         |
|                 | 03 短            |         |
|                 | 02 II型          |         |
|                 | 04 やや短          |         |
|                 | 03 弱            |         |
|                 | 01 直立           |         |
|                 | 04 やや少          |         |
|                 | 04 やや短          |         |
|                 | 06 やや大          |         |
|                 | 02 漏斗形          |         |
|                 | RHSカラーチャート N74C |         |
| 19 花茎の太さ        |                 |         |
| 20 花茎の毛の密度      |                 |         |
| 21 花茎の色         |                 |         |
| 22 花茎の翼の幅       |                 |         |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱  |                 |         |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ |                 |         |
| 25 花序の型         |                 |         |
| 26 一次分枝の長さ      |                 |         |
| 27 花序の分枝性       |                 |         |
| 28 分枝の方向        |                 |         |
| 29 花序の花数        |                 |         |
| 30 がくの長さ        |                 |         |
| 31 がくの直径        |                 |         |
| 32 がくの形         |                 |         |
| 33 がくの主な色       |                 |         |
| 34 がくの中肋の色      |                 |         |

Limonium Mill.  
MYLIM015

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 4 号                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                     | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 05 中            |
|                                                                                                               | 02 II型          |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート 155B |
|                                                                                                               | 03 下位           |
|                                                                                                               | 01 トウモロコシ状      |
|                                                                                                               | 01 無            |
|                                                                                                               | 01 極早           |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31165号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Limonium Mill. MYLIM016

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYLIM016」は、対照品種「紀州ファインバイオレット」と比較して、花茎の毛の密度がやや密であること、がくの主な色がN87Cであること、がくの中肋の色が85Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ミヨシ  
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
齋藤卓也 宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Limonium Mill.  
MYLIM016

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草丈                                                   | 05 中       |
| 02 花序の数                                                 | 09 極多      |
| 03 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 04 葉の幅                                                  | 05 中       |
| 05 葉身の形                                                 | 03 狭倒卵形    |
| 06 葉の緑色の濃淡                                              | 04 やや淡     |
| 07 葉の光沢の強弱                                              | 03 弱       |
| 08 葉の毛の有無                                               | 09 有       |
| 09 葉の表面の毛の密度                                            | 03 粗       |
| 10 葉の周縁の毛の密度                                            | 03 粗       |
| 11 葉の周縁の波打ちの強弱                                          | 03 弱       |
| 12 葉の切れ込みの有無                                            | 09 有       |
| 13 葉の切れ込みの強弱                                            | 05 中       |
| 14 葉柄の有無                                                | 09 有       |
| 15 葉柄の長さ                                                | 05 中       |
| 16 葉柄のアントシアニン着色の強弱                                      | 01 無又は極弱   |
| 17 茎出葉の有無                                               | 01 無       |

Limonium Mill.  
MYLIM016

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 5 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 花茎の長さ                                                | 05 中            |
| 19 花茎の太さ                                                | 04 やや細          |
| 20 花茎の毛の密度                                              | 06 やや密          |
| 21 花茎の色                                                 | 03 濃緑           |
| 22 花茎の翼の幅                                               | 03 狭            |
| 23 花茎の翼の波打ちの強弱                                          | 03 弱            |
| 24 一次分枝部のたく葉の長さ                                         | 04 やや短          |
| 25 花序の型                                                 | 02 II型          |
| 26 一次分枝の長さ                                              | 03 短            |
| 27 花序の分枝性                                               | 03 弱            |
| 28 分枝の方向                                                | 01 直立           |
| 29 花序の花数                                                | 04 やや少          |
| 30 がくの長さ                                                | 05 中            |
| 31 がくの直径                                                | 04 やや小          |
| 32 がくの形                                                 | 02 漏斗形          |
| 33 がくの主な色                                               | RHSカラーチャート N87C |
| 34 がくの中肋の色                                              | RHSカラーチャート 85D  |

Limonium Mill.  
MYLIM016

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 5 号                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                     | 重要な形質に係る特性      |
| 35 花冠の大きさ<br><br>36 花冠の型<br><br>37 花冠の色<br><br>38 やくに対する柱頭の位置<br><br>39 柱頭の形<br><br>40 花の香りの有無<br><br>41 開花始期 | 04 やや小          |
|                                                                                                               | 01 I 型          |
|                                                                                                               | RHSカラーチャート 155B |
|                                                                                                               | 02 同位           |
|                                                                                                               | 01 トウモロコシ状      |
|                                                                                                               | 01 無            |
|                                                                                                               | 01 極早           |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |
|                                                                                                               |                 |

1 品種登録の番号及び年月日 第31166号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart JFIR-21

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「JFIR-21」は、対照品種「はやまき18」と比較して、種子の千粒重がやや小であること、止め葉の長さ／幅が大であること、冠さび病抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「JFIR-16」と比較して、穂の基部の小穂の包穎の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、種子の千粒重がやや小であること、穂の基部の小穂の包穎の長さがやや長であること、冠さび病抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般社団法人日本草地畜産種子協会  
東京都千代田区神田紺屋町8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平田球子 猿渡好彦 佐々木亨 杉田紳一

7 出願公表の年月日 令和2年1月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

いもち病抵抗性個体と「JFIR-16」から選抜した7個体を交配して得られた7母系種子を母系選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 6 6 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 倍数性                                                                             | 02 二倍体     |
| 02 種子の千粒重                                                                          | 04 やや小     |
| 03 春化前の草姿                                                                          | 07 半ほふく    |
| 04 葉の長さ                                                                            | 03 短       |
| 05 葉の幅                                                                             | 03 狭       |
| 06 葉の緑色の濃淡                                                                         | 05 中       |
| 07 春化後の株幅                                                                          | 05 中       |
| 08 春化後の草姿                                                                          | 05 中間      |
| 09 春化後の草高                                                                          | 04 やや低     |
| 10 春化前の出穂性                                                                         | 07 強       |
| 11 春化後の出穂期                                                                         | 03 早       |
| 12 出穂期の草高                                                                          | 05 中       |
| 13 出穂期の株幅                                                                          | 06 やや広     |
| 14 止め葉の長さ                                                                          | 04 やや短     |
| 15 止め葉の幅                                                                           | 04 やや狭     |
| 16 止め葉の長さ／幅                                                                        | 07 大       |
| 17 最長稈の長さ                                                                          | 04 やや短     |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 上部の節間長                                               | 06 やや長     |
| 19 穂の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 20 穂の小穂の数                                               | 05 中       |
| 21 穂の粗密                                                 | 05 中       |
| 22 穂の基部の小穂の包穎の長さ                                        | 06 やや長     |
| 23 穂の基部の小穂の長さ                                           | 05 中       |
| 24 けい光反応性                                               | 09 極多      |
| 25 雄性不稔性                                                |            |
| 26 硝酸態窒素の濃度                                             |            |
| 27 耐倒伏性                                                 |            |
| 28 冠さび病抵抗性                                              | 06 やや強     |
| 29 いもち病抵抗性                                              |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31167号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Miscanthus Andersson MB-1

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MB-1」は、対照品種「イリノイス」と比較して、葉群の高さがやや高であること、茎の数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「シマススキ」と比較して、草丈がかなり高であること、葉身の斑の有無が無であること、穂の長さがかなり長であること、小穂の長さ（毛、芒を除く。）が極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤森雅博 秋山征夫 久保田明人 眞田康治 田村健一 小路敦 奥村健治 我有満 山下浩 高井智之 波多野哲也 上床修弘 木村貴志

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要  
鹿児島県で収集した栄養系の株から選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 08 かなり高    |
| 03 葉群の高さ                                                | 06 やや高     |
| 04 茎の数                                                  | 08 かなり多    |
| 05 稈の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 06 節数                                                   | 06 やや多     |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    | 04 やや弱     |
| 08 葉身の形                                                 | 02 線状披針形   |
| 09 葉身の反りの位置                                             | 03 葉全体     |
| 10 葉身の横断面の形                                             | 01 平       |
| 11 葉身の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の表面の緑色の濃淡                                          | 05 中       |
| 14 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）                                  |            |
| 16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）                                   |            |
| 17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）                                  |            |

Miscanthus Andersson  
MB-1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 中肋の色                                                 | 01 白       |
| 19 穂の形                                                  | 03 倒円錐状    |
| 20 穂の長さ                                                 | 08 かなり長    |
| 21 穂の一次枝梗の数                                             | 07 多       |
| 22 穂の一次枝梗の長さ                                            | 09 極長      |
| 23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）                                       | 09 極長      |
| 24 小穂の毛の長さ                                              | 08 かなり長    |
| 25 小穂の毛の色                                               | 05 紫       |
| 26 ほう穎の色                                                | 02 黄       |
| 27 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 28 芒の長さ                                                 |            |
| 29 出穂期                                                  | 07 晩       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31168号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Miscanthus Andersson MB-2

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「MB-2」は、対照品種「イリノイス」と比較して、穂の長さがやや長であること、小穂の長さ（毛、芒を除く。）が極長であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、葉身の斑の有無が無であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤森雅博 秋山征夫 久保田明人 眞田康治 田村健一 小路敦 奥村健治 我有満 山下浩 高井智之 波多野哲也 上床修弘 木村貴志

7 出願公表の年月日 令和4年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要  
鹿児島県で収集した栄養系の株から選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張      |
| 02 草丈                                                   | 09 極高      |
| 03 葉群の高さ                                                | 07 高       |
| 04 茎の数                                                  | 09 極多      |
| 05 稈の長さ                                                 | 08 かなり長    |
| 06 節数                                                   | 06 やや多     |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    | 05 中       |
| 08 葉身の形                                                 | 02 線状披針形   |
| 09 葉身の反りの位置                                             | 03 葉全体     |
| 10 葉身の横断面の形                                             | 01 平       |
| 11 葉身の長さ                                                | 09 極長      |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の表面の緑色の濃淡                                          | 05 中       |
| 14 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）                                  |            |
| 16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）                                   |            |
| 17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）                                  |            |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 中肋の色                                                 | 01 白       |
| 19 穂の形                                                  | 03 倒円錐状    |
| 20 穂の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 21 穂の一次枝梗の数                                             | 06 やや多     |
| 22 穂の一次枝梗の長さ                                            | 06 やや長     |
| 23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）                                       | 09 極長      |
| 24 小穂の毛の長さ                                              | 07 長       |
| 25 小穂の毛の色                                               | 05 紫       |
| 26 ほう穎の色                                                | 01 白       |
| 27 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 28 芒の長さ                                                 |            |
| 29 出穂期                                                  | 07 晩       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31169号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Miscanthus Andersson ナンブNE (ナヅNE)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ナンブNE」は、対照品種「MB-2」と比較して、葉身の長さがやや長であること、穂の長さが極長であること、小穂の長さ（毛、芒を除く。）がやや長であること、出穂期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、葉身の斑の有無が無であること、穂の長さが極長であること、出穂期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1  
有限会社南部萱  
岩手県岩手郡雫石町川原22-1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤森雅博 久保田明人 眞田康治 田村健一 小路敦 奥村健治 秋山征夫 村上史佳

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要  
ススキ種「盛岡」とオギ種「羊ヶ丘3」を交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 01 立       |
| 02 草丈                                                   | 08 かなり高    |
| 03 葉群の高さ                                                | 08 かなり高    |
| 04 茎の数                                                  | 06 やや多     |
| 05 稈の長さ                                                 | 07 長       |
| 06 節数                                                   | 05 中       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    | 04 やや弱     |
| 08 葉身の形                                                 | 02 線状披針形   |
| 09 葉身の反りの位置                                             | 03 葉全体     |
| 10 葉身の横断面の形                                             | 01 平       |
| 11 葉身の長さ                                                | 06 やや長     |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の表面の緑色の濃淡                                          | 05 中       |
| 14 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）                                  |            |
| 16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）                                   |            |
| 17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）                                  |            |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 6 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 中肋の色                                                 | 01 白       |
| 19 穂の形                                                  | 01 円錐状     |
| 20 穂の長さ                                                 | 09 極長      |
| 21 穂の一次枝梗の数                                             | 06 やや多     |
| 22 穂の一次枝梗の長さ                                            | 07 長       |
| 23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）                                       | 06 やや長     |
| 24 小穂の毛の長さ                                              | 07 長       |
| 25 小穂の毛の色                                               | 01 白       |
| 26 ほう穎の色                                                | 03 褐       |
| 27 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 28 芒の長さ                                                 |            |
| 29 出穂期                                                  | 03 早       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31170号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Miscanthus Andersson ナンブNM (ナヅNM)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ナンブNM」は、対照品種「MB-1」と比較して、葉群の高さがかなり高であること、小穂の長さ（毛、芒を除く。）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「イリノイス」と比較して、茎の数が極多であること、出穂期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、葉身の幅がやや広であること、葉身の斑の有無が無であること、穂の一次枝梗の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1  
有限会社南部萱  
岩手県岩手郡雫石町川原22-1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
藤森雅博 秋山征夫 久保田明人 眞田康治 田村健一 村上史佳

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要  
オギ種「秋田3-2」とススキ種「阿蘇鍋平」交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 02 中間      |
| 02 草丈                                                   | 08 かなり高    |
| 03 葉群の高さ                                                | 08 かなり高    |
| 04 茎の数                                                  | 09 極多      |
| 05 稈の長さ                                                 | 07 長       |
| 06 節数                                                   | 06 やや多     |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    | 04 やや弱     |
| 08 葉身の形                                                 | 02 線状披針形   |
| 09 葉身の反りの位置                                             | 02 中間部     |
| 10 葉身の横断面の形                                             | 01 平       |
| 11 葉身の長さ                                                | 07 長       |
| 12 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 13 葉身の表面の緑色の濃淡                                          | 05 中       |
| 14 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）                                  |            |
| 16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）                                   |            |
| 17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）                                  |            |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 中肋の色                                                 | 01 白       |
| 19 穂の形                                                  | 01 円錐状     |
| 20 穂の長さ                                                 | 07 長       |
| 21 穂の一次枝梗の数                                             | 06 やや多     |
| 22 穂の一次枝梗の長さ                                            | 08 かなり長    |
| 23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）                                       | 06 やや長     |
| 24 小穂の毛の長さ                                              | 07 長       |
| 25 小穂の毛の色                                               | 01 白       |
| 26 ほう穎の色                                                | 03 褐       |
| 27 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 28 芒の長さ                                                 |            |
| 29 出穂期                                                  | 05 中       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31171号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miscanthus Andersson ナンブNL (ナブNL)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ナンブNL」は、対照品種「ナンブNM」と比較して、葉群の高さがやや高であること、葉身の幅が狭であること、穂の一次枝梗の長さが中であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「MB-2」と比較して、稈の長さがやや長であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、茎の数が極多であること、葉身の長さがかなり長であること、葉身の斑の有無が無であること、穂の一次枝梗の数がやや多であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1  
有限会社南部萱  
岩手県岩手郡雫石町川原22-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤森雅博 秋山征夫 久保田明人 眞田康治 田村健一 我有満 山下浩 高井智  
之 波多野哲也 上床修弘 村上史佳

7 出願公表の年月日 令和4年5月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

オギ種「亀尾」とススキ種「佐敷」を交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張      |
| 02 草丈                                                   | 08 かなり高    |
| 03 葉群の高さ                                                | 06 やや高     |
| 04 茎の数                                                  | 09 極多      |
| 05 稈の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 06 節数                                                   | 06 やや多     |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    | 04 やや弱     |
| 08 葉身の形                                                 | 02 線状披針形   |
| 09 葉身の反りの位置                                             | 03 葉全体     |
| 10 葉身の横断面の形                                             | 02 内曲      |
| 11 葉身の長さ                                                | 08 かなり長    |
| 12 葉身の幅                                                 | 03 狭       |
| 13 葉身の表面の緑色の濃淡                                          | 05 中       |
| 14 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）                                  |            |
| 16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）                                   |            |
| 17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）                                  |            |

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 中肋の色                                                 | 01 白       |
| 19 穂の形                                                  | 02 紡錘状     |
| 20 穂の長さ                                                 | 05 中       |
| 21 穂の一次枝梗の数                                             | 06 やや多     |
| 22 穂の一次枝梗の長さ                                            | 05 中       |
| 23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）                                       | 08 かなり長    |
| 24 小穂の毛の長さ                                              | 07 長       |
| 25 小穂の毛の色                                               | 05 紫       |
| 26 ほう穎の色                                                | 01 白       |
| 27 芒の有無                                                 | 01 無       |
| 28 芒の長さ                                                 |            |
| 29 出穂期                                                  | 07 晩       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31172号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Nelumbo nucifera Gaertn. トキガネ (トキガネ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「トキガネ」は、対照品種「酔妃蓮」と比較して、花卉のアントシアニンの濃淡が極淡であること、花卉先端の形が中であること等で区別性が認められる。対照品種「桃源暁」と比較して、花卉のアントシアニンの濃淡が極淡であること、開花の早晩が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
大木正人  
千葉県東金市北幸谷121

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大木正人

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Nelumbo nucifera Gaertn.

トキガネ

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 7 2 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 葉の大きさ                                                                           | 01 29cm以下  |
| 02 葉の凹み                                                                            | 06 やや深     |
| 03 葉縁の波                                                                            | 06 やや多     |
| 04 葉柄長                                                                             | 02 25～49cm |
| 05 葉柄のとげ                                                                           | 05 中       |
| 06 葉柄のとげの着色                                                                        | 09 有       |
| 07 つばみの形                                                                           | 01 細長型     |
| 08 つばみの色                                                                           | 03 赤みがかった緑 |
| 09 花頭数                                                                             | 01 1       |
| 10 花の大きさ                                                                           | 05 中       |
| 11 花茎長                                                                             | 03 50～99cm |
| 12 花弁の地色                                                                           | 01 白       |
| 13 花弁のアントシアニンの有無                                                                   | 09 有       |
| 14 花弁のアントシアニンの濃淡                                                                   | 01 極淡      |
| 15 花弁のアントシアニンの分布                                                                   | 01 つま紅     |
| 16 花弁の条線の程度                                                                        | 01 不明瞭     |
| 17 花弁の形                                                                            | 02 中間      |

Nelumbo nucifera Gaertn.

トキガネ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花弁先端の形                                               | 05 中       |
| 19 花弁のねじれ                                               | 01 無       |
| 20 完全花弁数                                                | 02 15～24枚  |
| 21 不完全花弁数                                               | 02 かなり少    |
| 22 雄ずいの数                                                | 02 100～199 |
| 23 雌ずいの形                                                | 01 正常      |
| 24 花たく上面の色                                              | 02 緑       |
| 25 花たく上面の形                                              | 01 円       |
| 26 花たくの形                                                | 02 倒円錐     |
| 27 子房の突出                                                | 01 無       |
| 28 種子の形                                                 | 02 やや楕円    |
| 29 萌芽の早晩                                                | 04 やや早     |
| 30 開花の早晩                                                | 05 中       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31173号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Nelumbo nucifera Gaertn. マドンナ (マドンナ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「マドンナ」は、対照品種「酔妃蓮」と比較して、花卉のアントシアニンの濃淡が中であること、花卉先端の形が中であること等で区別性が認められる。対照品種「緑地美人」と比較して、葉縁の波が中であること、花卉のアントシアニンの濃淡が中であること、花卉先端の形が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
大木正人  
千葉県東金市北幸谷121

6 登録品種の育成をした者の氏名  
大木正人

7 出願公表の年月日 令和元年10月28日

8 登録品種の育成の経過の概要  
育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Nelumbo nucifera Gaertn.

マドンナ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 葉の大きさ                                                | 01 29cm以下  |
| 02 葉の凹み                                                 | 05 中       |
| 03 葉縁の波                                                 | 05 中       |
| 04 葉柄長                                                  | 01 24cm以下  |
| 05 葉柄のとげ                                                | 05 中       |
| 06 葉柄のとげの着色                                             | 09 有       |
| 07 つばみの形                                                | 01 細長型     |
| 08 つばみの色                                                | 03 赤みがかった緑 |
| 09 花頭数                                                  | 01 1       |
| 10 花の大きさ                                                | 04 やや小     |
| 11 花茎長                                                  | 02 25～49cm |
| 12 花弁の地色                                                | 01 白       |
| 13 花弁のアントシアニンの有無                                        | 09 有       |
| 14 花弁のアントシアニンの濃淡                                        | 05 中       |
| 15 花弁のアントシアニンの分布                                        | 03 全面      |
| 16 花弁の条線の程度                                             | 01 不明瞭     |
| 17 花弁の形                                                 | 02 中間      |

Nelumbo nucifera Gaertn.

マドンナ

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 1 7 3 号

| 重 要 な 形 質  | 重要な形質に係る特性 |
|------------|------------|
| 18 花弁先端の形  | 05 中       |
| 19 花弁のねじれ  | 01 無       |
| 20 完全花弁数   | 02 15～24枚  |
| 21 不完全花弁数  | 01 無       |
| 22 雄ずいの数   | 02 100～199 |
| 23 雌ずいの形   | 01 正常      |
| 24 花たく上面の色 | 02 緑       |
| 25 花たく上面の形 | 01 円       |
| 26 花たくの形   | 02 倒円錐     |
| 27 子房の突出   | 01 無       |
| 28 種子の形    | 02 やや楕円    |
| 29 萌芽の早晩   | 03 早       |
| 30 開花の早晩   | 03 早       |
|            |            |
|            |            |
|            |            |
|            |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31174号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L. A2 fusion 1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「A2 fusion 1」は、対照品種「水稻中間母本農11号」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、穂の主軸の長さが短であること、玄米の色が暗褐であること等で区別性が認められる。対照品種「NERICA 10」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、外穎先端の色が白であること、玄米の形が長円形であること等で区別性が認められる。対照品種「きたくりん」と比較して、出穂期がかなり晩であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、玄米の色が暗褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人北海道大学  
北海道札幌市北区北八条西五丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

貴島祐治 小出陽平 増田到 北島克哉

7 出願公表の年月日 令和3年11月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「キタアケ」に「WK21」を交配して得られたF1個体の薬培養を行い、選抜したものである。

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 04 やや淡     |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 02 かなり粗    |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 17 稈の向き                                                 | 05 開       |

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 08 かなり晩    |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 07 太       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 02 かなり短    |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 03 短       |
| 31 穂数                                                   | 09 極多      |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 05 全体      |

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 7 4 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                                                          | 02 短       |
| 36 外穎の毛じ                                                                           | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                                                          | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                                                          | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                                                        | 01 立       |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                                                       | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                                                        | 02 2型      |
| 42 穂型                                                                              | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                                           | 05 穂だけ抽出   |
| 44 成熟期                                                                             | 08 かなり晩    |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                                                      | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                                             | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                                            | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                                                          | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                                           | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                                            | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                                           | 05 中       |

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 06 やや大     |
| 54 粳の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 55 粳の幅                                                  | 07 広       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 04 暗褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           |            |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               |            |
| 70 穂発芽性                                                 |            |
| 71 耐倒伏性                                                 |            |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        |            |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |            |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 |            |

Oryza glaberrima Steud. x Oryza sativa L.  
A2 fusion 1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31175号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. コシヒカリ環HD1号 (コシカリカHD1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「コシヒカリ環HD1号」は、対照品種「コシヒカリ関東HD1号」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がであること、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
前田英郎 後藤明俊 黒木慎 松下景 大森伸之介 金達英 石川寛 安部匡 石  
井卓朗 佐藤宏之 松原一樹 竹内善信 山口誠之 小林伸哉 平林秀介 加藤浩  
春原嘉弘

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「コシヒカリ環1号」に「コシヒカリ関東HD1号」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 02 鋭形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 02 かなり早    |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 04 やや細     |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 06 やや長     |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 04 やや短     |
| 31 穂数                                                   | 06 やや多     |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 01 先端のみ    |

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 5 号 |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性    |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短         |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中          |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白          |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白         |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる        |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有          |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型         |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形        |
| 43 穂の抽出度                                                | 07 穂軸の一部も概ね抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 02 かなり早       |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩          |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白         |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無          |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱      |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱      |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱      |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中          |

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                 | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 05 5型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           | 06 中間～完全崩壊 |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 7 5 号</div> |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性  |
| 69 障害型耐冷性                                                                          | 05 中        |
| 70 穂発芽性                                                                            | 07 難        |
| 71 耐倒伏性                                                                            | 03 弱        |
| 72 脱粒性                                                                             | 07 難        |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                                                   | +           |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                                                       | 05 中        |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                                                       | 02 かなり弱     |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                                                     |             |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                                                       | 04 やや弱      |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                                                    | 01 日本水稻型(+) |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                                                 |             |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                                                |             |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                                             |             |
| 82 グルテリン含量                                                                         |             |
| 83 カドミウム吸収性                                                                        | 01 極低       |
| 84 高温登熟性                                                                           | 05 中        |
| 85 着粒密度                                                                            |             |

Oryza sativa L.  
コシヒカリ環HD1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31176号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. きぬむすめ環1号（キヌスメカン1ゴウ）
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「きぬむすめ環1号」は、対照品種「きぬむすめ」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「おてんとそだち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、葉いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
竹内善信 田村克徳 片岡知守 中西愛 佐藤宏之 田村泰章 黒木慎 石川覚  
安部匡
- 7 出願公表の年月日 令和2年7月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「きぬむすめ」に「コシヒカリ環1号」を交配して、「きぬむすめ」を戻し交配した品種である。

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 04 やや早     |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 05 中       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 05 中       |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 04 やや短     |
| 31 穂数                                                   | 04 やや少     |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 01 先端のみ    |

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 04 やや早     |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                |            |

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 04 やや小     |
| 54 粳の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 04 やや小     |
| 59 玄米の長さ                                                | 04 やや短     |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 05 5型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               |            |
| 70 穂発芽性                                                 | 05 中       |
| 71 耐倒伏性                                                 | 05 中       |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pia, Pii   |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 06 やや強     |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 05 中       |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            | 05 中       |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |            |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             | 01 極低      |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 |            |

Oryza sativa L.  
きぬむすめ環1号

| 登録品種の植物体の特性記録部                                         |            | 登録番号    |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                        |            | 第31176号 |
| 重要な形質                                                  | 重要な形質に係る特性 |         |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性 |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |

1 品種登録の番号及び年月日 第31177号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. ふくまるSL (フマルSL)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ふくまるSL」は、対照品種「ふくまる」と比較して、穂いもちほ場抵抗性がやや強であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型 (Stvb-i) であること等で区別性が認められる。対照品種「みえのえみ」と比較して、穂発芽性の中であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型 (Stvb-i) であること等で区別性が認められる。対照品種「一番星」と比較して、成熟期が早であること、穂発芽性の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
茨城県  
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名  
岡本和之 深沢芳隆 川又快 秋田和則

7 出願公表の年月日 令和2年8月3日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「ふくまる」に「一番星」を交配し、「ふくまる」を戻し交配したものである。

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 04 半立～水平   |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |          | 登 録 番 号       |
|-----------------------------|----------|---------------|
| 重 要 な 形 質                   |          | 第 3 1 1 7 7 号 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）     |          |               |
| 19 出穂期                      | 03 早     |               |
| 20 雄性不稔性                    | 01 無     |               |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱   | 01 無又は極弱 |               |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱    | 01 無又は極弱 |               |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱     | 01 無又は極弱 |               |
| 24 柱頭の色                     | 01 白     |               |
| 25 稈の太さ                     | 05 中     |               |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）           | 05 中     |               |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無         | 01 無     |               |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱         |          |               |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無        | 01 無     |               |
| 30 穂の主軸の長さ                  | 05 中     |               |
| 31 穂数                       | 05 中     |               |
| 32 芒の有無                     | 09 有     |               |
| 33 初期の芒の色                   | 01 黄白    |               |
| 34 芒の分布                     | 01 先端のみ  |               |

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 01 1 型     |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 03 早       |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 登 録 番 号       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 第 3 1 1 7 7 号 |
| 52 護穎の色<br><br>53 粳の千粒重<br><br>54 粳の長さ<br><br>55 粳の幅<br><br>56 穎のフェノール反応の有無<br><br>57 穎のフェノール反応による着色の濃淡<br><br>58 玄米の千粒重<br><br>59 玄米の長さ<br><br>60 玄米の幅<br><br>61 玄米の形<br><br>62 玄米の色<br><br>63 胚乳の型<br><br>64 胚乳のアミロース含量<br><br>65 胚乳の色<br><br>66 精米のアルカリ崩壊性<br><br>67 玄米の香り<br><br>68 低温発芽性（陸稲品種に限る。） | 01 黄白    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 やや大   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 中     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 中     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 無     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 やや大   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 中     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 中     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 長円形   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 淡褐    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 粳     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05 5型    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02 白色半透明 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03 低崩壊   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 無又は極弱 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 7 号 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性       |
| 69 障害型耐冷性                                               | 06 やや強           |
| 70 穂発芽性                                                 | 05 中             |
| 71 耐倒伏性                                                 |                  |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難             |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pii              |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 04 やや弱           |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 06 やや強           |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |                  |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |                  |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         | 03 外国稲型 (Stvb-i) |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |                  |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |                  |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |                  |
| 82 グルテリン含量                                              |                  |
| 83 カドミウム吸収性                                             |                  |
| 84 高温登熟性                                                | 07 強             |
| 85 着粒密度                                                 | 05 中             |

Oryza sativa L.  
ふくまるSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31178号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. キヌヒカリ環1号 (キヌヒカリ環1号)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「キヌヒカリ環1号」は、対照品種「キヌヒカリ」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、障害型耐冷性がやや弱であること、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
梶亮太 前田英郎 山口誠之 山口知哉 松下景 長岡一朗 笹原英樹 黒木慎  
石川寛 安部匡

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「キヌヒカリ」に「コシヒカリ環1号」を交配し、「キヌヒカリ」を4回戻し交配してから選抜したものである。

Oryza sativa L.  
 キヌヒカリ環1号

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 7 8 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                                               | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                                                      | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                                                         | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                                                  | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                                                  |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                                               | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                                               |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                                                         | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                                                 | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                                                | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                                            | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                                            | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                                           |            |
| 14 葉身の幅                                                                            |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                                                       | 03 半立      |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                                                       | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                                            | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
 キヌヒカリ環1号

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 7 8 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                                            |            |
| 19 出穂期                                                                             | 05 中       |
| 20 雄性不稔性                                                                           | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                                                          | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                                           | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                                            | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                                            | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                                            | 05 中       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                                                  | 05 中       |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                                                | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                                                |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                                               | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                                                         | 04 やや短     |
| 31 穂数                                                                              | 04 やや少     |
| 32 芒の有無                                                                            | 01 無       |
| 33 初期の芒の色                                                                          |            |
| 34 芒の分布                                                                            |            |

Oryza sativa L.  
 キヌヒカリ環1号

| <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31178号</div> |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 重要な形質                                                        | 重要な形質に係る特性    |
| 35 最長芒の長さ                                                    |               |
| 36 外穎の毛じ                                                     | 05 中          |
| 37 外穎先端の色                                                    | 01 白          |
| 38 後期の芒の色                                                    |               |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                                  | 03 垂れる        |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                                 | 09 有          |
| 41 穂の二次枝梗の型                                                  | 02 2型         |
| 42 穂型                                                        | 02 紡錘形        |
| 43 穂の抽出度                                                     | 07 穂軸の一部も概ね抽出 |
| 44 成熟期                                                       | 05 中          |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                                | 07 晩          |
| 46 穎の色                                                       | 01 黄白         |
| 47 穎の模様                                                      | 01 無          |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱      |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                     | 01 無又は極弱      |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                      | 01 無又は極弱      |
| 51 護穎の長さ                                                     |               |

Oryza sativa L.  
 キヌヒカリ環1号

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31178号</div> </div> |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                                   | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                                  | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                                   | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                                    | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                                           | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                                      |            |
| 58 玄米の千粒重                                                                 | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                                  | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                                   | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                                   | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                                   | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                                   | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                                             |            |
| 65 胚乳の色                                                                   | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                                             |            |
| 67 玄米の香り                                                                  | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                                        |            |

Oryza sativa L.  
 キヌヒカリ環1号

| <div> <div>登録番号</div> <div>登録品種の植物体の特性記録部</div> <div>第31178号</div> </div> |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 重要な形質                                                                     | 重要な形質に係る特性  |
| 69 障害型耐冷性                                                                 | 04 やや弱      |
| 70 穂発芽性                                                                   | 05 中        |
| 71 耐倒伏性                                                                   | 06 やや強      |
| 72 脱粒性                                                                    | 07 難        |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                                          | Pii         |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                                              | 05 中        |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                                              | 05 中        |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                                            |             |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                                              |             |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                                           | 01 日本水稻型(+) |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                                        |             |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                                       |             |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                                    |             |
| 82 グルテリン含量                                                                |             |
| 83 カドミウム吸収性                                                               | 01 極低       |
| 84 高温登熟性                                                                  |             |
| 85 着粒密度                                                                   |             |

Oryza sativa L.  
キヌヒカリ環1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31179号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆたかまる (ユカマル)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ゆたかまる」は、対照品種「ゆきのはな」と比較して、穂数が少であること、耐倒伏性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「ほっかりん」と比較して、耐倒伏性がかなり強であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること、穂いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「まっしぐら」と比較して、障害型耐冷性がかなり強であること、葉いもちほ場抵抗性が極強であること、穂いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター  
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田一春 上村豊和 神田伸一郎 若本由加里 梶田啓 森山茂治 須藤充 須藤弘毅 小林渡

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ほっかりん」に（うしゆたか/青系IL1号）のF1を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 02 立～半立    |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 04 やや早     |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色                                 | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色                                  | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 07 太       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 04 やや短     |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 05 中       |
| 31 穂数                                                   | 03 少       |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 01 先端のみ    |

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 01 1 型     |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 04 やや早     |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色                                 | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色                                  | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                 | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 04 4型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           | 07 完全崩壊    |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               | 08 かなり強    |
| 70 穂発芽性                                                 | 05 中       |
| 71 耐倒伏性                                                 | 08 かなり強    |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pia, Pii   |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 09 極強      |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 09 極強      |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |            |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 06 やや密     |

Oryza sativa L.  
ゆたかまる

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 7 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31180号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 広系酒44号（ヒコイカ44コウ）

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「広系酒44号」は、対照品種「八反錦1号」と比較して、籾の長さが長であること、玄米の長さがやや長であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が41～60%であること等で区別性が認められる。対照品種「佐香錦」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、穂の主軸の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「南国そだち」と比較して、出穂期がかなり早であること、玄米の千粒重が大であること、精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）が41～60%であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

広島県  
広島県広島市中区基町10番52号  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

勝場善之助 貝淵由紀子 古田貴音 大土井律之 山崎梨沙 大場健司 荒瀬雄也  
石井卓朗 出田収 笹原英樹 重宗明子 中込弘二 新井亨

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「八反錦1号」に（（峰光/広系酒7号）/蔵の華）の後代を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.  
広系酒44号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 01 無又は極粗   |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
 広系酒44号

| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 |            | 登 録 番 号       |
|-----------------------------|------------|---------------|
|                             |            | 第 3 1 1 8 0 号 |
| 重 要 な 形 質                   | 重要な形質に係る特性 |               |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）     |            |               |
| 19 出穂期                      | 02         | かなり早          |
| 20 雄性不稔性                    | 01         | 無             |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色     | 01         | 無又は極弱         |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色      | 01         | 無又は極弱         |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色       | 01         | 無又は極弱         |
| 24 柱頭の色                     | 01         | 白             |
| 25 稈の太さ                     | 05         | 中             |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）           | 04         | やや短           |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無         | 01         | 無             |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱         |            |               |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無        | 01         | 無             |
| 30 穂の主軸の長さ                  | 04         | やや短           |
| 31 穂数                       | 05         | 中             |
| 32 芒の有無                     | 09         | 有             |
| 33 初期の芒の色                   | 01         | 黄白            |
| 34 芒の分布                     | 01         | 先端のみ          |

Oryza sativa L.  
広系酒44号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 02 かなり早    |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色                                 | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色                                  | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
広系酒44号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 07 大       |
| 54 粳の長さ                                                 | 07 長       |
| 55 粳の幅                                                  | 07 広       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 07 大       |
| 59 玄米の長さ                                                | 06 やや長     |
| 60 玄米の幅                                                 | 06 やや広     |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           |            |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
広系酒44号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               |            |
| 70 穂発芽性                                                 | 07 難       |
| 71 耐倒伏性                                                 | 07 強       |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pia, Pii   |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  | 03 41～60%  |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 03 粗       |

Oryza sativa L.  
広系酒44号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31181号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. 媛育83号（ヒメイク83コウ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「媛育83号」は、対照品種「こなだもん」と比較して、稈の太さがやや太であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「媛育71号」と比較して、稈の太さがやや太であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、グルテリン含量がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、稈の太さがやや太であること、成熟期が晩であること、グルテリン含量がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
愛媛県  
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名  
水口聡 中矢夏子

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「中国188号」に「媛育71号」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニンの着色                                      | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                |            |
| 14 葉身の幅                                                 |            |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 02 立～半立    |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 06 やや晩     |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色                                 | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色                                  | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 06 やや太     |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 06 やや長     |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 06 やや長     |
| 31 穂数                                                   | 05 中       |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 01 先端のみ    |

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 07 晩       |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色                                 | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色                                  | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色                                   | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                 | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           |            |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           | 03 低崩壊     |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               |            |
| 70 穂発芽性                                                 | 06 やや難     |
| 71 耐倒伏性                                                 |            |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        |            |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |            |
| 82 グルテリン含量                                              | 04 やや低     |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 05 中       |

Oryza sativa L.  
媛育83号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性  |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31182号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. みえのゆめBSL (ミエユメBSL)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「みえのゆめBSL」は、対照品種「みえのゆめ」と比較して、ごま葉枯病ほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「さとじまん」と比較して、ごま葉枯病ほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期がやや晩であること、稈の長さがやや短であること、ごま葉枯病ほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
三重県  
三重県津市広明町13番地  
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構  
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
太田雄也 松本憲悟 山川智大 大野鉄平 瀬田聡美 佐藤宏之 溝淵律子
- 7 出願公表の年月日 令和3年2月8日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「みえのゆめ」と「R307-48-9」の交配後代に、「みえのゆめ」を4回戻し交配した品種である。

Oryza sativa L.  
みえのゆめBSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 02 胚乳のアミロース含量                                           |            |
| 03 しょう葉のアントシアニンの着色                                      | 01 無又は弱    |
| 04 草姿                                                   | 03 半立      |
| 05 葉しょう先端のアントシアニンの着色                                    | 01 無又は極弱   |
| 06 葉しょう基部のアントシアニンの着色                                    | 01 無又は極弱   |
| 07 葉身の緑色の濃淡                                             | 04 やや淡     |
| 08 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は弱    |
| 09 葉身の毛じ                                                | 03 中       |
| 10 葉舌の形                                                 | 02 鋭形      |
| 11 葉舌の色                                                 | 01 白       |
| 12 出穂期                                                  | 06 やや晩     |
| 13 止め葉の長さ                                               |            |
| 14 止め葉の幅                                                |            |
| 15 外穎の毛じの粗密                                             | 03 中       |
| 16 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 17 稈の長さ                                                 | 04 やや短     |

Oryza sativa L.  
みえのゆめBSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈の太さ                                                 | 05 中       |
| 19 稈の節のアントシアニンの着色                                       | 01 無又は弱    |
| 20 稈の節間のアントシアニンの着色                                      | 01 無又は弱    |
| 21 穂数                                                   | 05 中       |
| 22 芒の分布                                                 | 02 先端1/4   |
| 23 芒の長さ                                                 | 01 極短      |
| 24 穂の長さ                                                 | 06 やや長     |
| 25 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 26 止め葉の姿勢                                               | 03 半立      |
| 27 着粒密度                                                 | 05 中       |
| 28 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 29 穂の密着度                                                | 02 やや密着    |
| 30 穂の二次枝梗の多少                                            | 01 無又は少    |
| 31 穂の抽出度                                                | 04 穂軸もよく抽出 |
| 32 成熟期                                                  | 05 中       |
| 33 枯れ上がり時期                                              | 03 晩       |
| 34 外穎の色                                                 | 01 白       |

Oryza sativa L.  
みえのゆめBSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 外穎のフェノール反応による着色                                      | 01 無又は極弱   |
| 36 護穎の長さ                                                | 02 中       |
| 37 護穎の色                                                 | 01 白       |
| 38 玄米の千粒重                                               | 06 やや大     |
| 39 玄米の長さ                                                | 06 やや長     |
| 40 玄米の幅                                                 | 03 中       |
| 41 玄米の長さ／幅                                              | 02 やや低     |
| 42 玄米の色                                                 | 05 淡褐      |
| 43 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 44 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 45 玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                   |            |
| 46 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 47 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |
| 48 障害型耐冷性                                               |            |
| 49 耐倒伏性                                                 |            |
| 50 高温登熟性                                                |            |
| 51 グルテリン含量                                              |            |

Oryza sativa L.  
みえのゆめBSL

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 カドミウム吸収性                                             |            |
| 53 セシウム吸収性                                              |            |
| 54 穂発芽性                                                 | 07 難       |
| 55 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性                    |            |
| 56 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        |            |
| 57 葉いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 58 穂いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 59 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 60 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 61 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 62 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 63 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 64 ごま葉枯病ほ場抵抗性                                           | 07 強       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31183号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. 丹亀の尾 (タカメノオ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「丹亀の尾」は、対照品種「亀ノ尾（外穎先端赤色系統）」と比較して、外穎先端の色が褐であること、後期の芒の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「岩手117号」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が極長であること、粳の千粒重が中であること、玄米の千粒重がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
梅田和男  
京都府京丹後市網野町網野825番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
梅田和男

7 出願公表の年月日 令和3年2月8日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「亀の尾」に品種名不詳の系統を交配し選抜したものである。

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 04 やや淡     |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                | 07 長       |
| 14 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 05 水平      |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            |            |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 05 中       |
| 20 雄性不稔性                                                |            |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 06 やや太     |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 09 極長      |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 08 かなり長    |
| 31 穂数                                                   | 03 少       |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 06 赤       |
| 34 芒の分布                                                 | 05 全体      |

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 03 中       |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 03 褐       |
| 38 後期の芒の色                                               | 04 赤褐      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 01 1 型     |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 06 やや晩     |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 05 中       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 04 やや短     |

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                 | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 04 やや小     |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 06 6型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           | 03 低崩壊     |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               |            |
| 70 穂発芽性                                                 |            |
| 71 耐倒伏性                                                 |            |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        |            |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            |            |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  | 01 20%以下   |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 06 やや密     |

Oryza sativa L.  
丹亀の尾

| 登 録 番 号                              |            |
|--------------------------------------|------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部          |            |
| 第 3 1 1 8 3 号                        |            |
| 重 要 な 形 質                            | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      | 87 セシウム吸収性 |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31184号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Phlox L. GFR-1
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「GFR-1」は、対照品種「ジャイアントローズ」と比較して、花冠の模様の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「オータムローズ」と比較して、花冠径がやや大であること、花冠裂片表面の地色がN74Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
小波輝昌  
茨城県筑西市藤ヶ谷2912番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
小波輝昌
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月7日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「多摩の流れ」の変異株である。

Phlox L.  
GFR-1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草型                                                   | 03 叢生性     |
| 02 草丈                                                   | 03 低       |
| 03 株幅                                                   | 04 やや狭     |
| 04 茎の太さ                                                 | 02 かなり細    |
| 05 茎の色                                                  | 04 淡緑紫     |
| 06 茎の毛の有無                                               | 09 有       |
| 07 茎の毛の多少                                               | 07 多       |
| 08 茎断面の形                                                | 01 丸       |
| 09 分枝性                                                  | 09 有       |
| 10 分枝の多少                                                | 04 やや少     |
| 11 節間長                                                  | 03 短       |
| 12 葉序                                                   | 01 対生      |
| 13 葉の向き                                                 | 02 水平      |
| 14 葉形                                                   | 02 広線形     |
| 15 葉の先端の形                                               | 02 鋭形      |
| 16 葉の基部の形                                               | 05 円形      |
| 17 葉縁鋸歯の形                                               | 01 全縁      |

Phlox L.  
GFR-1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 葉長                                                   | 03 短       |
| 19 葉幅                                                   | 01 極狭      |
| 20 葉表面の色                                                | 03 緑       |
| 21 葉裏面の色                                                | 03 緑       |
| 22 斑の有無                                                 | 01 無       |
| 23 斑の形                                                  |            |
| 24 斑の色                                                  |            |
| 25 葉の光沢                                                 | 09 有       |
| 26 葉の厚さ                                                 | 07 厚       |
| 27 葉数                                                   | 05 中       |
| 28 葉の硬さ                                                 | 07 硬       |
| 29 葉表面の毛の有無                                             | 09 有       |
| 30 葉表面の毛の多少                                             | 05 中       |
| 31 葉裏面の毛                                                | 01 無       |
| 32 葉柄の有無                                                | 01 無       |
| 33 葉柄の長さ                                                |            |
| 34 花序の形                                                 | 05 集散花序    |

Phlox L.  
GFR-1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 4 号 |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性             |
| 35 花の付き方                                                | 01 頂生                  |
| 36 花序の長さ                                                | 03 短                   |
| 37 花序の幅                                                 | 04 やや狭                 |
| 38 花序の分枝の多少                                             | 01 極少                  |
| 39 花序の分枝長                                               | 01 極短                  |
| 40 花の向き                                                 | 01 上向き                 |
| 41 花冠全体の形                                               | 02 星形                  |
| 42 花冠径                                                  | 06 やや大                 |
| 43 花冠裂片の幅                                               | 05 中                   |
| 44 花冠裂片の形                                               | 02 円型おう形               |
| 45 花冠裂片の切れ込み                                            | 03 浅                   |
| 46 花筒の長さ                                                | 03 短                   |
| 47 花筒の幅                                                 | 05 中                   |
| 48 花冠の厚さ                                                | 03 薄                   |
| 49 花冠の単色・複色の別                                           | 09 複色                  |
| 50 花冠裂片表面の地色                                            | RHSカラーチャート N74C        |
| 51 花冠裂片裏面の色                                             | RHSカラーチャート N74C;NN155D |

Phlox L.  
GFR-1

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 4 号 |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性                   |
| 52 花冠の模様の有無                                             | 09 有                         |
| 53 花冠の模様の形                                              | 09 その他                       |
| 54 花冠の模様の色                                              | RHSカラーチャート 61A               |
| 55 花冠中心部の色                                              | RHSカラーチャート 84D               |
| 56 花筒の色                                                 | RHSカラーチャート 157D（地色）;185D（線状） |
| 57 一重八重の別                                               | 01 一重                        |
| 58 がくの有無                                                | 09 有                         |
| 59 がく筒の形                                                | 02 円柱形                       |
| 60 がく筒の長さ                                               | 07 長                         |
| 61 がく裂片の長さ                                              | 04 やや短                       |
| 62 がくの色                                                 | 01 淡緑                        |
| 63 やくの色                                                 | 01 黄                         |
| 64 花粉の色                                                 | 01 黄                         |
| 65 雄ずいの数                                                | 01 5本                        |
| 66 小花柄の長さ                                               | 05 中                         |
| 67 花数                                                   | 04 やや少                       |
| 68 花の香り                                                 | 09 有                         |

Phlox L.  
GFR-1

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 4 号 |            |
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 開花時期                                                 | 06 やや晩     |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31185号 令和7年8月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Pinus thunbergii Parl. トキワ (トキワ)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
  
出願品種「トキワ」は、対照品種「虹青」と比較して、樹皮の亀裂の型が縦裂であること、枝の着生角度がかなり斜上であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
深作樹販株式会社  
茨城県小美玉市先後331番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
深作忠
- 7 出願公表の年月日 平成29年10月26日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有のクロマツ種の自然交雑実生から選抜したものである。

Pinus thunbergii Parl.  
トキワ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 樹形                                                   | 01 単幹状     |
| 02 樹冠形                                                  | 01 円柱形     |
| 03 樹の高さ                                                 | 05 中       |
| 04 樹の太さ                                                 | 07 太       |
| 05 樹幹の曲がり                                               | 01 直立      |
| 06 幹の横断面中央部の色                                           |            |
| 07 幹の横断面中央部を除く色                                         |            |
| 08 樹皮の色                                                 | 03 褐       |
| 09 樹皮の厚さ                                                | 05 中       |
| 10 樹皮の亀裂の有無                                             | 09 有       |
| 11 樹皮の亀裂の型                                              | 05 縦裂      |
| 12 枝の長さ                                                 | 08 かなり長    |
| 13 枝の太さ                                                 | 05 中       |
| 14 枝の着生角度                                               | 02 かなり斜上   |
| 15 輪生枝の数                                                | 04 やや少     |
| 16 葉束の針葉の数                                              | 03 2       |
| 17 針葉の長さ                                                | 07 長       |

Pinus thunbergii Parl.  
トキワ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 針葉の幅                                                 | 03 細       |
| 19 針葉の先端部の形                                             | 01 鋭尖頭     |
| 20 夏季の針葉の色                                              | 04 緑       |
| 21 冬季の針葉の色                                              | 05 濃緑      |
| 22 針葉のねじれ                                               | 04 強       |
| 23 針葉の曲がり                                               | 07 強       |
| 24 針葉の斑の有無                                              | 01 無       |
| 25 針葉の斑の分布                                              |            |
| 26 針葉の斑の色                                               |            |
| 27 針葉の色の季節変化                                            | 01 無       |
| 28 雌花の主な色                                               | 04 紅紫      |
| 29 雄花の主な色                                               | 02 黄褐      |
| 30 球果の形                                                 | 02 卵形      |
| 31 球果の長さ                                                | 04 やや小     |
| 32 球果の色                                                 | 04 褐緑      |
| 33 冬芽の形                                                 | 02 長円錐形    |
| 34 冬芽の色                                                 | 02 灰白      |

Pinus thunbergii Parl.

トキワ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 5 号                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 冬芽の鱗片の反転の有無<br><br>36 種鱗先端の突起の大きさ<br><br>37 種子の翼の褐色の濃淡<br><br>38 種子の色<br><br>39 種子の千粒重 | 09 有       |
|                                                                                           | 01 無又は極小   |
|                                                                                           | 02 中       |
|                                                                                           | 01 淡褐      |
|                                                                                           | 05 中       |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |
|                                                                                           |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31186号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Prunus L. ササナキ (サナキ)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ササナキ」は、対照品種「オオヤマザクラ」と比較して、花序柄の長さがやや短であること、葉身の基部の形がくさび形であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ソメイヨシノ」と比較して、花序柄の長さがやや短であること、葉身の長さが長であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
渡部昭  
山形県東置賜郡高畠町大字亀岡3621番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
渡部昭

7 出願公表の年月日 平成30年8月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
山中に自生する桜の枝変わりの穂木を台木に接ぎ木し、育成したものである。

Prunus L.  
ササナキ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 長枝の発生の向き                                             | 03 斜上      |
| 02 長枝の花芽の多少                                             | 03 少       |
| 03 新しょうの先端部の毛                                           | 01 無又は極少   |
| 04 開花時の若葉の色                                             | 04 緑褐      |
| 05 花序の型                                                 | 02 散房状     |
| 06 花序の花数                                                | 04 やや少     |
| 07 花序柄の長さ                                               | 04 やや短     |
| 08 花の向き                                                 | 02 横向き     |
| 09 花型                                                   | 01 一重      |
| 10 花の開き方                                                | 03 平開形     |
| 11 花の大きさ                                                | 04 やや小     |
| 12 花弁の数                                                 | 01 極少      |
| 13 花弁の長さ                                                | 04 やや短     |
| 14 花弁の幅                                                 | 03 狭       |
| 15 花弁のしわの多少                                             | 03 少       |
| 16 花弁の先端の切れ込み                                           | 03 少       |
| 17 花弁の色                                                 | 04 淡紅      |

Prunus L.  
ササナキ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花弁化した雄ずいの数                                           | 01 無       |
| 19 やくに対する柱頭の位置                                          | 05 同位      |
| 20 雌ずいの数                                                | 01 極少      |
| 21 葉化した雌ずいの有無                                           | 01 無       |
| 22 雌ずいの毛の有無                                             | 01 無       |
| 23 花の香り                                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 ほうの有無                                                | 09 有       |
| 25 ほうの形                                                 | 02 倒卵形     |
| 26 小花柄の長さ                                               | 02 かなり短    |
| 27 小花柄の毛の粗密                                             | 03 少       |
| 28 花床筒の形1                                               | 08 筒形      |
| 29 花床筒の形2                                               |            |
| 30 花床筒の毛                                                | 01 極少      |
| 31 がく片の形                                                | 01 披針形     |
| 32 がく片の鋸歯の有無                                            | 01 無       |
| 33 がく片の数                                                | 01 無       |
| 34 葉身の長さ                                                | 07 長       |

Prunus L.  
ササナキ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 6 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 葉身の幅                                                 | 05 中       |
| 36 葉身の形                                                 | 03 倒卵形     |
| 37 葉身の基部の形                                              | 01 くさび形    |
| 38 成葉の裏面の毛                                              | 01 無又は極少   |
| 39 葉身の鋸歯の深さ                                             | 06 やや深     |
| 40 葉身の鋸歯の型                                              | 02 重鋸歯     |
| 41 葉身の鋸歯の先端の形                                           | 02 鋭形      |
| 42 葉柄の長さ                                                | 06 やや長     |
| 43 葉柄の毛の向き                                              | 03 開出      |
| 44 成葉の蜜腺の位置                                             | 03 葉柄上部    |
| 45 着果性                                                  | 05 中       |
| 46 展葉期                                                  | 08 かなり晩    |
| 47 開花期                                                  | 07 晩       |
| 48 秋冬の開花の有無                                             | 01 無       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31187号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM202

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM202」は、対照品種「レッドカゴメ 932」と比較して、果実の大きさがやや大であること、子室数が4・5又は6であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM061」と比較して、子室数が4・5又は6であること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社  
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島諒 浅野聖

7 出願公表の年月日 令和2年10月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.  
KGM202

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 8 7 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニンの着色                                                                   | 09 有       |
| 02 草姿                                                                              | 01 心止まり    |
| 03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）                                                             | 04 やや弱     |
| 04 茎のアントシアニンの着色                                                                    | 05 中       |
| 05 節間長（普通品種に限る）                                                                    |            |
| 06 葉の着生角度                                                                          | 05 中間      |
| 07 葉長                                                                              | 04 やや短     |
| 08 葉幅                                                                              | 03 狭       |
| 09 葉の欠刻                                                                            | 02 2回羽状    |
| 10 小葉の大きさ                                                                          | 04 やや小     |
| 11 葉の緑色の強さ                                                                         | 05 中       |
| 12 小葉の着生角度                                                                         | 05 中間      |
| 13 花房の形                                                                            | 01 単一      |
| 14 花の帯化                                                                            | 01 無       |
| 15 花弁の色                                                                            | 01 黄       |
| 16 果柄の離層                                                                           | 01 無       |
| 17 果柄の長さ                                                                           |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM202

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 果実の大きさ                                               | 06 やや大     |
| 19 果径比（縦／横）                                             | 03 小       |
| 20 縦断面の果形                                               | 02 やや扁平    |
| 21 果肩部のひだ                                               | 03 弱       |
| 22 果実横断面の形                                              | 02 円       |
| 23 こうあ部のくぼみ                                             | 03 弱       |
| 24 へた落ちの大きさ                                             | 04 やや小     |
| 25 花落ちの大きさ                                              | 04 やや小     |
| 26 果頂部の形                                                | 03 平滑      |
| 27 果実表皮の色                                               | 02 黄       |
| 28 果実の心の大きさ                                             | 04 やや小     |
| 29 果肉の厚さ                                                | 05 中       |
| 30 子室数                                                  | 04 4・5又は6  |
| 31 幼果期の果肩部の緑色                                           | 01 無       |
| 32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ                                       |            |
| 33 幼果期の果肩部の緑色の強さ                                        |            |
| 34 幼果期の果色                                               | 05 中       |

Solanum lycopersicum L.  
KGM202

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 完熟期の果色                                               | 05 赤       |
| 36 完熟期の果肉色                                              | 04 ピンク     |
| 37 果実の硬さ                                                | 08 かなり硬    |
| 38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）                                |            |
| 39 開花の早晩                                                | 04 やや早     |
| 40 成熟の早晩                                                | 06 やや晩     |
| 41 節間長（心止まり品種に限る）                                       | 03 短       |
| 42 葉の上面の膨らみ                                             | 05 中       |
| 43 単為結果性                                                |            |
| 44 稔性区分                                                 |            |
| 45 回復遺伝子の有無                                             |            |
| 46 標識形質の有無                                              |            |
| 47 果実表皮の種類                                              | 03 普通      |
| 48 糖度（可溶性固形物含量）                                         | 05 中       |
| 49 酸度                                                   |            |
| 50 全固形物量                                                |            |
| 51 スクロース含量の有無                                           |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM202

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 7 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 リコピン含量                                               |            |
| 53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性                                     |            |
| 54 半身萎凋病抵抗性                                             |            |
| 55 萎凋病レース 1 抵抗性                                         |            |
| 56 萎凋病レース 2 抵抗性                                         |            |
| 57 萎凋病レース 3 抵抗性                                         |            |
| 58 根腐萎凋病抵抗性                                             |            |
| 59 葉かび病レース 0 抵抗性                                        |            |
| 60 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -1 型抵抗性                   |            |
| 61 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 型抵抗性                   |            |
| 62 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 a 型抵抗性                 |            |
| 63 疫病抵抗性                                                |            |
| 64 褐色根腐病抵抗性                                             |            |
| 65 斑点病抵抗性                                               |            |
| 66 斑葉細菌病抵抗性                                             |            |
| 67 青枯病抵抗性                                               |            |
| 68 かいよう病抵抗性                                             |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM202

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 7 号                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                                                    | 重要な形質に係る特性 |
| 69 輪紋病抵抗性<br><br>70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性<br><br>71 TYLCV-マイルド系統抵抗性<br><br>72 T S W V抵抗性<br><br>73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性<br><br>74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性 |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31188号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Solanum lycopersicum L. 山本ファーム1号（ヤマトファーム1ゴウ）

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「山本ファーム1号」は、対照品種「レッドペア」と比較して、果径比（縦／横）が中であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「ロッソナポリタン」と比較して、果径比（縦／横）が中であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
山本ファーム有限会社  
山梨県甲州市塩山千野4221番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
山本正

7 出願公表の年月日 令和3年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の名称不明品種の実生から、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.  
山本ファーム1号

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 8 8 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニンの着色                                                                   | 09 有       |
| 02 草姿                                                                              | 02 普通      |
| 03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）                                                             |            |
| 04 茎のアントシアニンの着色                                                                    | 05 中       |
| 05 節間長（普通品種に限る）                                                                    | 04 やや短     |
| 06 葉の着生角度                                                                          | 05 中間      |
| 07 葉長                                                                              | 04 やや短     |
| 08 葉幅                                                                              | 04 やや狭     |
| 09 葉の欠刻                                                                            | 02 2回羽状    |
| 10 小葉の大きさ                                                                          | 05 中       |
| 11 葉の緑色の強さ                                                                         | 05 中       |
| 12 小葉の着生角度                                                                         | 06 やや下垂    |
| 13 花房の形                                                                            | 01 単一      |
| 14 花の帯化                                                                            | 01 無       |
| 15 花弁の色                                                                            | 01 黄       |
| 16 果柄の離層                                                                           | 09 有       |
| 17 果柄の長さ                                                                           | 03 短       |

Solanum lycopersicum L.  
山本ファーム1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 果実の大きさ                                               | 03 小       |
| 19 果径比（縦／横）                                             | 05 中       |
| 20 縦断面の果形                                               | 08 プラム形    |
| 21 果肩部のひだ                                               | 03 弱       |
| 22 果実横断面の形                                              | 02 円       |
| 23 こうあ部のくぼみ                                             | 02 かなり弱    |
| 24 へた落ちの大きさ                                             | 02 かなり小    |
| 25 花落ちの大きさ                                              | 01 極小      |
| 26 果頂部の形                                                | 03 平滑      |
| 27 果実表皮の色                                               | 02 黄       |
| 28 果実の心の大きさ                                             | 03 小       |
| 29 果肉の厚さ                                                | 04 やや薄     |
| 30 子室数                                                  | 02 2又は3    |
| 31 幼果期の果肩部の緑色                                           | 09 有       |
| 32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ                                       | 08 かなり大    |
| 33 幼果期の果肩部の緑色の強さ                                        | 07 濃       |
| 34 幼果期の果色                                               | 06 やや濃     |

Solanum lycopersicum L.  
山本ファーム1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 完熟期の果色                                               | 05 赤       |
| 36 完熟期の果肉色                                              | 05 赤       |
| 37 果実の硬さ                                                | 05 中       |
| 38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）                                | 04 やや短     |
| 39 開花の早晩                                                | 04 やや早     |
| 40 成熟の早晩                                                | 05 中       |
| 41 節間長（心止まり品種に限る）                                       |            |
| 42 葉の上面の膨らみ                                             | 06 やや強     |
| 43 単為結果性                                                |            |
| 44 稔性区分                                                 |            |
| 45 回復遺伝子の有無                                             |            |
| 46 標識形質の有無                                              |            |
| 47 果実表皮の種類                                              | 03 普通      |
| 48 糖度（可溶性固形物含量）                                         | 06 やや高     |
| 49 酸度                                                   |            |
| 50 全固形物量                                                |            |
| 51 スクロース含量の有無                                           |            |

Solanum lycopersicum L.  
山本ファーム1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 8 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 リコピン含量                                               |            |
| 53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性                                     |            |
| 54 半身萎凋病抵抗性                                             |            |
| 55 萎凋病レース 1 抵抗性                                         |            |
| 56 萎凋病レース 2 抵抗性                                         |            |
| 57 萎凋病レース 3 抵抗性                                         |            |
| 58 根腐萎凋病抵抗性                                             |            |
| 59 葉かび病レース 0 抵抗性                                        |            |
| 60 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -1 型抵抗性                   |            |
| 61 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 型抵抗性                   |            |
| 62 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 a型抵抗性                  |            |
| 63 疫病抵抗性                                                |            |
| 64 褐色根腐病抵抗性                                             |            |
| 65 斑点病抵抗性                                               |            |
| 66 斑葉細菌病抵抗性                                             |            |
| 67 青枯病抵抗性                                               |            |
| 68 かいよう病抵抗性                                             |            |

Solanum lycopersicum L.  
山本ファーム1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 8 号                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                                                    | 重要な形質に係る特性 |
| 69 輪紋病抵抗性<br><br>70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性<br><br>71 TYLCV-マイルド系統抵抗性<br><br>72 T S W V抵抗性<br><br>73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性<br><br>74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性 |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31189号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Solanum lycopersicum L. KGM201

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「KGM201」は、対照品種「KGM012」と比較して、葉長が短であること、葉幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM993」と比較して、心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）が中であること、葉の緑色の強さがやや淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
カゴメ株式会社  
愛知県名古屋市中区錦三丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
松下航

7 出願公表の年月日 令和2年12月21日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.  
KGM201

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニンの着色                                        | 09 有       |
| 02 草姿                                                   | 01 心止まり    |
| 03 心止まり性の強弱（心止まり品種に限る）                                  | 05 中       |
| 04 茎のアントシアニンの着色                                         | 05 中       |
| 05 節間長（普通品種に限る）                                         |            |
| 06 葉の着生角度                                               | 05 中間      |
| 07 葉長                                                   | 03 短       |
| 08 葉幅                                                   | 02 かなり狭    |
| 09 葉の欠刻                                                 | 02 2回羽状    |
| 10 小葉の大きさ                                               | 03 小       |
| 11 葉の緑色の強さ                                              | 04 やや淡     |
| 12 小葉の着生角度                                              | 05 中間      |
| 13 花房の形                                                 | 01 単一      |
| 14 花の帯化                                                 | 01 無       |
| 15 花弁の色                                                 | 01 黄       |
| 16 果柄の離層                                                | 01 無       |
| 17 果柄の長さ                                                |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM201

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 果実の大きさ                                               | 04 やや小     |
| 19 果径比（縦／横）                                             | 04 やや小     |
| 20 縦断面の果形                                               | 03 球形      |
| 21 果肩部のひだ                                               | 03 弱       |
| 22 果実横断面の形                                              | 02 円       |
| 23 こうあ部のくぼみ                                             | 03 弱       |
| 24 へた落ちの大きさ                                             | 03 小       |
| 25 花落ちの大きさ                                              | 03 小       |
| 26 果頂部の形                                                | 03 平滑      |
| 27 果実表皮の色                                               | 02 黄       |
| 28 果実の心の大きさ                                             | 03 小       |
| 29 果肉の厚さ                                                | 05 中       |
| 30 子室数                                                  | 03 3又は4    |
| 31 幼果期の果肩部の緑色                                           | 01 無       |
| 32 幼果期の果肩部の緑色の大きさ                                       |            |
| 33 幼果期の果肩部の緑色の強さ                                        |            |
| 34 幼果期の果色                                               | 05 中       |

Solanum lycopersicum L.  
KGM201

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 完熟期の果色                                               | 05 赤       |
| 36 完熟期の果肉色                                              | 04 ピンク     |
| 37 果実の硬さ                                                | 06 やや硬     |
| 38 棚持ちの良さ（日持ち性、生食用品種に限る）                                |            |
| 39 開花の早晩                                                | 02 かなり早    |
| 40 成熟の早晩                                                | 05 中       |
| 41 節間長（心止まり品種に限る）                                       | 03 短       |
| 42 葉の上面の膨らみ                                             | 04 やや弱     |
| 43 単為結果性                                                |            |
| 44 稔性区分                                                 |            |
| 45 回復遺伝子の有無                                             |            |
| 46 標識形質の有無                                              |            |
| 47 果実表皮の種類                                              | 03 普通      |
| 48 糖度（可溶性固形物含量）                                         | 04 やや低     |
| 49 酸度                                                   |            |
| 50 全固形物量                                                |            |
| 51 スクロース含量の有無                                           |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM201

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 9 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 リコピン含量                                               |            |
| 53 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性                                     |            |
| 54 半身萎凋病抵抗性                                             |            |
| 55 萎凋病レース 1 抵抗性                                         |            |
| 56 萎凋病レース 2 抵抗性                                         |            |
| 57 萎凋病レース 3 抵抗性                                         |            |
| 58 根腐萎凋病抵抗性                                             |            |
| 59 葉かび病レース 0 抵抗性                                        |            |
| 60 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -1 型抵抗性                   |            |
| 61 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 型抵抗性                   |            |
| 62 タバコモザイクウイルス T <sub>m</sub> -2 a 型抵抗性                 |            |
| 63 疫病抵抗性                                                |            |
| 64 褐色根腐病抵抗性                                             |            |
| 65 斑点病抵抗性                                               |            |
| 66 斑葉細菌病抵抗性                                             |            |
| 67 青枯病抵抗性                                               |            |
| 68 かいよう病抵抗性                                             |            |

Solanum lycopersicum L.  
KGM201

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 8 9 号                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                                                    | 重要な形質に係る特性 |
| 69 輪紋病抵抗性<br><br>70 TYLCV-イスラエル系統抵抗性<br><br>71 TYLCV-マイルド系統抵抗性<br><br>72 T S W V抵抗性<br><br>73 Laveillula(Oidiopsis)菌によるうどんこ病抵抗性<br><br>74 Oidium菌によるうどんこ病抵抗性 |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                              |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31190号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Solanum lycopersicum L. FS03-T

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「FS03-T」は、対照品種「TTM059」と比較して、果実の表皮の色が無色であること、成熟の早晩が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジチャーム」と比較して、葉の長さがやや短であること、果実の表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
福井シード株式会社  
福井県福井市開発5丁目2004番地

6 登録品種の育成をした者の氏名  
前田博和

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統の実生から選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.  
FS03-T

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）                         | 09 有       |
| 02 草姿                                                   | 02 無限伸育型   |
| 03 草丈（無限伸育型品種に限る。）                                      | 05 中       |
| 04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）                                 |            |
| 05 茎のアントシアニンの着色                                         | 05 中       |
| 06 節間長（無限伸育型品種に限る。）                                     | 05 中       |
| 07 葉の着生角度                                               | 07 下垂      |
| 08 葉の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 09 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 10 葉型                                                   | 02 2回羽状    |
| 11 小葉の大きさ                                               | 04 やや小     |
| 12 葉の緑色の濃淡                                              | 06 やや濃     |
| 13 葉の光沢の強弱                                              | 03 弱       |
| 14 葉の膨らみ                                                | 06 やや強     |
| 15 小葉の着生角度                                              | 05 水平      |
| 16 花房の形                                                 | 01 単一      |
| 17 花の色                                                  | 01 黄       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 9 0 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花柱の毛の有無                                                                         | 09 有       |
| 19 果柄の離層の有無                                                                        | 09 有       |
| 20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）                                                          | 02 かなり短    |
| 21 幼果の果肩部の緑色の有無                                                                    | 09 有       |
| 22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ                                                                  | 07 大       |
| 23 幼果の果肩部の緑色の濃淡                                                                    | 06 やや濃     |
| 24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡                                                             | 03 淡       |
| 25 幼果の緑色縞模様の有無                                                                     | 01 無       |
| 26 果実の大きさ                                                                          | 03 小       |
| 27 果実の長さ／直径                                                                        | 03 小       |
| 28 果実の縦断面の形                                                                        | 02 扁円形     |
| 29 果実の縦断面の形2                                                                       |            |
| 30 果肩部のひだの強弱                                                                       | 02 かなり弱    |
| 31 こうあ部のくぼみ                                                                        | 04 やや弱     |
| 32 へた落ちの大きさ                                                                        | 02 かなり小    |
| 33 花落ちの大きさ                                                                         | 01 極小      |
| 34 果頂部の形                                                                           | 03 平滑      |

Solanum lycopersicum L.  
FS03-T

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 芯の大きさ                                                | 02 かなり小    |
| 36 果肉の厚さ                                                | 04 やや薄     |
| 37 子室数                                                  | 01 2のみ     |
| 38 果実の色                                                 | 02 黄       |
| 39 果肉の色                                                 | 02 黄       |
| 40 果実の表皮の光沢                                             | 02 中       |
| 41 果実の表皮の色                                              | 01 無色      |
| 42 果実の硬さ                                                | 09 極硬      |
| 43 棚持ちの長さ                                               | 09 極長      |
| 44 開花の早晩                                                | 04 やや早     |
| 45 成熟の早晩                                                | 09 極晩      |
| 46 糖度（可溶性固形物含量）                                         | 06 やや高     |
| 47 酸度                                                   | 06 やや高     |
| 48 全固形物量                                                |            |
| 49 スクロース含有量の有無                                          |            |
| 50 リコペン含有量                                              |            |
| 51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性                                     |            |

Solanum lycopersicum L.  
FS03-T

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 0 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 半身萎凋病抵抗性                                             |            |
| 53 萎凋病レース 1 抵抗性                                         |            |
| 54 萎凋病レース 2 抵抗性                                         |            |
| 55 萎凋病レース 3 抵抗性                                         |            |
| 56 根腐萎凋病抵抗性                                             |            |
| 57 葉かび病レース 0 抵抗性                                        |            |
| 58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性                                    |            |
| 59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性                                    |            |
| 60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性                                    |            |
| 61 疫病抵抗性                                                |            |
| 62 斑点病抵抗性                                               |            |
| 63 青枯病抵抗性                                               |            |
| 64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性                               |            |
| 65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性                                |            |
| 66 かいよう病抵抗性                                             |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31191号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Solanum lycopersicum L. ET-1807

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「ET-1807」は、対照品種「TTM106」と比較して、葉の光沢の強弱が弱であること、葉の膨らみが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「べにすずめ」と比較して、葉の緑色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
公益財団法人園芸植物育種研究所  
千葉県松戸市紙敷二丁目5番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名  
角田鈴奈 三平智彦 門馬法明 松田理恵子 源田佳克 石川正美 伊東正 大泉利勝

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要  
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.  
ET-1807

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）                         | 09 有       |
| 02 草姿                                                   | 02 無限伸育型   |
| 03 草丈（無限伸育型品種に限る。）                                      | 05 中       |
| 04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）                                 |            |
| 05 茎のアントシアニンの着色                                         | 05 中       |
| 06 節間長（無限伸育型品種に限る。）                                     | 05 中       |
| 07 葉の着生角度                                               | 07 下垂      |
| 08 葉の長さ                                                 | 05 中       |
| 09 葉の幅                                                  | 04 やや狭     |
| 10 葉型                                                   | 02 2回羽状    |
| 11 小葉の大きさ                                               | 05 中       |
| 12 葉の緑色の濃淡                                              | 05 中       |
| 13 葉の光沢の強弱                                              | 03 弱       |
| 14 葉の膨らみ                                                | 03 弱       |
| 15 小葉の着生角度                                              | 05 水平      |
| 16 花房の形                                                 | 01 単一      |
| 17 花の色                                                  | 01 黄       |

Solanum lycopersicum L.  
ET-1807

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 花柱の毛の有無                                              | 09 有       |
| 19 果柄の離層の有無                                             | 09 有       |
| 20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）                               | 02 かなり短    |
| 21 幼果の果肩部の緑色の有無                                         | 09 有       |
| 22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ                                       | 06 やや大     |
| 23 幼果の果肩部の緑色の濃淡                                         | 05 中       |
| 24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡                                  | 03 淡       |
| 25 幼果の緑色縞模様の有無                                          | 01 無       |
| 26 果実の大きさ                                               | 02 かなり小    |
| 27 果実の長さ／直径                                             | 03 小       |
| 28 果実の縦断面の形                                             | 02 扁円形     |
| 29 果実の縦断面の形2                                            |            |
| 30 果肩部のひだの強弱                                            | 01 無又は極弱   |
| 31 こうあ部のくぼみ                                             | 03 弱       |
| 32 へた落ちの大きさ                                             | 02 かなり小    |
| 33 花落ちの大きさ                                              | 01 極小      |
| 34 果頂部の形                                                | 03 平滑      |

Solanum lycopersicum L.  
ET-1807

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 芯の大きさ                                                | 03 小       |
| 36 果肉の厚さ                                                | 04 やや薄     |
| 37 子室数                                                  | 01 2のみ     |
| 38 果実の色                                                 | 05 赤       |
| 39 果肉の色                                                 | 05 赤       |
| 40 果実の表皮の光沢                                             | 02 中       |
| 41 果実の表皮の色                                              | 02 黄色      |
| 42 果実の硬さ                                                | 07 硬       |
| 43 棚持ちの長さ                                               | 06 やや長     |
| 44 開花の早晩                                                | 04 やや早     |
| 45 成熟の早晩                                                | 02 かなり早    |
| 46 糖度（可溶性固形物含量）                                         | 07 高       |
| 47 酸度                                                   | 05 中       |
| 48 全固形物量                                                |            |
| 49 スクロース含有量の有無                                          |            |
| 50 リコペン含有量                                              |            |
| 51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性                                     |            |

Solanum lycopersicum L.  
ET-1807

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 半身萎凋病抵抗性                                             |            |
| 53 萎凋病レース 1 抵抗性                                         |            |
| 54 萎凋病レース 2 抵抗性                                         |            |
| 55 萎凋病レース 3 抵抗性                                         |            |
| 56 根腐萎凋病抵抗性                                             |            |
| 57 葉かび病レース 0 抵抗性                                        |            |
| 58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性                                    |            |
| 59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性                                    |            |
| 60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性                                    |            |
| 61 疫病抵抗性                                                |            |
| 62 斑点病抵抗性                                               |            |
| 63 青枯病抵抗性                                               |            |
| 64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性                               |            |
| 65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性                                |            |
| 66 かいよう病抵抗性                                             |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31192号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 信雪MSP60 (シユキMSP60)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「信雪MSP60」は、対照品種「MS138B」と比較して、草丈がかなり低であること、稈の節間の着色の有無が有であること、穂首の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ソルガム中間母本農4号」と比較して、出穂期が極早であること、穂首の長さがやや短であること、子実の色が淡褐であること等で区別性が認められる。対照品種「JN358」と比較して、草丈がかなり低であること、穂首の長さがやや短であること、子実の色が淡褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社  
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号  
国立大学法人信州大学  
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

春日重光 小山内光輔 本多利光

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「BMP-21」に「MS138B」を交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色                                  | 05 中       |
| 02 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 03 分けつ数                                                 | 01 無又は極少   |
| 04 葉身の緑色の濃淡                                             | 03 中       |
| 05 葉の中肋の色                                               | 07 褐       |
| 06 葉の中肋の変色の範囲                                           | 03 小       |
| 07 出穂期                                                  | 01 極早      |
| 08 穎のアントシアニンの着色                                         | 03 弱       |
| 09 柱頭のアントシアニンの着色                                        | 05 中       |
| 10 柱頭の色                                                 | 05 灰       |
| 11 柱頭の長さ                                                | 03 中       |
| 12 小花の長さ                                                | 03 短       |
| 13 自家稔性                                                 | 03 高       |
| 14 開花終期の穎の色                                             | 03 黄緑      |
| 15 開花終期の穂の粒着の粗密                                         | 05 中       |
| 16 護穎の芒の長さ                                              | 01 無又は極短   |
| 17 葯の色                                                  | 03 橙       |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 9 2 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 草丈                                                                              | 06 かなり低    |
| 19 草丈2                                                                             |            |
| 20 稈の直径                                                                            | 01 極小      |
| 21 稈の節間の着色の有無                                                                      | 09 有       |
| 22 葉身の長さ                                                                           | 01 極短      |
| 23 葉身の幅                                                                            | 02 かなり狭    |
| 24 穂の長さ                                                                            | 02 かなり短    |
| 25 穂首の長さ                                                                           | 04 やや短     |
| 26 穂の分枝の長さ                                                                         | 04 やや短     |
| 27 穂の粗密                                                                            | 06 やや密     |
| 28 穂の最大幅の位置                                                                        | 03 中       |
| 29 穎の色                                                                             | 06 濃茶      |
| 30 穎の長さ                                                                            | 05 中       |
| 31 子実の色                                                                            | 07 淡褐      |
| 32 子実の色2                                                                           |            |
| 33 子実の千粒重                                                                          | 03 軽       |
| 34 正面から見た子実の形                                                                      | 03 卵形      |

Sorghum Moench  
信雪MSP60

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 2 号                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 子実の胚痕の大きさ<br><br>36 子実のタンニン含量<br><br>37 胚乳の質(縦断面)<br><br>38 胚乳のガラス質の色<br><br>39 日長感応性<br><br>40 茎の甘味<br><br>41 紫斑点病抵抗性 | 03 小       |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           | 04 3/4粉質   |
|                                                                                                                           | 01 白       |
|                                                                                                                           | 01 無       |
|                                                                                                                           | 03 低       |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31193号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 信雪MSF60 (シユキMSF60)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「信雪MSF60」は、対照品種「MS138A」と比較して、草丈がかなり低であること、稈の節間の着色の有無が有であること、穂首の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ソルガム中間母本農3号」と比較して、出穂期が極早であること、穂首の長さが中であること、子実の色が淡褐であること等で区別性が認められる。対照品種「JNK-MS-6A」と比較して、穂首の長さが中であること、穎の長さが長であること、子実の千粒重がやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社  
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号  
国立大学法人信州大学  
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

春日重光 小山内光輔 本多利光

7 出願公表の年月日 令和2年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

「MS138A」に「10SK1-49」を交配し、選抜したものである。

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色                                  | 05 中       |
| 02 葉身のアントシアニンの着色                                        | 01 無又は極弱   |
| 03 分けつ数                                                 | 01 無又は極少   |
| 04 葉身の緑色の濃淡                                             | 03 中       |
| 05 葉の中肋の色                                               | 07 褐       |
| 06 葉の中肋の変色の範囲                                           | 01 無又は極小   |
| 07 出穂期                                                  | 01 極早      |
| 08 穎のアントシアニンの着色                                         | 03 弱       |
| 09 柱頭のアントシアニンの着色                                        | 09 極強      |
| 10 柱頭の色                                                 | 05 灰       |
| 11 柱頭の長さ                                                | 02 短       |
| 12 小花の長さ                                                | 02 かなり短    |
| 13 自家稔性                                                 | 01 無又は極低   |
| 14 開花終期の穎の色                                             | 03 黄緑      |
| 15 開花終期の穂の粒着の粗密                                         | 05 中       |
| 16 護穎の芒の長さ                                              | 01 無又は極短   |
| 17 葯の色                                                  | 02 灰桃      |

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 9 3 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 18 草丈                                                                              | 06 かなり低    |
| 19 草丈2                                                                             |            |
| 20 稈の直径                                                                            | 01 極小      |
| 21 稈の節間の着色の有無                                                                      | 09 有       |
| 22 葉身の長さ                                                                           | 01 極短      |
| 23 葉身の幅                                                                            | 02 かなり狭    |
| 24 穂の長さ                                                                            | 02 かなり短    |
| 25 穂首の長さ                                                                           | 05 中       |
| 26 穂の分枝の長さ                                                                         | 04 やや短     |
| 27 穂の粗密                                                                            | 06 やや密     |
| 28 穂の最大幅の位置                                                                        | 03 中       |
| 29 穎の色                                                                             | 06 濃茶      |
| 30 穎の長さ                                                                            | 07 長       |
| 31 子実の色                                                                            | 07 淡褐      |
| 32 子実の色2                                                                           |            |
| 33 子実の千粒重                                                                          | 06 やや重     |
| 34 正面から見た子実の形                                                                      | 03 卵形      |

Sorghum Moench  
信雪MSF60

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 3 号                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                                                                 | 重要な形質に係る特性 |
| 35 子実の胚痕の大きさ<br><br>36 子実のタンニン含量<br><br>37 胚乳の質(縦断面)<br><br>38 胚乳のガラス質の色<br><br>39 日長感応性<br><br>40 茎の甘味<br><br>41 紫斑点病抵抗性 | 03 小       |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           | 04 3/4粉質   |
|                                                                                                                           | 01 白       |
|                                                                                                                           | 01 無       |
|                                                                                                                           | 05 中       |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                           |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31194号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 04SK2-11

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「04SK2-11」は、対照品種「03SK4 3-1-1」と比較して、葉身の長さがやや短であること、子実の千粒重がやや軽であること等で区別性が認められる。対照品種「JN290EE」と比較して、草丈がやや低であること、稈の節間の着色の有無の有であること、穂の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「JN358」と比較して、穂の長さが中であること、穂の粗密が粗であること、子実の千粒重がやや軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社  
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号  
国立大学法人信州大学  
長野県松本市旭三丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

春日重光 小山内光輔 本多利光

7 出願公表の年月日 令和2年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「JN358」に「JN299EE」を交配し、選抜したものである。

| <div>登 録 番 号</div> <div>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部</div> <div>第 3 1 1 9 4 号</div> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                                                          | 重要な形質に係る特性 |
| 01 幼苗の子葉しょうのアントシアニンの着色                                                             | 05 中       |
| 02 葉身のアントシアニンの着色                                                                   | 01 無又は極弱   |
| 03 分けつ数                                                                            | 01 無又は極少   |
| 04 葉身の緑色の濃淡                                                                        | 03 中       |
| 05 葉の中肋の色                                                                          | 07 褐       |
| 06 葉の中肋の変色の範囲                                                                      | 03 小       |
| 07 出穂期                                                                             | 02 かなり早    |
| 08 穎のアントシアニンの着色                                                                    | 03 弱       |
| 09 柱頭のアントシアニンの着色                                                                   | 01 無又は極弱   |
| 10 柱頭の色                                                                            | 02 淡黄      |
| 11 柱頭の長さ                                                                           | 02 短       |
| 12 小花の長さ                                                                           | 03 短       |
| 13 自家稔性                                                                            | 03 高       |
| 14 開花終期の穎の色                                                                        | 03 黄緑      |
| 15 開花終期の穂の粒着の粗密                                                                    | 03 粗       |
| 16 護穎の芒の長さ                                                                         | 05 中       |
| 17 葯の色                                                                             | 03 橙       |

Sorghum Moench  
04SK2-11

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 4 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 草丈                                                   | 08 やや低     |
| 19 草丈2                                                  |            |
| 20 稈の直径                                                 | 04 やや小     |
| 21 稈の節間の着色の有無                                           | 09 有       |
| 22 葉身の長さ                                                | 04 やや短     |
| 23 葉身の幅                                                 | 03 狭       |
| 24 穂の長さ                                                 | 05 中       |
| 25 穂首の長さ                                                | 06 やや長     |
| 26 穂の分枝の長さ                                              | 05 中       |
| 27 穂の粗密                                                 | 03 粗       |
| 28 穂の最大幅の位置                                             | 03 中       |
| 29 穎の色                                                  | 07 黒       |
| 30 穎の長さ                                                 | 05 中       |
| 31 子実の色                                                 | 07 淡褐      |
| 32 子実の色2                                                |            |
| 33 子実の千粒重                                               | 04 やや軽     |
| 34 正面から見た子実の形                                           | 02 広楕円形    |

04SK2-11

登録番号

# 登録品種の植物体の特性記録部

第31194号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31195号 令和7年8月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica peduncularis M. Bieb. カミホン コバブルー (カミホン コバブルー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「カミホン コバブルー」は、対照品種「ジョージアブルー」と比較して、花冠の幅が中であること、花冠裂片の形が卵形であること、各開花習性における早晩性の中（春咲き）であること等で区別性が認められる。対照品種「マダムマルシア」と比較して、葉身の形が卵形であること、花冠の表面の主な色が96Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ウォーターペリーブルー」と比較して、葉身の形が卵形であること、花冠の表面の主な色が96Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

未来アグリス株式会社

愛知県長久手市山越606番地

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 令和3年1月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ジョージアブルー」の変異株である。

Veronica peduncularis M. Bieb.  
カミホン コバブルー

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 5 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 草姿                                                   | 03 開張      |
| 02 草丈                                                   | 02 かなり低    |
| 03 株幅（開張性品種に限る。）                                        | 02 かなり狭    |
| 04 茎の基部の太さ                                              | 01 極細      |
| 05 茎の色                                                  | 07 紫       |
| 06 茎の毛                                                  | 01 無又は極粗   |
| 07 根出葉の有無                                               | 01 無       |
| 08 葉身の長さ                                                | 01 極短      |
| 09 葉身の幅                                                 | 01 極狭      |
| 10 葉身の形                                                 | 02 卵形      |
| 11 葉身の表面の色                                              | 02 緑       |
| 12 葉身の斑の有無                                              | 01 無       |
| 13 葉身の斑の型                                               |            |
| 14 葉身の斑の色                                               |            |
| 15 葉身の表面の毛                                              | 01 無又は極粗   |
| 16 葉身の葉脈間のしわ                                            | 01 無又は極弱   |
| 17 葉縁の鋸歯の数                                              | 01 無又は極少   |

Veronica peduncularis M. Bieb.  
カミホン コバブルー

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 1 9 5 号 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性      |
| 18 葉縁の鋸歯の深さ                                             | 02 浅            |
| 19 葉身の裏面の色                                              | 01 淡緑           |
| 20 葉柄の長さ                                                | 01 無又は極短        |
| 21 花序の型                                                 | 01 総状花序         |
| 22 頂花序の長さ                                               | 02 かなり短         |
| 23 頂花序の幅                                                | 05 中            |
| 24 頂花序の花の粗密                                             | 01 極粗           |
| 25 頂花序の帯化                                               | 01 無又は極少        |
| 26 側花序の数                                                | 02 かなり少         |
| 27 小花柄の長さ                                               | 03 中            |
| 28 ほう葉の長さ                                               | 01 極短           |
| 29 がく裂片の長さ                                              | 01 極短           |
| 30 花冠の筒部の長さ                                             | 03 中            |
| 31 花冠の長さ                                                | 02 かなり短         |
| 32 花冠の幅                                                 | 05 中            |
| 33 花冠の表面の主な色                                            | RHSカラーチャート 96C  |
| 34 花冠の表面の二次色                                            | RHSカラーチャート N89B |

Veronica peduncularis M. Bieb.

カミホン コバブルー

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 1 9 5 号

| 重 要 な 形 質          | 重要な形質に係る特性     |
|--------------------|----------------|
| 35 花冠の目の有無         | 09 有           |
| 36 花冠の裏面の主な色       | RHSカラーチャート 92B |
| 37 花冠の裏面の二次色       |                |
| 38 花冠裂片の形          | 02 卵形          |
| 39 花冠裂片の先端部の形      | 02 鈍形          |
| 40 花冠の長さに対する雄ずいの長さ | 04 長           |
| 41 花糸の色            | 06 淡青紫         |
| 42 やくの色            | 07 青           |
| 43 花冠の長さに対する雌ずいの長さ | 04 長           |
| 44 雌ずいの色           | 04 淡紫          |
| 45 開花習性            | 01 春咲き         |
| 46 各開花習性における早晩性    | 05 中（春咲き）      |
|                    |                |
|                    |                |
|                    |                |
|                    |                |
|                    |                |