

1 品種登録の番号及び年月日 第31776号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. 鳥取1u61 (トトリ1u61)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「鳥取1u61」は、対照品種「ねばりっ娘」と比較して、むかごの数が無又は極少であること、いもの縦断面の形が狭矩形であること等で区別性が認められる。対照品種「ながいも（大橋系）」と比較して、むかごの数が無又は極少であること、葉柄の長さがかなり長であること、雌雄性が雌株であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県

鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤正浩 米村善栄 前田英博 北山淑一 森本康史 川田久美子

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ねばりっ娘」に出願者所有の鳥取県在来の「ナガイモ」選抜系統を交配し、選抜したものである。

Dioscorea L.
鳥取1u61

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の着生密度	05 中
02 分枝の数	04 やや少
03 茎の太さ	06 やや太
04 茎のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
05 むかごの数	01 無又は極少
06 むかごの大きさ	03 小
07 むかごの外皮の褐色の濃淡	04 やや淡
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	06 やや広
10 葉身の長さ／幅	02 中
11 葉身の色	03 緑
12 葉身の葉脚部のくぼみの深さ	07 深
13 葉身の周縁のくびれの強弱	07 強
14 葉柄の長さ	08 かなり長
15 いもの長さ	06 やや長
16 いもの幅	05 中
17 いもの縦断面の形	03 狭矩形

Dioscorea L.
鳥取1u61

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 いもの横断面の形	01 円形
19 いもの外皮の色	02 淡褐
20 いもの首部の長さ	05 中
21 いもの肉色	01 白
22 いもの肉の硬さ	02 中
23 いもの粘度の強弱	02 中
24 いもをすりおろした後の変色性(いもの肉色が白色又はクリーム色の品種に限る。)	01 弱
25 雌雄性	01 雌株
26 成熟期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31777号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinops ritro L. ブルーシャンブルー (ブルーシャンブルー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ブルーシャンブルー」は、対照品種「ベッチーズブルー」と比較して、草丈が56.7cm(±3.63)であること、開花始期が6月20日であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
笹川茂
茨城県日立市鹿島町1丁目15-6

6 登録品種の育成をした者の氏名
笹川茂

7 出願公表の年月日 平成31年2月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ベッチーズブルー」の変異株である。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31777号
01 植物体の形状	該当なし	
02 植物体の大きさ	草丈が56.7cm(±3.63)、株幅が43.6cm(±4.84)	
03 茎の形状	一次側枝の数が2.8(±0.40)	
04 茎の大きさ	茎の太さが4.9mm(±0.28)、一次側枝の長さが21.7cm(±3.29)	
05 茎の色彩	茎の色が189D	
06 葉の形状	葉身の切れ込みの深さが深	
07 葉の大きさ	葉身の長さが16.7cm(±0.84)、葉身の幅が10.2cm(±1.35)	
08 葉の色彩	葉身の表面の色がNN137A、葉身の裏面の色が189D	
09 花の形状	一花茎の頭花の数が4.3(±0.46)	
10 花の大きさ	頭花の直径(開花前)が34.3mm(±1.04)、頭花の直径(開花時)が52.6mm(±1.16)	
11 花の色彩	花冠裂片の表面の色が94B、総苞片の先端の色がN89C	
12 果実の形状	該当なし	
13 果実の大きさ	該当なし	
14 果実の色彩	該当なし	
15 種子の形状	該当なし	
16 種子の大きさ	該当なし	
17 種子の色彩	該当なし	

Echinops ritro L.
ブルーシャンブルー

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31777号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし	
	該当なし	
	該当なし	
	開花始期が6月20日	
	該当なし	

1 品種登録の番号及び年月日 第31778号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x *Euphorbia cornastra* (Dressler)
Radcl.-Sm. Bonpri 1820

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Bonpri 1820」は、対照品種「Bonpri 9172」と比較して、最大ほうの形が卵形であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）がN45Bであること、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonpri 1762」と比較して、葉身の表面の主脈の色が帯赤であること、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 令和6年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統の変異株である。

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1820

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 分枝の有無	01 無
02 分枝の数	
03 樹高	02 かなり低
04 樹の幅	03 狭
05 茎の中間部の緑色の濃淡	05 中
06 茎の中間部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 茎上部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	04 やや狭
10 葉身の形	02 卵形
11 葉身の基部の形	02 円形
12 葉身の表面の色数	01 1色
13 葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）	07 濃
14 葉身の主な色（複色葉品種に限る。）	
15 葉身の二次色（複色葉品種に限る。）	
16 葉身の三次色（複色葉品種に限る。）	
17 葉身の表面の主脈の色	02 帯赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1820

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31778号
18 葉身の切れ込みの数	01 無又は少	
19 葉身の切れ込みの深さ	01 極浅	
20 葉身の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱	
21 葉柄の長さ	03 短	
22 葉柄の表面の緑色の濃淡	01 極淡	
23 葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱	07 強	
24 葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は弱	
25 部分着色葉の数	05 中	
26 完全着色葉の数	06 やや多	
27 着色葉の切れ込みの強弱	01 無又は弱	
28 完全着色葉の主脈の曲がりの強弱	01 無又は弱	
29 ほうの数	04 やや少	
30 最大ほうの長さ（葉柄を含む。）	03 短	
31 最大ほうの幅	02 かなり狭	
32 最大ほうの形	01 卵形	
33 ほうの表面の色数	01 1色	
34 ほうの表面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート N45B	

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1820

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）	
36 ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
37 ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
38 ほうの表面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
39 ほうの表面の斑点の強弱	01 無又は極弱
40 ほうの表面の斑点の色	
41 ほうの裏面の色（単色品種に限る。）	RHSカラーチャート 53C
42 ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）	
43 ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）	
44 ほうの裏面の三次色（大理石模様のある品種に限る。）	
45 ほうの裏面の斑点の色(斑点模様のある品種に限る。)	
46 ほうの主脈の巻き込みの有無	01 無
47 ほうのねじれの有無	01 無
48 ほうの葉脈間の縮れの強弱	01 無又は極弱
49 集散花序の幅	03 狭
50 蜜腺の大きさ	04 やや小
51 蜜腺の色	03 赤

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch x Euphorbia coranstra (Dressler) Radcl.-Sm.
Bonpri 1820

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31778号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 蜜線の変形の有無	01 無	
53 開花の早晩	04 やや早	

1 品種登録の番号及び年月日 第31779号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. たつひめ (タツヒメ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「たつひめ」は、対照品種「たつまる」と比較して、側小葉の形が三角形であること、熟さやの色の濃淡が中であること、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、裂きょうの難易が難であること、種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無が有であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、裂きょうの難易が難であること、子実のへその色が黄であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

高田吉丈 小松邦彦 佐山貴司 山下謙一郎 猿田正恭

7 出願公表の年月日 令和5年8月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「関東130号」に「たつまる」と「作系75号」のF1を交配し、選抜した品種である。

Glycine max (L.) Merr.

たつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	01 有限
04 側枝の数	07 多
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	01 灰白
07 茎の長さ	05 中
08 茎の節数	05 中
09 葉の表面の凹凸の強弱	03 弱
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	02 三角形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	07 濃
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	05 中
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.

たつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	08 かなり多
23 裂きょうの難易	07 難
24 熟さやの色の濃淡	05 中
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	05 中
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	01 黄白
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	09 有
32 子実のへその色	02 黄
33 胎座残の色	01 種皮と同じ
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

たつひめ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	06 やや晩
36 成熟期	05 中
37 生態型	02 中間型
38 粗タンパク含有率	06 やや高
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	08 全有
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	08 全有
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	03 抵抗性
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

Glycine max (L.) Merr.

たつひめ

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 7 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉焼病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31780号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. シルバーチャーミー (シルバーチャーミー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シルバーチャーミー」は、対照品種「雪ほたる」と比較して、葉脈の色が灰緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
廣野有香
愛知県知多郡美浜町大字野間字小松川10-11

6 登録品種の育成をした者の氏名
廣野有香

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
「雪ほたる」の変異株である。

Hedera L.
シルバーチャーミー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹性	01 つる性
02 茎の太さ	03 細
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎の色	03 緑褐
05 分枝性	06 やや密
06 節間長	03 短
07 葉全体の形	07 五角形
08 葉裂片の切れ込み程度	02 浅裂
09 葉裂片の切れ込み数	03 3 裂～5 裂
10 底裂片全体の形	04 半円形
11 側裂片全体の形	04 半円形
12 頂裂片全体の形	04 半円形
13 側裂片先端の形	04 円形
14 頂裂片先端の形	04 円形
15 葉基部の形	05 心形
16 葉のよじれ	01 無
17 葉縁の波打ち	02 やや有

Hedera L.
シルバーチャーミー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の形	01 全縁
19 葉身長	02 かなり短
20 葉身幅	04 やや狭
21 葉の厚さ	05 中
22 新葉の色	RHSカラーチャート 137A
23 成葉表面の色	RHSカラーチャート NN137B
24 成葉裏面の色	04 灰緑
25 葉色の季節変化	01 無
26 葉色の変化後の色	
27 葉脈の色	05 灰緑
28 葉柄の色	05 緑褐
29 斑の有無	09 有
30 斑のパターン	01 覆輪、03 掃込み斑
31 斑の色数	02 2色
32 葉の主たる斑色	RHSカラーチャート 2D (覆輪)
33 葉の2次の斑色	RHSカラーチャート N138C (掃込み斑)
34 斑色の変化性	03 不変

Hedera L.
シルバーチャーミー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 斑色の季節変化 36 斑色の変化後の色 37 成葉表面の光沢 38 成葉の毛 39 葉柄の毛 40 葉柄の長さ 41 気根の発生 42 到花の早晩	01 無
	03 弱
	01 無
	09 有
	03 短
	05 中
	(開花なし)

1 品種登録の番号及び年月日 第31781号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. ツインクルスター (ツインクルスター)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ツインクルスター」は、対照品種「ゴールデンチャイルド」と比較して、葉の主たる斑色が144Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
南原武博
鹿児島県薩摩郡さつま町柏原3265番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
南原武博

7 出願公表の年月日 令和4年8月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ピッツバーグ」の変異株である。

Hedera L.
ツインクルスター

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31781号
01 樹性	01 つる性	
02 茎の太さ	06 やや太	
03 茎の長さ	04 やや短	
04 茎の色	03 緑褐	
05 分枝性	07 密	
06 節間長	03 短	
07 葉全体の形	07 五角形	
08 葉裂片の切れ込み程度	03 中裂	
09 葉裂片の切れ込み数	04 5裂	
10 底裂片全体の形	05 三角形	
11 側裂片全体の形	05 三角形	
12 頂裂片全体の形	05 三角形	
13 側裂片先端の形	02 鋭形	
14 頂裂片先端の形	03 鈍形	
15 葉基部の形	05 心形	
16 葉のよじれ	01 無	
17 葉縁の波打ち	01 無	

Hedera L.
ツインクルスター

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31781号
18 葉縁の形 19 葉身長 20 葉身幅 21 葉の厚さ 22 新葉の色 23 成葉表面の色 24 成葉裏面の色 25 葉色の季節変化 26 葉色の変化後の色 27 葉脈の色 28 葉柄の色 29 斑の有無 30 斑のパターン 31 斑の色数 32 葉の主たる斑色 33 葉の2次の斑色 34 斑色の変化性	01 全縁	
	06 やや長	
	06 やや広	
	05 中	
	RHSカラーチャート 137A	
	RHSカラーチャート 139A	
	04 灰緑	
	09 有	
	RHSカラーチャート NN137A	
	03 淡緑	
	05 緑褐	
	09 有	
	01 覆輪、03 掃込み斑	
	02 2色	
	RHSカラーチャート 144C (覆輪)	
	RHSカラーチャート NN137D (掃込み斑)	
	03 不変	

Hedera L.
ツインクルスター

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31781号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31782号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum vulgare L. サンサンファイバー (サンファイバー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サンサンファイバー」は、対照品種「ユメサキボシ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること、 β グルカン含量が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「ワキシーフファイバー」と比較して、開閉花受粉性が閉花受粉性であること、穂の不稔小穂の発育が消失又は発育不全であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
伊藤 美環子 伴 雄介 加藤 啓太 野方 洋一 阿部 大吾 杉田 知彦 吉
岡藤治 小前 幸三 高橋飛鳥 柳澤 貴司 長嶺 敬

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「四R系3740」と「関系n574」を交配し、選抜したものである。

Hordeum vulgare L.
サンサンファイバー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 中間
02 稈の長さ	06 やや長
03 葉しょうの毛の有無	01 無
04 止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 植物体の反曲した止め葉の多少	03 少
06 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少	06 やや多
07 出穂期	03 早
08 芒の先端のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
09 開閉花受粉性	02 閉花受粉性
10 穂のろう質の多少	05 中
11 穂の向き	03 半立
12 草丈	05 中
13 穂の条数	01 2
14 穂の形	05 平行
15 穂の粒着の粗密	06 やや密
16 穂の長さ	06 やや長
17 芒の長さ	07 長

Hordeum vulgare L.
サンサンファイバー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 穂軸の長さ	05 中
19 穂軸の曲がりの強弱	01 無又は極弱
20 穂の不稔小穂の発育	01 消失又は発育不全
21 不稔小穂の向き	02 平行からやや先広
22 穀粒に比べた中央小穂の芒を含む護穎の長さ	02 等
23 穀粒の小穂軸の毛の型	02 長
24 穀粒のふの有無	01 無
25 穀粒の外穎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
26 穀粒の外穎背面内側面の脈沿いの突起の多少	01 無又は極少
27 穀粒の縦溝の毛の有無	01 無
28 穀粒のりん皮の着き方	02 抱え
29 穀粒の糊粉層の色	01 白色
30 うるち・もちの別	02 もち
31 穂発芽性	03 易
32 千粒重(原麦粒)	06 やや大
33 まき性	03 春まき性
34 穀粒硬度	08 かなり硬

Hordeum vulgare L.
サンサンファイバー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 麦芽エキスの多少（ビール用品種に限る。）	
36 コールバツハ数（ビール用品種に限る。）	
37 ジアスターゼ力（ビール用品種に限る。）	
38 穀粒のプロアントシアニジンの有無	09 有
39 穀粒のリポキシゲナーゼ（lox）活性の有無	
40 β グルカン含量	09 極多
41 D-ホルデインのHor-3座の遺伝子の発現	
42 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現1	
43 C-ホルデインのHor-1座の遺伝子の発現2	
44 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現1	
45 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現2	
46 B-ホルデインのHor-2座の遺伝子の発現3	

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 7 8 3 号 令和 8 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. LC N09

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「LC N09」は、対照品種「Vlasveld002」と比較して、茎の色が赤であること、葉身の先端部の形が鈍形であること、装飾花のがく片の重なりが中であること等で区別性が認められる。対照品種「KOLMAHIMA」と比較して、茎の色が赤であること、葉身の先端部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alex Frederick Schoemaker

7 出願公表の年月日 令和 3 年 3 月 1 1 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「DVPPinky」に「Dharuma」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	03 赤
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
LC N09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	02 赤
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	08 かなり高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	02 二列以上
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	04 やや少

Hydrangea L.
LC N09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	06 円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N09

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	01 白
59 花序の老化による桃又は赤の着色	03 花序全体に有
60 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31784号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. LC N014

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LC N014」は、対照品種「ライムライト」と比較して、装飾花のがく片の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alex Frederick Schoemaker

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Limelight」の自家受粉種子より選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
LC N014

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	02 4のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	01 無又は極弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N014

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 7 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 155A
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	02 花序の一部に有
60 開花始期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 7 8 5 号 令和 8 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. LC N015

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「LC N015」は、対照品種「BOKRAFLAME」と比較して、葉身の形が楕円形であること、装飾花のがく片の主な色が157Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Alex Schoemaker Living Creations Holding B.V.
Rijneveld 37, 2771XX Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alex Frederick Schoemaker

7 出願公表の年月日 令和 4 年 7 月 2 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Magical Candle」に「DVP Pinky」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
LC N015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	09 極高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	04 茶
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
LC N015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	05 円錐型
29 花序の高さ	09 極高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	09 極多

Hydrangea L.
LC N015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	02 4のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
LC N015

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 157A
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	02 花序の一部に有
60 開花始期	08 かなり晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31786号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. Allhygela

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Allhygela」は、対照品種「ALLHY1236」と比較して、葉の基部の形が心形であること、果実の二次色の有無の有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチキャンディ」と比較して、果実の色の区分がクリームであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Hypericum L.
Allhygela

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	03 低
03 樹幅	04 やや狭
04 枝のアントシアニン着色の有無	09 有
05 枝のアントシアニン着色の強弱	05 中
06 節間長	07 長
07 新葉のアントシアニン着色の有無	01 無
08 新葉のアントシアニン着色の強弱	
09 葉の着生角度	03 広い鋭角～直角
10 葉の長さ	06 やや長
11 葉の幅	06 やや広
12 葉の形	06 広卵形
13 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
14 葉の斑の有無	01 無
15 葉の斑の色	
16 葉の斑の模様	
17 葉の横断面の形	03 凸

Hypericum L.
Allhygela

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の先端の形	04 円形
19 葉の基部の形	05 心形
20 葉の香りの有無	09 有
21 花型	01 一重
22 花の大きさ	06 やや大
23 花弁の長さ	05 中
24 花弁の幅	05 中
25 花弁の形	02 楕円形
26 花弁の色	RHSカラーチャート 12A
27 花弁の開き方	03 下向き
28 花弁の重なり	03 重なる
29 花弁の湾曲	03 凹
30 やくの色	01 淡黄
31 花柱の長さ	03 短
32 果序の長さ	04 やや短
33 果序の幅	04 やや狭
34 果序の形	01 凹形

Hypericum L.
Allhygela

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31786号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がく片の長さ	07 長
36 がく片の幅	07 広
37 がく片のアントシアニン着色の有無	09 有
38 がく片のアントシアニン着色の強弱	05 中
39 がく片の反り	02 中
40 果序の果実の数	04 やや少
41 果実の長さ	07 長
42 果実の幅	07 広
43 果実の縦断面の形	07 広卵形
44 果実の横断面の形	02 三角形
45 果実の先端のくぼみの有無	09 有
46 果実の表面の粗滑（先端部を除く。）	02 溝あり
47 果実の色の区分	02 クリーム
48 果実の色の区分2	
49 果実の色の区分3	
50 果実の主な色	RHSカラーチャート 155B
51 果実の二次色の有無	09 有

Allhygela

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 7 8 6号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31787号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. ALLHYTIA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ALLHYTIA」は、対照品種「デリシャスピーチ」と比較して、花の大きさが中であること、がく片のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ALLLOCO」と比較して、果実の幅がかなり広であること、果実の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ALLYOKO」と比較して、果実の幅がかなり広であること、果実の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allplants Holding B.V.

Simon Homburgstraat 19, 5431NN Cuijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wim van den Hoogen

7 出願公表の年月日 令和5年6月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Hypericum L.
ALLHYTIA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	04 やや低
03 樹幅	03 狭
04 枝のアントシアニン着色の有無	09 有
05 枝のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 節間長	06 やや長
07 新葉のアントシアニン着色の有無	09 有
08 新葉のアントシアニン着色の強弱	01 極弱
09 葉の着生角度	02 鋭角
10 葉の長さ	05 中
11 葉の幅	06 やや広
12 葉の形	06 広卵形
13 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
14 葉の斑の有無	01 無
15 葉の斑の色	
16 葉の斑の模様	
17 葉の横断面の形	05 平

Hypericum L.
ALLHYTIA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の先端の形	03 鈍形
19 葉の基部の形	05 心形
20 葉の香りの有無	09 有
21 花型	01 一重
22 花の大きさ	05 中
23 花弁の長さ	05 中
24 花弁の幅	04 やや狭
25 花弁の形	02 楕円形
26 花弁の色	RHSカラーチャート 14A
27 花弁の開き方	02 水平
28 花弁の重なり	02 僅かに重なる
29 花弁の湾曲	03 凹
30 やくの色	01 淡黄
31 花柱の長さ	03 短
32 果序の長さ	04 やや短
33 果序の幅	04 やや狭
34 果序の形	03 凸形

Hypericum L.
ALLHYTIA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がく片の長さ	06 やや長
36 がく片の幅	07 広
37 がく片のアントシアニン着色の有無	09 有
38 がく片のアントシアニン着色の強弱	05 中
39 がく片の反り	01 無又は弱
40 果序の果実の数	05 中
41 果実の長さ	05 中
42 果実の幅	08 かなり広
43 果実の縦断面の形	04 円形
44 果実の横断面の形	02 三角形
45 果実の先端のくぼみの有無	09 有
46 果実の表面の粗滑（先端部を除く。）	02 溝あり
47 果実の色の区分	
48 果実の色の区分2	01 赤桃
49 果実の色の区分3	
50 果実の主な色	RHSカラーチャート 43D
51 果実の二次色の有無	09 有

Hypericum L.
ALLHYTIA

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 7 8 7号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31788号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinula edodes (Berk.) Pegler 大分林研き-2103 (オイトリンケンキ-2103)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「大分林研き-2103」は、対照品種「北研603号」と比較して、菌柄の形が基部に向かって太いであること、発生処理までの期間が極長であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、菌さんの縦断面の形が丸山形であること、ひだの並び方が直であること、ひだの高さが広であること、子実体の平均重量が中であること、発生処理までの期間が極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県

大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田千恵美 山下和久 甲斐充 宮本亮平 溝口泰広 川口真司 米倉邦明

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有菌株どうしをダイモン交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
大分林研き-2103

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	04 やや粗
02 菌そう表面の着色の有無	09 有
03 菌そう裏面の着色の有無	09 有
04 菌糸体の生長最適温度	03 中
05 菌さんの縦断面の形	03 丸山形
06 菌さんの直径	06 やや大
07 菌さんの厚さ	06 やや厚
08 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
09 菌さんの表面の主な色	03 褐色
10 菌さんの硬さ	01 軟
11 りん皮の付着部位	01 至る所
12 りん皮の大きさ	02 中
13 りん皮の着色の有無	09 有
14 ひだの有無	09 有
15 ひだの形	01 離柄形
16 ひだの並び方	01 直
17 ひだの高さ	04 広

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
大分林研き-2103

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ひだの密度	01 粗
19 ひだの色	01 白色
20 菌柄の形	01 基部に向かって太い
21 菌柄の長さ	04 やや短
22 菌柄の太さ	04 やや細
23 菌柄の主な色	03 淡橙色
24 菌柄の毛羽の粗密	03 密
25 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
26 菌柄の硬さ	04 やや硬
27 菌さんの直径の菌柄の長さに対する比	05 中
28 子実体の平均重量	05 中
29 発生処理までの期間	09 極長
30 発生処理から収穫最盛期までの期間	06 やや長

1 品種登録の番号及び年月日 第31789号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinula edodes (Berk.) Pegler 森Jh8号 (㊦Jh8コウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「森Jh8号」は、対照品種「KS24」と比較して、菌さんの直径／厚さがやや小であること、発生処理から収穫最盛期までの期間が長であること等で区別性が認められる。対照品種「KS32」と比較して、菌さんの直径がやや小であること、菌柄の硬さの中であること、子実体の平均重量が軽であること等で区別性が認められる。対照品種「森XR1号」と比較して、発生処理から収穫最盛期までの期間が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名
五十嵐祥友 中束賢讓

7 出願公表の年月日 令和7年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者保有株どうしを交配し、選抜したものである。

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
森Jh8号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	06 やや密
02 菌そう表面の着色の有無	09 有
03 菌そう裏面の着色の有無	01 無
04 菌糸体の生長最適温度	02 低
05 菌さんの縦断面の形	02 平形
06 菌さんの直径	04 やや小
07 菌さんの厚さ	05 中
08 菌さんの直径／厚さ	04 やや小
09 菌さんの表面の主な色	02 黄褐色
10 菌さんの硬さ	02 中
11 りん皮の付着部位	01 至る所
12 りん皮の大きさ	02 中
13 りん皮の着色の有無	09 有
14 ひだの有無	09 有
15 ひだの形	01 離柄形
16 ひだの並び方	02 ちぢれ
17 ひだの高さ	03 中

Lentinula edodes (Berk.) Pegler
森Jh8号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 ひだの密度	03 密
19 ひだの色	03 淡黄橙色
20 菌柄の形	02 円柱
21 菌柄の長さ	03 短
22 菌柄の太さ	04 やや細
23 菌柄の主な色	04 穏橙色
24 菌柄の毛羽の粗密	01 無又は粗
25 菌柄の毛羽の着色の有無	09 有
26 菌柄の硬さ	03 中
27 菌さんの直径の菌柄の長さに対する比	05 中
28 子実体の平均重量	03 軽
29 発生処理までの期間	03 短
30 発生処理から収穫最盛期までの期間	07 長

1 品種登録の番号及び年月日 第31790号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 夢ものがたり (ユメノガトリ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「夢ものがたり」は、対照品種「七彩」と比較して、成葉の主な色がN187Aであること、花卉の主な色がN74Aであること等で区別性が認められる。対照品種「紅彩」と比較して、成葉の主な色がN187Aであること、秋季の若葉の斑の色が72D, N187C(二次色)であること、花卉の主な色がN74Aであること等で区別性が認められる。対照品種「紅姫」と比較して、成葉の主な色がN187Aであること、秋季の若葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木祐司

埼玉県川口市木曽呂364番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木祐司

7 出願公表の年月日 令和元年12月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
 夢ものがたり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31790号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	06 やや高
03 樹幅	04 やや狭
04 側枝の粗密	03 中
05 成葉の葉身の長さ	05 中
06 成葉の葉身の幅	05 中
07 若葉の主な色	RHSカラーチャート 187A
08 若葉の斑の有無	09 有（全株の一部の葉に有）
09 若葉の斑の型	03 掃け込み
10 若葉の斑の色	RHSカラーチャート N77C, 186C（二次色）
11 成葉の主な色	RHSカラーチャート N187A
12 成葉の斑の有無	09 有（全株の一部の葉に有）
13 成葉の斑の型	03 掃け込み
14 成葉の斑の色	RHSカラーチャート N187B, 76C（二次色）
15 秋季の若葉の主な色	RHSカラーチャート N187A
16 秋季の若葉の斑の有無	09 有
17 秋季の若葉の斑の型	03 掃け込み

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

夢ものがたり

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31790号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 秋季の若葉の斑の色	RHSカラーチャート 72D, N187C(二次色)
19 秋季の成葉の主な色	RHSカラーチャート NN137A
20 秋季の成葉の斑の有無	09 有(全株の一部の葉に有)
21 秋季の成葉の斑の型	03 掃け込み
22 秋季の成葉の斑の色	RHSカラーチャート 159C, 148C(二次色)
23 一花序の花数	02 やや少
24 花序の直径	06 やや大
25 がくの色	RHSカラーチャート N78B
26 花の長さ	06 やや長
27 花弁の長さ	06 やや長
28 花弁の幅	03 中
29 花弁の反り	01 無又は極弱
30 花弁の主な色	RHSカラーチャート N74A
31 花弁の二次色の有無	01 無
32 花弁の二次色	

1 品種登録の番号及び年月日 第31791号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. YJ-7

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「YJ-7」は、対照品種「七彩」と比較して、花卉の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「紅彩」と比較して、秋季の若葉の斑の色が73B, N77C(二次色)であること、花卉の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木祐司

埼玉県川口市木曽呂364番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木祐司

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
YJ-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半直立
02 樹高	07 高
03 樹幅	05 中
04 側枝の粗密	03 中
05 成葉の葉身の長さ	04 やや短
06 成葉の葉身の幅	04 やや狭
07 若葉の主な色	RHSカラーチャート 187A
08 若葉の斑の有無	09 有（全株の一部の葉に有）
09 若葉の斑の型	03 掃け込み
10 若葉の斑の色	RHSカラーチャート 186C, N77C（二次色）
11 成葉の主な色	RHSカラーチャート 200A
12 成葉の斑の有無	01 無
13 成葉の斑の型	
14 成葉の斑の色	
15 秋季の若葉の主な色	RHSカラーチャート 200A
16 秋季の若葉の斑の有無	09 有
17 秋季の若葉の斑の型	03 掃け込み

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
YJ-7

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 秋季の若葉の斑の色	RHSカラーチャート 73B, N77C(二次色)
19 秋季の成葉の主な色	RHSカラーチャート N189A
20 秋季の成葉の斑の有無	09 有 (全株の一部の葉に有)
21 秋季の成葉の斑の型	03 掃け込み
22 秋季の成葉の斑の色	RHSカラーチャート 158D, N138C(二次色)
23 一花序の花数	03 中
24 花序の直径	06 やや大
25 がくの色	RHSカラーチャート 185D
26 花の長さ	05 中
27 花弁の長さ	05 中
28 花弁の幅	03 中
29 花弁の反り	01 無又は極弱
30 花弁の主な色	RHSカラーチャート 67B
31 花弁の二次色の有無	01 無
32 花弁の二次色	

1 品種登録の番号及び年月日 第31792号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 緑水 (リョクスイ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「緑水」は、対照品種「祝」と比較して、若葉の主な色が143Aであること、秋季の若葉の主な色が144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木祐司
埼玉県川口市木曽呂364番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木祐司

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
緑 水

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	03 開張
02 樹高	04 やや低
03 樹幅	04 やや狭
04 側枝の粗密	03 中
05 成葉の葉身の長さ	03 短
06 成葉の葉身の幅	02 かなり狭
07 若葉の主な色	RHSカラーチャート 143A
08 若葉の斑の有無	01 無
09 若葉の斑の型	
10 若葉の斑の色	
11 成葉の主な色	RHSカラーチャート 137A
12 成葉の斑の有無	01 無
13 成葉の斑の型	
14 成葉の斑の色	
15 秋季の若葉の主な色	RHSカラーチャート 144A
16 秋季の若葉の斑の有無	01 無
17 秋季の若葉の斑の型	

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.

緑 水

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 秋季の若葉の斑の色	
19 秋季の成葉の主な色	RHSカラーチャート 137A
20 秋季の成葉の斑の有無	01 無
21 秋季の成葉の斑の型	
22 秋季の成葉の斑の色	
23 一花序の花数	03 中
24 花序の直径	05 中
25 がくの色	RHSカラーチャート 145C
26 花の長さ	05 中
27 花弁の長さ	04 やや短
28 花弁の幅	02 やや狭
29 花弁の反り	01 無又は極弱
30 花弁の主な色	RHSカラーチャート 157D
31 花弁の二次色の有無	01 無
32 花弁の二次色	

1 品種登録の番号及び年月日 第31793号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lythrum salicaria L. ATMLYT01

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ATMLYT01」は、対照品種「エゾミソハギ（在来）」と比較して、花卉の波打ちが極強であること、花卉表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社厚目内農園
青森県黒石市浅瀬石字村元159-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

長崎輝久

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の Lythrum salicaria L.（在来系統）の自然交雑実生から選抜したものである。

Lythrum salicaria L.
ATMLYT01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	該当なし
02 植物体の大きさ	該当なし
03 茎の形状	茎の毛が粗で極短
04 茎の大きさ	茎の長さが63.4cm(±11.1)、茎の太さが3.7mm(±0.5)
05 茎の色彩	茎の色が黄緑(145A)
06 葉の形状	葉の形が長披針形、葉の表面の毛が極短
07 葉の大きさ	葉の長さが81.8mm(±11.1)、葉の幅が13.8mm(±3.1)
08 葉の色彩	葉の表面の色が緑(137A)
09 花の形状	花弁の波打ちが極強、花弁の形が長楕円形、花弁の先端部の形が鈍形
10 花の大きさ	頂花序の長さが20.0cm(±6.1)、頂花序の幅が29.3mm(±3.6)、がく筒の長さが7.5mm(±1.0)、花冠の長さが11.4mm(±2.2)、花冠の幅が19.8mm(±1.8)
11 花の色彩	がく筒の主な色が145B、花弁表面の主な色がNN155C
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし

Lythrum salicaria L.
ATMLYT01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
17 種子の色彩 18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし

1 品種登録の番号及び年月日 第31794号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mammillaria humboldtii C. Ehrenb. 小春日和 (コハルヒヨリ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「小春日和」は、対照品種「姫春星」と比較して、子株の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
曾田義則
愛知県豊川市野口町長万47番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
曾田義則

7 出願公表の年月日 令和4年12月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「姫春星」の変異株である。

Mammillaria humboldtii C. Ehrenb.

小春日和

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	該当なし
02 植物体の大きさ	株の高さが5.0cm(±0.39)、株の幅が7.9cm(±0.61)
03 茎の形状	子株の数が45.1個(±9.70)
04 茎の大きさ	子株の直径が2.0cm(±0.31)、棘座の直径が1.1mm(±0.15)
05 茎の色彩	子株の表面の緑色部の色が139A、子株の表面の斑の有無が有、子株の表面の斑の色が10B、棘座の色が12D
06 葉の形状	該当なし
07 葉の大きさ	棘の長さが1.6mm(±0.37)
08 葉の色彩	棘の色がNN155C
09 花の形状	該当なし
10 花の大きさ	該当なし
11 花の色彩	該当なし
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし
17 種子の色彩	該当なし

Mammillaria humboldtii C. Ehrenb.

小春日和

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 7 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし

1 品種登録の番号及び年月日 第31795号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mangifera indica L. ほほの香（林カ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ほほの香」は、対照品種「エドワード」と比較して、葉身の長さがやや長であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が無又は弱であること、完熟果の果皮の斑点の程度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「アーウィン」と比較して、完熟果の果皮の主な色1が橙と赤であること、開花始期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
文室政彦
滋賀県長浜市相模町1620-17

6 登録品種の育成をした者の氏名
文室政彦

7 出願公表の年月日 令和6年2月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
「エドワード」の自然交雑実生から選抜したものである。

Mangifera indica L.

ほほの香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 開張
02 幼葉のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 葉身の長さ	06 やや長
04 葉身の幅	05 中
05 葉身の長さ／幅	04 やや小
06 葉身の形	03 長楕円形
07 葉身の色	03 緑
08 葉身のねじれの有無	01 無
09 葉身の二次葉脈の間隔	04 やや狭
10 葉身の周縁の波打ちの強弱	01 無又は弱
11 葉身の基部の形	02 鈍形
12 葉身の先端の形	02 鋭先形
13 葉柄の着生角度	03 斜上
14 葉柄の長さ	02 かなり短
15 花穂の長さ	04 やや短
16 花穂の直径	05 中
17 花穂の長さ／直径	06 やや大

Mangifera indica L.

ほほの香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花穂の一次分枝の数	06 やや多
19 花穂の軸のアントシアニン着色の強弱	07 強
20 果実の長さ	06 やや長
21 果実の幅	07 広
22 果実の長さ／幅	07 大
23 果実の縦断面の形	03 卵形
24 果実の横断面の形	03 円形
25 果皮の色	03 黄と緑
26 果実の皮目の密度	05 中
27 果実の皮目と果皮色の対比	05 中
28 果実の皮目の大きさ	05 中
29 果実の表面のコルク化の有無	01 無
30 果実のこうあの深さ	02 中
31 果実のネックの有無	01 無
32 果実のネックの長さ	
33 果実腹面肩部の形	02 外側へ円形
34 果実背面肩部の形	01 上方へ円形

Mangifera indica L.

ほほの香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の腹面肩部の溝の長さ	01 無又は短
36 果実の腹面肩部の溝の深さ	01 無又は浅
37 果実の腹面肩部のふくらみの有無	01 無
38 果実の凹みの有無	09 有
39 果実の凹みの深さ	01 極浅
40 果嘴のふくらみの程度	01 無又は弱
41 果嘴の大きさ	01 無又は小
42 果柄の直径	03 小
43 完熟果の果皮の主な色1	09 橙と赤
44 完熟果の果皮の主な色2	
45 完熟果の果皮の斑点の程度	05 中
46 完熟果の果皮の厚さ	06 やや厚
47 完熟果の果皮のはく皮性の難易	05 中
48 完熟果の果肉の主な色	03 黄
49 完熟果の果肉の硬さ	03 軟
50 完熟果の果汁の多少	08 かなり多
51 完熟果の果肉の粗密	07 密

Mangifera indica L.

ほほの香

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 完熟果の核への繊維付着の多少	04 やや少
53 完熟果の果皮への繊維付着の多少	04 やや少
54 果実の松脂臭の有無	01 無
55 核表面の維管束の隆起	03 凸
56 胚の形	02 腎臓形
57 胚の数	01 単胚
58 開花始期	03 早
59 成熟期	03 早

1 品種登録の番号及び年月日 第31796号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Medicago sativa L. 北海若葉（ホッカワカバ）

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「北海若葉」は、対照品種「ウシモスキー」と比較して、秋期休眠性1が休眠評点3であること等で区別性が認められる。対照品種「ケレス」と比較して、秋期休眠性1が休眠評点3であること等で区別性が認められる。対照品種「ハルワカバ」と比較して、秋期休眠性1が休眠評点3であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

廣井清貞 佐藤広子 奥村健治

7 出願公表の年月日 令和3年12月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

集団選抜法により選抜した7系統から耐踏圧性に優れる48個体を隔離採種して育成したものである。

Medicago sativa L.
 北海若葉

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31796号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 秋の草型	07 ややほふく
02 は種当年の秋分から二週間後の草丈	05 中
03 は種当年の秋分から六週間後の草丈	05 中
04 春の草丈	05 中
05 開花始期	03 早
06 紫花を持つ株の割合	09 極高
07 複色花を持つ株の割合	01 無又は極低
08 白花を持つ株の割合	01 無又は極低
09 茎の長さ	05 中
10 一番刈り後の草丈	05 中
11 二番刈り後の草丈	05 中
12 三番刈り後の草丈	
13 四番刈り後の草丈	
14 は種翌年の秋分の二週間後の草丈	05 中
15 は種翌年の秋分の六週間後の草丈	05 中
16 秋期休眠性1	03 休眠評点3
17 秋期休眠性2	

Medicago sativa L.
北海若葉

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 バーティシリウム萎凋病抵抗性 19 ナミクキセンチュウ抵抗性 20 アルファルファ炭そ病抵抗性 21 フィトフトラ根腐病抵抗性 22 コンドウヒゲナガアブラムシ抵抗性 23 アルファルファアブラムシ抵抗性 24 アルファルファそばかす病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31797号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miscanthus Andersson HI-1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「HI-1」は、対照品種「ナンブNE」と比較して、草丈が低であること、葉群の高さがやや低であること、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「イリノイス」と比較して、草丈が低であること、葉群の高さがやや低であること、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「タカノハススキ」と比較して、草丈が低であること、葉群の高さがやや低であること、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
国立大学法人北海道大学
北海道札幌市北区北八条西五丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤平 榎原真二 貴島祐治 山田敏彦

7 出願公表の年月日 令和7年6月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「イリノイス」をコルヒチン処理し、染色体を倍加させたものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立
02 草丈	03 低
03 葉群の高さ	04 やや低
04 茎の数	04 やや少
05 稈の長さ	01 極短
06 節数	06 やや多
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
08 葉身の形	01 線形
09 葉身の反りの位置	01 先端部
10 葉身の横断面の形	02 内曲
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）	
17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）	

Miscanthus Andersson
HI-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 中肋の色	01 白
19 穂の形	(10月上旬までに出穂せず。形質 20～29について同様。)
20 穂の長さ	
21 穂の一次枝梗の数	
22 穂の一次枝梗の長さ	
23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）	
24 小穂の毛の長さ	
25 小穂の毛の色	
26 ほう穎の色	
27 芒の有無	
28 芒の長さ	
29 出穂期	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31798号 令和8年8月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Miscanthus Andersson x Tripsacum L. Mammoth
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Mammoth」は、対照品種「ナンブNM」と比較して、茎の数が中であること、穂の一次枝梗の数がかなり多であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「MB-1」と比較して、茎の数が中であること、穂の一次枝梗の長さがやや長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 35年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dutch Plant Force B.V.
Wattstraat 54, 2723RD Zoetermeer, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Dirk Degenhardt
- 7 出願公表の年月日 令和5年11月2日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のガマグラス属の育成系統とススキ属の育成系統を交配し、選抜したものである。

Miscanthus Andersson x Tripsacum L.
Mammoth

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立
02 草丈	09 極高
03 葉群の高さ	09 極高
04 茎の数	05 中
05 稈の長さ	09 極長
06 節数	09 極多
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
08 葉身の形	02 線状披針形
09 葉身の反りの位置	01 先端部
10 葉身の横断面の形	01 平
11 葉身の長さ	08 かなり長
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の表面の緑色の濃淡	05 中
14 葉身の斑の有無	01 無
15 葉身の斑の模様（斑のある品種に限る。）	
16 葉身の斑の色（斑のある品種に限る。）	
17 葉身の斑の割合（斑のある品種に限る。）	

Miscanthus Andersson x Tripsacum L.
Mammoth

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 7 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 中肋の色	01 白
19 穂の形	03 倒円錐状
20 穂の長さ	06 やや長
21 穂の一次枝梗の数	08 かなり多
22 穂の一次枝梗の長さ	06 やや長
23 小穂の長さ（毛、芒を除く。）	08 かなり長
24 小穂の毛の長さ	07 長
25 小穂の毛の色	05 紫
26 ほう穎の色	01 白
27 芒の有無	01 無
28 芒の長さ	
29 出穂期	07 晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31799号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ocimum basilicum L. 実存 (シツボン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「実存」は、対照品種「RED RUBIN」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花冠の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「イタリアンラージリーフ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花冠の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェノベーゼ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、花冠の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社あまつち
埼玉県さいたま市浦和区領家6-2-22-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

池ノ谷紘平

7 出願公表の年月日 令和6年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「イタリアンラージリーフ」に「ダークオパール」を交配し、選抜したものである。

Ocimum basilicum L.

実存

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31799号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
01 草姿	01 直立	
02 草丈	06 やや高	
03 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中	
04 茎の毛の多少	01 無又は極少	
05 葉身の形	02 卵形	
06 葉身の長さ	05 中	
07 葉身の幅	05 中	
08 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱	
09 葉身の表面のアントシアニン着色の分布		
10 葉身の裏面のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱	
11 葉身の裏面のアントシアニン着色の分布	02 基部	
12 葉身の緑色の濃淡（アントシアニン着色の分布が全面の品種を除く。）	03 中	
13 葉身の光沢の強弱	03 弱	
14 葉身の凹凸の強弱	04 やや弱	
15 葉身の横断面の形	01 凸	
16 葉身の周縁部の鋸歯の深さ	03 浅	
17 葉身の周縁部の波打ちの強弱	01 無又は極弱	

実存

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

(特性記録部157-91頁)

1 品種登録の番号及び年月日 第31800号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 越のかおり環1号（コシヒカリ環1号）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「越のかおり環1号」は、対照品種「越のかおり」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、胚乳のアミロース含量が9型であること、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒカリ環1号」と比較して、外穎先端の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
梶亮太 前田英郎 山口知哉 松下景 長岡一朗 金達英 笹原英樹 黒木慎 石川寛 安部匡

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「コシヒカリ環1号」に「越のかおり」を交配し、「越のかおり」を戻し交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	05 中
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	04 やや早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	05 中
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	04 やや短
31 穂数	05 中
32 芒の有無	01 無
33 初期の芒の色	
34 芒の分布	

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	03 褐
38 後期の芒の色	
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	07 穂軸の一部も概ね抽出
44 成熟期	04 やや早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	09 9型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	01 非崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	04 やや弱
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	05 中
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	05 中
75 穂いもちほ場抵抗性	04 やや弱
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	03 弱
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	01 日本水稻型(+)
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

Oryza sativa L.
越のかおり環1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31801号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. MINALL2

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MINALL2」は、対照品種「Hoogi016」と比較して、幼葉の表面の主な色が187Bであること、幼葉の裏面の主な色が184Bであること、成葉の裏面の主な色が183Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TUILAD」と比較して、成葉の裏面の主な色が183Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Seward」と比較して、成葉の裏面の主な色が183Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion S.A.S.

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Patrick Pineau

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Mindia」を交配し、選抜したものである。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINALL2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	01 極低
03 樹幅	02 かなり狭
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 187C
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	02 かなり短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の長さ／幅	05 中
10 葉身の先端部の形	01 鋭形
11 葉身の基部の形	03 心形
12 葉身の鋸歯の形	04 二重鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	05 中
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 187B
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 184B
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 187A
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート 183C

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINALL2

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31801号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31802号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physocarpus (Cambess.) Maxim. MINBLA3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MINBLA3」は、対照品種「TUILAD」と比較して、幼葉の裏面の主な色がN186Dであること、成葉の裏面の主な色がN186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Mindia」と比較して、幼葉の表面の主な色が187Aであること、幼葉の裏面の主な色がN186Dであること、成葉の裏面の主な色がN186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「MINALL2」と比較して、幼葉の表面の主な色が187Aであること、幼葉の裏面の主な色がN186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hortival Diffusion S.A.S.

les Fontaines de l'Aunay Beaufort-en-Vallee 49250 Beaufort-en-Anjou, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Patrick Pineau

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Mindia」を交配し、選抜したものである。

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINBLA3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 樹高	02 かなり低
03 樹幅	03 狭
04 新しょうのアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
05 枝の主な色	RHSカラーチャート 187A
06 枝の横断面の形	01 円形
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	03 狭
09 葉身の長さ／幅	05 中
10 葉身の先端部の形	01 鋭形
11 葉身の基部の形	03 心形
12 葉身の鋸歯の形	04 二重鋸歯状
13 葉身の切れ込みの深さ	07 深
14 幼葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 187A
15 幼葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート N186D
16 成葉の表面の主な色	RHSカラーチャート N187A
17 成葉の裏面の主な色	RHSカラーチャート N186D

Physocarpus (Cambess.) Maxim.
MINBLA3

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第 3 1 8 0 2 号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31803号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Saccharum L. KR12-316

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KR12-316」は、対照品種「Ni23」と比較して、節間部の稲妻屈曲の強弱が中であること、芽子の突出度（第二老化葉着生節）がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Ni22」と比較して、節間部の稲妻屈曲の強弱が中であること、芽子の突出度（第二老化葉着生節）がやや弱であること、原料茎の多少がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「NiF8」と比較して、節間部の稲妻屈曲の強弱が中であること、芽子の突出度（第二老化葉着生節）がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
樽本祐助 寺内方克 境垣内岳雄 服部太一郎 石川葉子 田中穰 早野美智子
安達克樹 梅田周 田村泰章 高橋宙之 大久保めぐみ 伊禮信 與那覇至

7 出願公表の年月日 令和7年6月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Ni23」に「NiN24」を交配し、選抜したものである。

Saccharum L.
KR12-316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	03 立葉
02 葉しょうの包含度	07 緊
03 発芽性	05 高
04 ほう芽性	04 やや高
05 初期伸長性	05 中
06 分げつ性	07 強
07 遅発茎数	03 少
08 葉群の疎密	05 中
09 葉群の緑色の濃淡	07 濃
10 仮茎長	07 長
11 節間長	06 やや長
12 節間部の長径	05 中
13 節間部の形	01 円筒型
14 節間部の横断面の形	01 円
15 節間部のずい孔率	06 やや大
16 節間部の複合色	RHSカラーチャート 187A
17 節間部の基本色	RHSカラーチャート 144A

Saccharum L.
KR12-316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 節間部の生長亀裂の深さ	01 無又は極浅
19 節間部の稲妻屈曲の強弱	05 中
20 節間部の茎皮硬度	05 中
21 節間部の茎皮表面の粗滑	03 滑
22 節間部のろう質物の多少	07 多
23 根帯の幅	04 やや狭
24 根帯の色	RHSカラーチャート 2C
25 ろう帯の幅	04 やや狭
26 芽子の形（芽翼を除く。）	06 円形
27 芽子の大きさ（芽翼を除く。）	06 やや広
28 芽子の突出度（第二老化葉着生節）	04 やや弱
29 芽溝の深さ	01 無又は極浅
30 芽溝の長さ	01 無又は極短
31 芽子先端部の生長帯に対する位置	02 中間部
32 芽子の毛の有無	09 有
33 芽子の毛の位置	02 先端部
34 芽子基部と葉しょう痕の間の広さ	01 無又は極狭

Saccharum L.
KR12-316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 芽翼の幅	06 やや広
36 葉しょうの長さ	05 中
37 葉しょうの毛群の多少	02 かなり少
38 葉しょうの毛群の長さ	02 かなり短
39 葉しょうの毛群の分布	01 背部のみ
40 葉舌の形	03 三日月型
41 葉舌の幅	02 中
42 葉舌の毛群の長さ	03 短
43 葉舌の毛群の疎密	04 やや疎
44 葉しょうの包合部下面の葉耳の形	02 三角型
45 葉しょうの包合部下面の葉耳の大きさ	04 やや小
46 葉しょうの包合部上面の葉耳の形	02 三角型
47 葉しょうの包合部上面の葉耳の大きさ	02 かなり小
48 肥厚帯の色	RHSカラーチャート 177B
49 葉身の反り	02 先端部反り
50 葉身の幅	05 中
51 中肋の幅	05 中

Saccharum L.
KR12-316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 葉身の幅に対する中肋の幅の比	05 中
53 葉身の長さ	05 中
54 葉身の周縁の毛の疎密	05 中
55 葉身の周縁の鋸歯の有無	01 無
56 しょう頭部の長さ	05 中
57 しょう頭部の横断面の形	01 円
58 しょう頭部の色	RHSカラーチャート 146A
59 しょう頭部のろう質物の多少	05 中
60 原料茎の長さ	06 やや長
61 茎径	04 中細
62 一茎重	04 やや軽
63 原料茎の多少	06 やや多
64 脱葉性	07 難
65 出穂性	01 無又は極少
66 登熟の早晩性	02 かなり早
67 糖分含量	08 かなり高
68 耐干性	05 中

Saccharum L.
KR12-316

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 黒穂病抵抗性	09 極強

1 品種登録の番号及び年月日 第31804号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. WNSVRDP23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WNSVRDP23」は、対照品種「BBSAL09001」と比較して、花冠筒部の主な色がN81Aであること、下唇弁の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「TL992」と比較して、ほうの主な色がN92Aであること、がくの主な色がN186Aであること、下唇弁の花冠筒部に対する向きがやや下垂であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Brent D. Barnes

7 出願公表の年月日 令和6年10月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Salvia L.
WNSVRDP23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 株幅	05 中
04 枝の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	04 強
06 茎の毛	03 中
07 葉の型	01 単葉
08 葉柄の長さ	08 かなり長
09 葉身の長さ	06 やや長
10 葉身の幅	08 かなり広
11 葉身の長さ／幅	03 小
12 葉身の最大幅の位置	01 かなり基部側
13 葉身の基部の形	04 切形
14 葉身の先端部の形	02 鋭形
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の主な色	06 緑
17 葉身の主な色2	

Salvia L.
WNSVRDP23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の二次色	
19 葉身の二次色2	
20 葉身の二次色の分布	
21 葉身の毛	01 無又は極粗
22 葉身の凹凸	04 強
23 葉身の周縁の鋸歯	03 中
24 葉身の周縁の波打ち	01 無又は弱
25 花序の長さ	05 中
26 花序の節間長	04 やや短
27 花序の1節当たりの小花の数	02 中
28 花序の側枝	01 無又は極少
29 花序の先端の向き	01 直立
30 ほうの残存性	03 中
31 ほうの長さ	03 中
32 ほうの主な色	RHSカラーチャート N92A
33 がくの長さ	04 やや長
34 がくの主な色	RHSカラーチャート N186A

Salvia L.
WNSVRDP23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの毛	01 無又は極粗
36 花冠の長さ	07 長
37 花冠の高さ	06 やや高
38 花冠筒部の長さ	04 やや長
39 花冠筒部の主な色	RHSカラーチャート N81A
40 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート N81A
41 上唇弁の二次色	
42 上唇弁の毛	02 粗
43 下唇弁の幅	02 やや狭
44 下唇弁の花冠筒部に対する向き	02 やや下垂
45 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート N81A
46 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート 84D
47 下唇弁の二次色の分布	01 基部
48 下唇弁の周縁の波打ち	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31805号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. TL990

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TL990」は、対照品種「メドーセージ」と比較して、茎のアントシアニンの着色が弱であること、茎の毛が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬

7 出願公表の年月日 令和6年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Salvia L.
TL990

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	07 高
03 株幅	06 やや広
04 枝の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	02 弱
06 茎の毛	02 粗
07 葉の型	01 単葉
08 葉柄の長さ	03 短
09 葉身の長さ	06 やや長
10 葉身の幅	05 中
11 葉身の長さ／幅	04 やや小
12 葉身の最大幅の位置	01 かなり基部側
13 葉身の基部の形	04 切形
14 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の主な色	06 緑
17 葉身の主な色2	

Salvia L.
TL990

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の二次色	
19 葉身の二次色2	
20 葉身の二次色の分布	
21 葉身の毛	01 無又は極粗
22 葉身の凹凸	02 弱
23 葉身の周縁の鋸歯	03 中
24 葉身の周縁の波打ち	01 無又は弱
25 花序の長さ	08 かなり長
26 花序の節間長	06 やや長
27 花序の1節当たりの小花の数	02 中
28 花序の側枝	01 無又は極少
29 花序の先端の向き	01 直立
30 ほうの残存性	04 強
31 ほうの長さ	03 中
32 ほうの主な色	RHSカラーチャート 144A
33 がくの長さ	04 やや長
34 がくの主な色	RHSカラーチャート N186A

Salvia L.
TL990

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの毛	01 無又は極粗
36 花冠の長さ	08 かなり長
37 花冠の高さ	06 やや高
38 花冠筒部の長さ	04 やや長
39 花冠筒部の主な色	RHSカラーチャート N89C
40 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート N89C
41 上唇弁の二次色	
42 上唇弁の毛	02 粗
43 下唇弁の幅	02 やや狭
44 下唇弁の花冠筒部に対する向き	02 やや下垂
45 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート N89D
46 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート 97D
47 下唇弁の二次色の分布	02 基部側1/3
48 下唇弁の周縁の波打ち	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31806号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. TL992

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TL992」は、対照品種「はまごろも1号」と比較して、茎のアントシアニンの着色が中であること、花冠筒部の主な色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬

7 出願公表の年月日 令和6年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Salvia L.
TL992

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 株幅	05 中
04 枝の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	03 中
06 茎の毛	02 粗
07 葉の型	01 単葉
08 葉柄の長さ	05 中
09 葉身の長さ	07 長
10 葉身の幅	07 広
11 葉身の長さ／幅	04 やや小
12 葉身の最大幅の位置	01 かなり基部側
13 葉身の基部の形	02 鈍形
14 葉身の先端部の形	02 鋭形
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の主な色	06 緑
17 葉身の主な色2	

Salvia L.
TL992

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の二次色	
19 葉身の二次色2	
20 葉身の二次色の分布	
21 葉身の毛	01 無又は極粗
22 葉身の凹凸	03 中
23 葉身の周縁の鋸歯	03 中
24 葉身の周縁の波打ち	01 無又は弱
25 花序の長さ	06 やや長
26 花序の節間長	05 中
27 花序の1節当たりの小花の数	02 中
28 花序の側枝	01 無又は極少
29 花序の先端の向き	03 横向き
30 ほうの残存性	04 強
31 ほうの長さ	03 中
32 ほうの主な色	RHSカラーチャート N79A
33 がくの長さ	04 やや長
34 がくの主な色	RHSカラーチャート N187A

Salvia L.
TL992

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの毛	01 無又は極粗
36 花冠の長さ	08 かなり長
37 花冠の高さ	05 中
38 花冠筒部の長さ	04 やや長
39 花冠筒部の主な色	RHSカラーチャート N81A
40 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート N81A
41 上唇弁の二次色	
42 上唇弁の毛	02 粗
43 下唇弁の幅	03 中
44 下唇弁の花冠筒部に対する向き	01 同じ
45 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート N81A
46 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート 84D
47 下唇弁の二次色の分布	03 中央部
48 下唇弁の周縁の波打ち	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31807号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. TL993

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TL993」は、対照品種「Wendys Wish」と比較して、茎のアントシアニンの着色が弱であること、上唇弁の毛が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
小山瞬

7 出願公表の年月日 令和6年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Salvia L.
TL993

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 株幅	03 狭
04 枝の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	02 弱
06 茎の毛	01 無又は極粗
07 葉の型	01 単葉
08 葉柄の長さ	04 やや短
09 葉身の長さ	05 中
10 葉身の幅	05 中
11 葉身の長さ／幅	03 小
12 葉身の最大幅の位置	01 かなり基部側
13 葉身の基部の形	04 切形
14 葉身の先端部の形	02 鋭形
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の主な色	06 緑
17 葉身の主な色2	

Salvia L.
TL993

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 1 8 0 7 号
18 葉身の二次色		
19 葉身の二次色2		
20 葉身の二次色の分布		
21 葉身の毛	01 無又は極粗	
22 葉身の凹凸	02 弱	
23 葉身の周縁の鋸歯	03 中	
24 葉身の周縁の波打ち	01 無又は弱	
25 花序の長さ	08 かなり長	
26 花序の節間長	06 やや長	
27 花序の1節当たりの小花の数	02 中	
28 花序の側枝	01 無又は極少	
29 花序の先端の向き	02 半直立	
30 ほうの残存性	04 強	
31 ほうの長さ	03 中	
32 ほうの主な色	RHSカラーチャート 178A	
33 がくの長さ	04 やや長	
34 がくの主な色	RHSカラーチャート 178A	

Salvia L.
TL993

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの毛	01 無又は極粗
36 花冠の長さ	07 長
37 花冠の高さ	04 やや低
38 花冠筒部の長さ	04 やや長
39 花冠筒部の主な色	RHSカラーチャート N74A
40 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート N74A
41 上唇弁の二次色	
42 上唇弁の毛	02 粗
43 下唇弁の幅	03 中
44 下唇弁の花冠筒部に対する向き	01 同じ
45 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート N74D
46 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート NN155B
47 下唇弁の二次色の分布	01 基部
48 下唇弁の周縁の波打ち	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31808号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Salvia L. WGSALTLRC

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「WGSALTLRC」は、対照品種「メドーセージ」と比較して、下唇弁の主な色が94Bであること等で区別性が認められる。対照品種「TL990」と比較して、茎の毛が密であること、下唇弁の主な色が94Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
WinGen, L.L.C.
6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Brent D. Barnes

7 出願公表の年月日 令和6年6月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統に「Cosquin」を交配し、選抜したものである。

Salvia L.
WGSALTBLC

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	05 中
03 株幅	02 かなり狭
04 枝の粗密	03 中
05 茎のアントシアニンの着色	03 中
06 茎の毛	04 密
07 葉の型	01 単葉
08 葉柄の長さ	03 短
09 葉身の長さ	05 中
10 葉身の幅	04 やや狭
11 葉身の長さ／幅	04 やや小
12 葉身の最大幅の位置	02 やや基部側
13 葉身の基部の形	04 切形
14 葉身の先端部の形	02 鋭形
15 葉身の斑の有無	01 無
16 葉身の主な色	06 緑
17 葉身の主な色2	

Salvia L.
WGSALTBLC

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の二次色	
19 葉身の二次色2	
20 葉身の二次色の分布	
21 葉身の毛	01 無又は極粗
22 葉身の凹凸	02 弱
23 葉身の周縁の鋸歯	03 中
24 葉身の周縁の波打ち	01 無又は弱
25 花序の長さ	05 中
26 花序の節間長	05 中
27 花序の1節当たりの小花の数	02 中
28 花序の側枝	01 無又は極少
29 花序の先端の向き	01 直立
30 ほうの残存性	03 中
31 ほうの長さ	02 短
32 ほうの主な色	RHSカラーチャート N186A
33 がくの長さ	03 中
34 がくの主な色	RHSカラーチャート N186A

Salvia L.
WGSALTBLCR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの毛	01 無又は極粗
36 花冠の長さ	08 かなり長
37 花冠の高さ	07 高
38 花冠筒部の長さ	04 やや長
39 花冠筒部の主な色	RHSカラーチャート N89C
40 上唇弁の主な色	RHSカラーチャート 94A
41 上唇弁の二次色	
42 上唇弁の毛	02 粗
43 下唇弁の幅	02 やや狭
44 下唇弁の花冠筒部に対する向き	02 やや下垂
45 下唇弁の主な色	RHSカラーチャート 94B
46 下唇弁の二次色	RHSカラーチャート 97D
47 下唇弁の二次色の分布	03 中央部
48 下唇弁の周縁の波打ち	01 無又は弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31809号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scindapsus pictus Hassk. オルモストシルバー (オルモストシルバー)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「オルモストシルバー」は、対照品種「ムーンライト」と比較して、基部葉の葉身の斑の分布が全体であること、基部葉の葉身の斑の型が均一であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

木村弘司

愛知県刈谷市半城土町丸山32-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村弘司

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有のS. pictus (在来系統) の変異株である。

Scindapsus pictus Hassk.
オルモストシルバー

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31809号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 茎の長さ	05 中
02 茎の太さ	03 中
03 茎の緑色の濃淡	03 中
04 基部葉の葉身の長さ	03 短
05 基部葉の葉身の幅	03 狭
06 基部葉の葉身の厚さ	02 やや薄
07 基部葉の葉身の先端部の形	02 鋭形
08 葉身の斑の有無	09 有
09 基部葉と比較した先端部葉の斑の変化	01 ほぼ変わらない
10 基部葉の葉身の斑の分布	06 全体
11 基部葉の葉身の斑の型	04 均一
12 基部葉の葉身の緑色の濃淡(緑色部がある品種に限る)	
13 基部葉の葉身の斑の色	RHSカラーチャート 191B
14 先端部葉の葉身の斑の分布	06 全体
15 先端部葉の葉身の斑の型	04 均一
16 基部葉の葉柄の長さ	04 やや長
17 基部葉の葉しょうの長さ／葉柄の長さ	04 やや大

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31810号 令和8年8月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. びっくり 丹丹 (ビッキリ タンタン)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「びっくり 丹丹」は、対照品種「華クインアール」と比較して、果肩部のひだの強弱が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 35年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
床枝健治
千葉県銚子市塚本町599番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
床枝健治
- 7 出願公表の年月日 令和2年4月13日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者のほ場で発見した「ヘルシーミディ」の偶発実生株の栽培を継続し、選抜したものである。

Solanum lycopersicum L.

びっくり 丹丹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニンの着色（種子繁殖性品種に限る。）	09 有
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	06 やや長
04 主茎の花房の多少（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	05 中
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	04 やや小
12 葉の緑色の濃淡	05 中
13 葉の光沢の強弱	05 中
14 葉の膨らみ	05 中
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	01 単一
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
びっくり 丹丹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛	09 有
19 果柄の離層	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層が有の品種に限る。）	04 やや短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	01 無
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	
24 幼果の地色の緑色の濃淡	02 かなり淡
25 幼果の緑色の縞模様	01 無
26 果実の大きさ	03 小
27 果実の長さ／直径	03 小
28 果実の縦断面の形	02 扁円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	03 弱
31 こうあ部のくぼみ	03 弱
32 へた落ちの大きさ	03 小
33 花落ちの大きさ	03 小
34 果頂部の形	03 平滑

Solanum lycopersicum L.

びっくり 丹丹

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31810号
35 果実に対する芯の大きさ	04 やや小	
36 果肉の厚さ	04 やや薄	
37 果実の子室数	03 3又は4	
38 果実の色	05 赤	
39 果肉の色	05 赤	
40 果実の表皮の光沢	02 中	
41 果実の表皮の色	02 黄色	
42 果実の硬さ	06 やや硬	
43 果実の棚持ちの長さ	03 短	
44 開花期	04 やや早	
45 完熟期	05 中	
46 糖度（可溶性固形物含量）	07 高	
47 酸度	05 中	
48 スクロース含有		
49 リコペン含有量		
50 GABA含有量		
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性		

Solanum lycopersicum L.
びっくり 丹丹

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 トマト黄化葉巻ウイルス抵抗性（イスラエル系統）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31811号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum tuberosum L. きたすずか (キタスヅカ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「きたすずか」は、対照品種「さやか」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合が高であること、幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱が強であること、花冠内面のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「男爵薯」と比較して、幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合が高であること、植物体の草高が中であること、花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合が中であること、ジャガイモシストセンチュウ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
片山健二 田宮誠司 浅野賢治 下坂悦生 赤井浩太郎 岡本智史 西中未央 津
田昌吾 奈良部孝 相場聡 坂田至

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Eden」に「十勝こがね」を交配し、選抜したものである。

Solanum tuberosum L.

きたすずか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 幼芽の大きさ	05 中
02 幼芽の形	02 卵形
03 幼芽の基部のアントシアニン着色の強弱	07 強
04 幼芽の基部のアントシアニン着色における青色の割合	03 高
05 幼芽の基部の毛の多少	03 少
06 幼芽の頂部の基部に対する大きさ	03 小
07 幼芽の頂部の型	03 中間
08 幼芽の頂部のアントシアニン着色の強弱	07 強
09 幼芽の頂部の毛の多少	02 かなり少
10 幼芽の根端の数	07 多
11 幼芽の側枝の長さ	03 短
12 植物体の草型	03 葉型
13 植物体の草姿	05 やや直立
14 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
15 複葉の大きさ	05 中
16 小葉の重なり	03 中間
17 二次小葉の出現度	05 中

Solanum tuberosum L.

きたすずか

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 複葉の緑色の濃淡	04 やや淡
19 複葉の表面の中肋のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
20 第二側小葉の長幅比	07 広
21 頂小葉と側小葉の合着の出現率	01 無又は極低
22 花芽のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 植物体の草高	05 中
24 花の数	04 やや少
25 花房の大きさ	05 中
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
27 花冠の大きさ	05 中
28 花冠内面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
29 花冠内面のアントシアニン着色における青色の割合	02 中
30 花冠内面のアントシアニン着色の広がり	06 やや大
31 やくの色	05 黄橙
32 早期肥大性	02 やや速
33 枯ちょう期	04 やや早
34 塊茎の形	01 円形

Solanum tuberosum L.

きたすずか

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31811号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 塊茎の目の数	02 少
36 塊茎の目の深さ	05 中
37 塊茎の皮色	01 淡ベージュ
38 塊茎の目の基部の色	01 白
39 塊茎の表皮のネット	02 かなり少
40 塊茎の肉色	01 白
41 塊茎の光反応による皮のアントシアニン着色の強弱（皮色が淡ベージュ及び黄の品種に限る。）	01 無又は極弱
42 休眠期間	05 中
43 上いも重	07 重
44 上いも数	04 やや少
45 上いもの平均重	07 重
46 肉質	03 中
47 ジャガイモシストセンチュウ抵抗性	09 有

1 品種登録の番号及び年月日 第31812号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vaccinium L. OBF0622

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「OBF0622」は、対照品種「Spartan」と比較して、果実の硬さがかなり硬であること、前年枝の果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「デューク」と比較して、果肉の色が淡緑であること、前年枝の果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ハンナズ CHOICE」と比較して、果実の硬さがかなり硬であること、前年枝の果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Oregon Blueberry Farms and Nursery
8474 Hazelgreen Road NE-Silverton, Oregon 97381, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
Robert Gabriel

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者の所有の品種不明の自然交配実生から選抜したものである。

Vaccinium L.
OBF0622

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	06 やや強
02 樹の大きさ	04 やや小
03 樹姿	01 立
04 前年枝の色	04 赤黄
05 前年枝の長さ	07 長
06 前年枝の節間長	08 かなり長
07 葉の長さ	06 やや長
08 葉の幅	07 広
09 葉の長さ／幅	03 小
10 葉の形	03 楕円形
11 葉の先端部の形	06 やや鈍形
12 葉の表面の色	02 緑
13 葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）	07 濃
14 葉の周縁の型	01 全縁
15 花芽のアントシアニン着色の強弱	05 中
16 花序の長さ	07 長
17 花冠の形	01 つぼ形

Vaccinium L.
OBF0622

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の色	03 淡緑白
19 花筒の大きさ	05 中
20 花筒のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
21 花筒の稜の有無	09 有
22 果房の着生密度	05 中
23 未熟果の緑色の濃淡	05 中
24 果実の大きさ	06 やや大
25 果実の縦断面の形	03 扁円形
26 果柄痕の大きさ	04 やや小
27 がくあの形	02 円
28 がく片の向き	01 立
29 がく片の反り方	02 平
30 がくあの直径	06 やや大
31 がくあの深さ	06 やや深
32 果粉の程度	06 やや強
33 果皮の色	03 濃青
34 果実の硬さ	08 かなり硬

Vaccinium L.
0BF0622

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果肉の色	03 淡緑
36 糖度	05 中
37 酸度	06 やや高
38 着果習性	01 前年枝のみ
39 裂果性	03 少
40 ほう芽期	05 中
41 前年枝の開花始期	06 やや晩
42 当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	
43 前年枝の果実の成熟期	06 やや晩
44 収穫期間	03 短
45 当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31813号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. Ridley 1212

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Ridley 1212」は、対照品種「ニューハノーバー」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）が濃であること、果肉の色が淡緑であること、酸度がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「エメラルド」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）が濃であること、酸度がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Mountain Blue Orchards Pty Ltd

1372A Bruxner Highway, Lindendale, New South Wales, 2480, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ridley William Bell

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Vaccinium L.
Ridley 1212

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31813号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	07 強
02 樹の大きさ	07 大
03 樹姿	03 開張
04 前年枝の色	04 赤黄
05 前年枝の長さ	04 やや短
06 前年枝の節間長	04 やや短
07 葉の長さ	06 やや長
08 葉の幅	05 中
09 葉の長さ／幅	04 やや小
10 葉の形	03 楕円形
11 葉の先端部の形	04 やや鋭形
12 葉の表面の色	02 緑
13 葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）	07 濃
14 葉の周縁の型	01 全縁
15 花芽のアントシアニン着色の強弱	07 強
16 花序の長さ	05 中
17 花冠の形	02 鐘形

Vaccinium L.
Ridley 1212

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の色	02 淡黄白
19 花筒の大きさ	04 やや小
20 花筒のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
21 花筒の稜の有無	09 有
22 果房の着生密度	06 やや密
23 未熟果の緑色の濃淡	03 淡
24 果実の大きさ	04 やや小
25 果実の縦断面の形	03 扁円形
26 果柄痕の大きさ	02 かなり小
27 がくあの形	02 円
28 がく片の向き	02 中間
29 がく片の反り方	02 平
30 がくあの直径	02 かなり小
31 がくあの深さ	05 中
32 果粉の程度	07 強
33 果皮の色	03 濃青
34 果実の硬さ	07 硬

Vaccinium L.
Ridley 1212

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果肉の色	03 淡緑
36 糖度	05 中
37 酸度	04 やや低
38 着果習性	01 前年枝のみ
39 裂果性	03 少
40 ほう芽期	04 やや早
41 前年枝の開花始期	03 早
42 当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	
43 前年枝の果実の成熟期	03 早
44 収穫期間	05 中
45 当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31814号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. Ridley 1607

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Ridley 1607」は、対照品種「ニューハノーバー」と比較して、果実の大きさが大であること、果肉の色が淡緑であること、酸度がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「Ridley 1212」と比較して、果実の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「エメラルド」と比較して、果実の大きさが大であること、酸度がやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Mountain Blue Orchards Pty Ltd

1372A Bruxner Highway, Lindendale, New South Wales, 2480, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ridley William Bell

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Ridley 1403」に「Ridley 4609」を交配し、選抜したものである。

Vaccinium L.
Ridley 1607

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹勢	08 かなり強
02 樹の大きさ	07 大
03 樹姿	02 斜上
04 前年枝の色	04 赤黄
05 前年枝の長さ	05 中
06 前年枝の節間長	06 やや長
07 葉の長さ	07 長
08 葉の幅	07 広
09 葉の長さ／幅	04 やや小
10 葉の形	03 楕円形
11 葉の先端部の形	05 中
12 葉の表面の色	02 緑
13 葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）	05 中
14 葉の周縁の型	01 全縁
15 花芽のアントシアニン着色の強弱	03 弱
16 花序の長さ	05 中
17 花冠の形	02 鐘形

Vaccinium L.
Ridley 1607

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花冠の色	02 淡黄白
19 花筒の大きさ	04 やや小
20 花筒のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
21 花筒の稜の有無	09 有
22 果房の着生密度	05 中
23 未熟果の緑色の濃淡	03 淡
24 果実の大きさ	07 大
25 果実の縦断面の形	03 扁円形
26 果柄痕の大きさ	05 中
27 がくあの形	02 円
28 がく片の向き	02 中間
29 がく片の反り方	02 平
30 がくあの直径	06 やや大
31 がくあの深さ	07 深
32 果粉の程度	07 強
33 果皮の色	03 濃青
34 果実の硬さ	07 硬

Vaccinium L.
Ridley 1607

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果肉の色	03 淡緑
36 糖度	05 中
37 酸度	04 やや低
38 着果習性	01 前年枝のみ
39 裂果性	03 少
40 ほう芽期	04 やや早
41 前年枝の開花始期	04 やや早
42 当年枝の開花始期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	
43 前年枝の果実の成熟期	04 やや早
44 収穫期間	03 短
45 当年枝の果実の成熟期（前年枝及び当年枝に着果する品種に限る）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31815号 令和8年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Xerochrysum Tzvelev Cream ヒロ Keisen (Cream ヒロ Keisen)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Cream ヒロ Keisen」は、対照品種「オーブ0379」と比較して、葉の長さが中であること、花らいの先端部の形が尖であること、総ほう内側の総ほう片中央部の主な色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
本多洋子
神奈川県伊勢原市板戸787番地の15

6 登録品種の育成をした者の氏名
本多洋子

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の品種どうしを交配し、選抜したものである。

Xerochrysum Tzvelev
Cream ヒロ Keisen

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	02 分枝型
02 草姿（分枝型に限る）	01 直立
03 草丈	05 中
04 葉群の高さ	05 中
05 株の粗密	05 中
06 茎の毛	01 無又は弱
07 葉の長さ	05 中
08 葉の幅	07 広
09 葉の長さ／幅	03 小
10 葉の最大幅の位置	02 中央部
11 葉の先端の形	02 鋭形
12 葉の斑	01 無
13 葉の表面の主な色	03 緑
14 葉の表面の毛	01 無又は弱
15 葉の裏面の毛	01 無又は弱
16 葉の外縁の波打	01 無又は弱
17 花茎の長さ	05 中

Xerochrysum Tzvelev
Cream ヒロ Keisen

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の分枝	02 中
19 花らいの先端部の形	01 尖
20 花らいの主な色	RHSカラーチャート 11B
21 頭花の葉群に対する位置	02 上
22 頭花の直径	04 やや小
23 側面から見た頭花の下部の形	01 凹
24 側面から見た頭花の上部の形	03 凸
25 頭花の総ほう片の数	05 中
26 総ほうの色数	01 1
27 総ほうの主な色	02 黄
28 総ほう片の長さ	05 中
29 総ほう片の幅	06 やや広
30 総ほう片の長さ／幅	03 幅の3倍
31 総ほう内側の総ほう片下部の主な色	RHSカラーチャート 2D
32 総ほう内側の総ほう片中央部の主な色	RHSカラーチャート 2D
33 総ほう内側の総ほう片の上部の主な色	RHSカラーチャート 2D
34 総ほう中央の総ほう片下部の主な色	RHSカラーチャート 2C

Xerochrysum Tzvelev
Cream ヒロ Keisen

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 総ほう中央の総ほう片中央部の主な色 36 総ほう中央の総ほう片上部の主な色 37 総ほう外側の総ほう片下部の主な色 38 総ほうの外側の総ほう片の中央部の主な色 39 総ほう外側の総ほう片上部の主な色 40 冠毛の色	RHSカラーチャート 2C
	RHSカラーチャート 2C
	RHSカラーチャート 155C
	RHSカラーチャート 2C
	RHSカラーチャート 185A
	01 白