

1 品種登録の番号及び年月日 第31881号 令和8年9月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. 夢雪 (ユメユキ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「夢雪」は、対照品種「園試系6」と比較して、むかごの数がかかなり多であること、葉身の葉脚部のくぼみの深さがやや浅であること、葉身の周縁のくびれの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「あおもり 短八」と比較して、むかごの数がかかなり多であること、葉身の葉脚部のくぼみの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター  
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

前嶋敦夫 對馬由記子 落合祐介 古川尊仁 鈴木聡 柳野利哉

7 出願公表の年月日 令和6年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「園試系6」の変異株である。

Dioscorea L.  
夢雪

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 葉の着生密度                                               | 06 やや密     |
| 02 分枝の数                                                 | 05 中       |
| 03 茎の太さ                                                 | 07 太       |
| 04 茎のアントシアニン着色の強弱                                       | 05 中       |
| 05 むかごの数                                                | 08 かなり多    |
| 06 むかごの大きさ                                              | 05 中       |
| 07 むかごの外皮の褐色の濃淡                                         | 07 濃       |
| 08 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 09 葉身の幅                                                 | 04 やや狭     |
| 10 葉身の長さ／幅                                              | 01 細長い     |
| 11 葉身の色                                                 | 04 濃緑      |
| 12 葉身の葉脚部のくぼみの深さ                                        | 04 やや浅     |
| 13 葉身の周縁のくびれの強弱                                         | 05 中       |
| 14 葉柄の長さ                                                | 03 短       |
| 15 いもの長さ                                                | 06 やや長     |
| 16 いもの幅                                                 | 04 やや狭     |
| 17 いもの縦断面の形                                             | 04 長楕円形    |

Dioscorea L.  
夢雪

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 1 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重            要            な            形            質   | 重要な形質に係る特性 |
| 18 いもの横断面の形                                             | 01 円形      |
| 19 いもの外皮の色                                              | 02 淡褐      |
| 20 いもの首部の長さ                                             | 04 やや短     |
| 21 いもの肉色                                                | 01 白       |
| 22 いもの肉の硬さ                                              | 01 軟       |
| 23 いもの粘度の強弱                                             | 01 弱       |
| 24 いもをすりおろした後の変色性(いもの肉色が白色又は<br>クリーム色の品種に限る。)           | 01 弱       |
| 25 雌雄性                                                  | 02 雄株      |
| 26 成熟期                                                  | 05 中       |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |
|                                                         |            |

1 品種登録の番号及び年月日 第31882号 令和8年9月7日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. えみほころ (エミコロ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「えみほころ」は、対照品種「むさしの26号」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「さとじまん」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「朝の光」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

埼玉県

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大岡直人 大戸敦也 武井由美子 荒川誠 矢ヶ崎健治 齋藤孝一郎 加藤徹

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「とちぎの星」に出願者所有の育成系統を交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.  
えみほころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 04 やや淡     |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 02 鋭形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 14 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 02 立～半立    |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 03 半立      |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
えみほころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 05 中       |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 06 やや太     |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 05 中       |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 06 やや長     |
| 31 穂数                                                   | 05 中       |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 01 先端のみ    |

Oryza sativa L.  
えみほころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 01 極短      |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 05 中       |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 06 やや晩     |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
えみほころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 2 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 05 中       |
| 54 粳の長さ                                                 | 05 中       |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 06 6 型     |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           | 01 非崩壊     |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
えみほころ

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 2 号 |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性       |
| 69 障害型耐冷性                                               | 05 中             |
| 70 穂発芽性                                                 | 07 難             |
| 71 耐倒伏性                                                 | 07 強             |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難             |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pia              |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 04 やや弱           |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 04 やや弱           |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |                  |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            | 04 やや弱           |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         | 03 外国稲型 (Stvb-i) |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      | 01 感受性群          |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |                  |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |                  |
| 82 グルテリン含量                                              |                  |
| 83 カドミウム吸収性                                             |                  |
| 84 高温登熟性                                                | 06 やや強           |
| 85 着粒密度                                                 | 05 中             |

Oryza sativa L.  
えみほころ

|                                                        |            |         |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| 登録品種の植物体の特性記録部                                         |            | 登録番号    |
|                                                        |            | 第31882号 |
| 重要な形質                                                  | 重要な形質に係る特性 |         |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性<br><br>87 セシウム吸収性 |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |
|                                                        |            |         |

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31883号 令和8年9月7日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Oryza sativa L. 弘大ライケット1号 (ヒロダライケット1ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「弘大ライケット1号」は、対照品種「まっしぐら」と比較して、稈の太さが中であること、籾の千粒重がやや小であること、着粒密度がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「みなゆたか」と比較して、稈の太さが中であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、障害型耐冷性が中であること、着粒密度がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「つがるロマン」と比較して、稈の太さが中であること、籾の千粒重がやや小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 35年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
株式会社ライケット  
青森県八戸市荒町22番地  
国立大学法人弘前大学  
青森県弘前市文京町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
河村泰輔 小寺健児 新山忠則 豊田伸一 石川隆二
- 7 出願公表の年月日 令和4年9月28日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「まっしぐら」に「恋ほのか」をを交配し、選抜したF5世代に再度「まっしぐら」を交配して選抜したものである。

Oryza sativa L.  
弘太ライケット1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱                                    | 01 無又は極弱   |
| 02 基部葉の葉しょうの色                                           | 01 緑       |
| 03 葉の緑色の濃淡                                              | 04 やや淡     |
| 04 葉のアントシアニン着色の有無                                       | 01 無       |
| 05 葉のアントシアニン着色の分布                                       |            |
| 06 葉しょうのアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱                                    |            |
| 08 葉身表面の毛じ                                              | 05 中       |
| 09 葉耳のアントシアニン着色の有無                                      | 01 無       |
| 10 葉の襟のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 11 葉舌の形                                                 | 03 裂形      |
| 12 葉舌の色                                                 | 01 無色      |
| 13 葉身の長さ                                                | 05 中       |
| 14 葉身の幅                                                 | 06 やや広     |
| 15 初期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 16 後期の止め葉の姿勢                                            | 01 立       |
| 17 稈の向き                                                 | 03 半立      |

Oryza sativa L.  
弘大ライケット1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）                                 |            |
| 19 出穂期                                                  | 04 やや早     |
| 20 雄性不稔性                                                | 01 無       |
| 21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 24 柱頭の色                                                 | 01 白       |
| 25 稈の太さ                                                 | 05 中       |
| 26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）                                       | 04 やや短     |
| 27 稈の節のアントシアニン着色の有無                                     | 01 無       |
| 28 稈の節のアントシアニン着色の強弱                                     |            |
| 29 稈の節間のアントシアニン着色の有無                                    | 01 無       |
| 30 穂の主軸の長さ                                              | 05 中       |
| 31 穂数                                                   | 05 中       |
| 32 芒の有無                                                 | 09 有       |
| 33 初期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 34 芒の分布                                                 | 04 上3/4のみ  |

Oryza sativa L.  
弘大ライケット1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 35 最長芒の長さ                                               | 02 短       |
| 36 外穎の毛じ                                                | 05 中       |
| 37 外穎先端の色                                               | 01 白       |
| 38 後期の芒の色                                               | 01 黄白      |
| 39 穂の主軸の湾曲度                                             | 03 垂れる     |
| 40 穂の二次枝梗の有無                                            | 09 有       |
| 41 穂の二次枝梗の型                                             | 02 2型      |
| 42 穂型                                                   | 02 紡錘形     |
| 43 穂の抽出度                                                | 09 穂軸もよく抽出 |
| 44 成熟期                                                  | 04 やや早     |
| 45 葉の枯れ上がりの時期                                           | 07 晩       |
| 46 穎の色                                                  | 01 黄白      |
| 47 穎の模様                                                 | 01 無       |
| 48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱                               | 01 無又は極弱   |
| 49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱                                | 01 無又は極弱   |
| 50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱                                 | 01 無又は極弱   |
| 51 護穎の長さ                                                | 05 中       |

Oryza sativa L.  
弘大ライケット1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 52 護穎の色                                                 | 01 黄白      |
| 53 粳の千粒重                                                | 04 やや小     |
| 54 粳の長さ                                                 | 04 やや短     |
| 55 粳の幅                                                  | 05 中       |
| 56 穎のフェノール反応の有無                                         | 01 無       |
| 57 穎のフェノール反応による着色の濃淡                                    |            |
| 58 玄米の千粒重                                               | 05 中       |
| 59 玄米の長さ                                                | 05 中       |
| 60 玄米の幅                                                 | 05 中       |
| 61 玄米の形                                                 | 02 長円形     |
| 62 玄米の色                                                 | 02 淡褐      |
| 63 胚乳の型                                                 | 03 粳       |
| 64 胚乳のアミロース含量                                           | 04 4型      |
| 65 胚乳の色                                                 | 02 白色半透明   |
| 66 精米のアルカリ崩壊性                                           |            |
| 67 玄米の香り                                                | 01 無又は極弱   |
| 68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）                                      |            |

Oryza sativa L.  
弘大ライケット1号

| 登 録 番 号<br>登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部<br>第 3 1 8 8 3 号 |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 重 要 な 形 質                                               | 重要な形質に係る特性 |
| 69 障害型耐冷性                                               | 05 中       |
| 70 穂発芽性                                                 |            |
| 71 耐倒伏性                                                 |            |
| 72 脱粒性                                                  | 07 難       |
| 73 いもち病抵抗性推定遺伝子型                                        | Pia, Pii   |
| 74 葉いもちほ場抵抗性                                            | 06 やや強     |
| 75 穂いもちほ場抵抗性                                            | 06 やや強     |
| 76 白葉枯病抵抗性品種群別                                          |            |
| 77 白葉枯病ほ場抵抗性                                            |            |
| 78 しま葉枯病抵抗性品種群別                                         |            |
| 79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別                                      |            |
| 80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型                                     |            |
| 81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）                                  |            |
| 82 グルテリン含量                                              |            |
| 83 カドミウム吸収性                                             |            |
| 84 高温登熟性                                                |            |
| 85 着粒密度                                                 | 06 やや密     |

Oryza sativa L.  
弘太ライケット1号

| 登 録 番 号                              |            |
|--------------------------------------|------------|
| 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部          |            |
| 第 3 1 8 8 3 号                        |            |
| 重 要 な 形 質                            | 重要な形質に係る特性 |
| 86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      | 87 セシウム吸収性 |
|                                      |            |
|                                      |            |
|                                      |            |