

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映しておりません。
出願等にあたっては、最新の重要な形質をご確認ください。

（以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html)

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等に変更されておりません。

リカステ属種苗特性分類審査基準（案）

重要形質 important character		定 義 description	調査方法 method of investigation
部位 part	形質区分 plant character		
草型 plant form	1. 草丈 size of plant	花茎の長さ又は（及び）葉の大きさに基づいた株全体の大きさ hole size based on the length of the flower spike and / or leaf	観察 observation
	2. 草 姿 overall plant shape	開花時の新葉の展開程度 presence / degree of leafing stage of the new leaf at flowering time	観察 observation
ぎ球茎 pseudobulb	3. ぎ球茎の有無 presence of pseudobulb	外見的なぎ球茎形成の有無 visual presence of pseudobulb	観察 observation
	4. 正面の形 shape from front	正面から見たぎ球茎の形 shape of pseudobulb as seen from the front	観察（図1） observation (fig.1)
	5. 横断面の形 shape of horizontal section	ぎ球茎最大幅部の横断面の形 shape of horizontal section of the widest part of pseudobulb	観察（図2） observation (fig.2)
	6. 溝（稜）の有無 presence of vallecure of pseudobulb	表面に出る溝の有無 presence of vallecure of pseudobulb surface	観察 observation

記 載 characteristics	階級 code	標 準 品 種 standard variety	備 考
極小 very small	1	Lyc. campbellii	
小 small	3	Lyc. brevispatha	
中 medium	5	Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'	
大 large	7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
極大 very large	9	Lyc. Brugensis	
葉が無い leafless	1	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
展葉初期 early leafing stage	5	Lyc. campbellii	
展葉終期 late leafing stage	7	Lyc. locusta	
展葉後 after leafing out	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
ほとんど無し almost absent	1		
有 present	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
I	3	Lyc. tricolor	
II	5	Lyc. ciliata	
III	7	Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'	
I	3	Lyc. campbellii	
II	5	Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'	
III	7		
無	1	Lyc. campbellii	
顕著	9	Lyc. tricolor	

ぎ球茎 pseudobulb	7. 高さ height	ぎ球茎基部から頂部までの高さ height of pseudobulb	実測 mm measurement
	8. 長径 major axis	ぎ球茎の最大幅 maximum width of pseudobulb	実測 mm measurement
	9. 色 color	表面の露出部の色 color of the exposed surface	観察
葉 leaf	10. 正面の形 shape of front	最大葉の葉身の形 shape of blade of the biggest leaf	観察 (図 3) observation (fig. 3)
	11. 先端の形 shape of apex	最大葉の先端の形 shape of apex of the biggest leaf	観察 (図 4) observation (fig. 4)

≦ 40	1	Lyc. campbellii	
41 ~ 65	2	Lyc. brevispatha	
66 ~ 90	3	Lyc. lmschootiana 'Gion'	
91 ~ 115	4	Lyc. Auburn 'Knowle Delight'	
116 ~ 140	5	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
141 ~ 165	6		
166 ~ 190	7	Ang. uniflora	
191 ~ 215	8	Ang. clowesii	
216 ≦	9		
≦ 25	1	Lyc. campbellii	
26 ~ 32	2		
33 ~ 39	3	Lyc. brevispatha	
40 ~ 46	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
47 ~ 53	5	Lyc. ciliata	
54 ~ 60	6	Lyc. Koolena 'Elva'	
61 ~ 67	7	Lyc. Auburn 'Knowle Delight'	
68 ~ 74	8	Lyc. Brugensis	
75 ≦	9	Lyc. Macama 'Jocelyn'	
黄	1		
黄緑	3	Lyc. aromatica	
緑	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
茶	7		
その他	9		
広線	1	Lyc. brevispatha	
線状披針	2	Lyc. macrophylla	
線状倒披針	3	Lyc. Koolena 'Elva'	
披針	4		
倒披針	5	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
長楕円	6	Lyc. ciliata	
楕円	7		
その他	9		
鋭先	1	Lyc. Brugensis	
不等鋭先	2	Lyc. Koolena 'Elva'	
鋭	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
不等鋭	4	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
突	5		
不等突	6		
鈍	7		
円	8		
凹	9		

葉 leaf	12. 葉縁の波打ち undulation of margin	葉縁の波打ちの程度 presence / degree of waving at the edges	観察 observation
	13. ねじれ twisting	葉身のねじれの程度 presence / degree of twisting in the blade	観察 observation
	14. 向き orientation	最大葉の基部から葉長の1/3 の部分と地 表との角度 angle of a third portion of the biggest leaf to the ground	観察 (図5) observation (fig.5)
	15. 幅 width	最大葉の最大幅部の長さ maximum width of the biggest leaf	実測 mm measurement
	16. 長さ length	最大葉の葉柄基部から先端までの長さ length from the base of petiole to the tip of the blade of the biggest leaf	実測 mm measurement
	17. 厚さ thickness	最大葉の主脈を含まない葉身部 の厚さ thickness of the blade excluding the midrib part of the biggest leaf	実測 mm measurement

無 弱 中 強	absent weak medium strong	1 3 5 7	Lyc. ciliata Lyc. Brugensis
無 弱 中 強	absent weak medium strong	1 3 5 7	Lyc. Brugensis Lyc. Auburn 'Knowle Delight' Angest. Olympus 'Los Osos'
直上 斜上 水平 下垂	erect assurgent horizontal pendulous	1 3 5 7	Ang. uniflora Lyc. fimbriata 'Endoh' Lyc. Auburn 'Greycriffe'
	≤ 30 31 ~ 50 51 ~ 70 71 ~ 90 91 ~ 110 111 ~ 130 131 ~ 150 151 ~ 170 171 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. locusta Lyc. ciliata Lyc. Balliae Lyc. Auburn 'Knowle Delight' Lyc. Macama 'Jocelyn' Lyc. Wyuna 'Pale Beauty' Lyc. Brugensis Lyc. Auburn 'Ditchling'
	≤ 200 201 ~ 300 301 ~ 400 401 ~ 500 501 ~ 600 601 ~ 700 701 ~ 800 801 ~ 900 901 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. ciliata Lyc. cruenta Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land' Lyc. Balliae Lyc. Wyuna 'Pale Beauty' Lyc. Koolena 'Excellency' Lyc. Auburn 'Knowle Delight'
	≤ 0.20 0.21 ~ 0.26 0.27 ~ 0.32 0.33 ~ 0.38 0.39 ~ 0.44 0.45 ~ 0.50 0.51 ~ 0.56 0.57 ~ 0.62 0.63 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. skinneri 'San Bar Snow Princess' Lyc. Balliae Lyc. lasioglossa Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. Macama 'Jocelyn' Lyc. macrophylla Lyc. Koolena 'Elva' Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'

葉 leaf	18. 斑の発現の時期 time of appearance of leaf variegation	斑の有無及び発現の時期 presence of variegation and time of appearance of variegation	観察 observation
	19. 斑の型 type of variegation	最大葉表面の模様による区分 type of variegation on the surface of the biggest leaf	観察 (図 6) observation (fig. 6)
	20. 表面の色 color of surface	最大葉表面の地の主要な色(地とは模様を除いた部分を指し、面積の大小にはこだわらない) predominant base color of the surface of the biggest leaf excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation	観察 observation
	21. 斑の色 color of variegation	斑の主たる色 predominant color of variegation	観察 observation
	22. 数 number	開花時の新葉の数 number of new leaves at flowering time	実測 measurement

無	absent	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
展葉期の一時期	between leafing stage	2		
成葉になってから	after leafing out	4		
常時かすかに出る	appear slightly every time	6		
常時明瞭に出る	appear clearly every time	8		
無	absent	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
虎	brindled	2		
縞	striped	3		
中	centered	4		
外	variegated outer part of a leaf	5		
爪	tipped	6		
砂子	dusted	7		
覆輪	marginated	8		
その他	others	9		
浅黄緑	pale yellow green	3	Lyc. Balliae Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'	
緑	green	5		
暗緑	dark green	7		
その他	others	9		
白色系	whitish	1		
黄色系	yellowish	3		
薄緑色系	yellow greenish	5		
暗緑色系	dark greenish	7		
その他	others	9		
0		1	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona' Lyc. Balliae Lyc. Imschootiana 'Gion' Lyc. Auburn 'Knowle Delight'	
1		2		
2		3		
3~4		5		
5~6		7		
7≤		8		

花序 inflorescence	23. 型 type	花序の型 type of the inflorescence	観察 observation
	24. 花数 number of flowers	1 花序内の総花蕾数 total number of flowers and buds on an inflorescence	実測 measurement
花茎 flower spike	25. 抽出方向 orientation	花茎の伸びる方向 angle of the spike to the ground surface	観察 observation
	26. 抽出部位 arising part	花茎の抽出する位置 part of pseudobulb from which the spike comes out	観察 observation
	27. 抽出数 number	1 ギ球茎から同時期に抽出する花茎数 total number of flower spikes arising simultaneously from a pseudobulb	実測 measurement
	28. 太さ thickness	花茎基部から第1花までの1/2 の長さの部位の太さ spike thickness at an approximately half way up the first flower	実測 mm measurement

単頂 single	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
総状 raceme	2		
その他 others	9		
= 1	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
2 ~ 3	2		
4 ~ 5	3		
6 ≤	4		
直上 erect	1	Ang. uniflora	
斜上 assurgent	4	Lyc. Brugensis	
直上又は斜上 erect or assurgent	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
その他 others	9		
充実したギ球茎の下部 under part of matured pseudobulb	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
形成中のギ球茎の下部 under part of newly forming pseudobulb	3		
その他 others	9		
= 1	1	Ang. clowesii	
2 ~ 5	2	Lyc. brevispatha	
6 ~ 10	3	Lyc. Brugensis	
11 ~ 15	4	Lyc. Auburn 'Knowle Delight'	
16 ~ 20	5	Lyc. tricolor	
21 ~ 25	6		
26 ≤	7		
≤ 1.0	1		
1.1 ~ 2.0	2	Lyc. tricolor	
2.1 ~ 3.0	3	Lyc. cruenta	
3.1 ~ 4.0	4	Lyc. Imschootiana 'Gion'	
4.1 ~ 5.0	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
5.1 ~ 6.0	6	Lyc. Macama 'Jocelyn'	
6.1 ~ 7.0	7	Ang. uniflora	
7.1 ~ 8.0	8	Ang. clowesii	
8.1 ≤	9		

花茎 flower spike	29. 長さ length	花茎基部から花序軸先端までの長さ length from the base of the spike to the tip of the inflorescence axis	実測 mm measurement
	30. 色 color	花茎(花序軸を含む)の色 color of the flower spike including the inflorescence axis	観察 observation
	31. 毛 hair	花茎(花序軸を含む)表面の毛の程度 presence / degree of hair of the surface of the flower spike includ- ing the inflorescence axis	観察 observation
苞葉 bract	32. 大きさ largeness	盛開時の花苞の有無または大きさ presence / largeness of floral bract at peak of blooming	観察 observation
	33. 色 color	盛開時の花苞の色 color of floral bract at peak of blooming	観察 observation
花 flower	34. 花 型 flower type	満開時の花被の展開による咲き方 flatness of flower when completely open	観察 observation

≤ 100	1	Lyc. aromatica
101 ~ 150	2	Lyc. Balliae
151 ~ 200	3	Lyc. Imschootiana 'Gion'
201 ~ 250	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
251 ~ 300	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'
301 ~ 350	6	
351 ~ 400	7	
401 ~ 450	8	Ang. uniflora
451 ≤	9	
白色系 whitish	1	
黄色系 yellowish	3	Lyc. Koolena 'Excellency'
緑色系 greenish	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'
褐色系 brownish	7	
その他 others	9	
無 absent	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'
短毛がある short-haired	5	Lyc. locusta
長毛がある long-haired	9	
無(早落性) absent (caducous)	1	
極小 very small	2	Lyc. campbellii
小 small	4	Lyc. Imschootiana 'Gion'
中 medium	6	Lyc. skinneri 'Mayumi'
大 large	8	
極大 very large	9	Ang. clowesii
白色系 whitish	3	
緑色系 greenish	5	Lyc. Koolena 'Elva'
茶色系 brownish	7	Lyc. Balliae
その他 others	9	
開かない closed	1	
抱え incurved	3	Ang. uniflora
部分抱え平 semi-incurved	4	Lyc. Imschootiana 'Gion'
部分抱え反転 semi-incurved and reflexed	5	Lyc. Wyld Court
平 flat	6	Lyc. skinneri 'Mayumi'
部分反転平 semi-reflexed	7	Lyc. Auburn 'Ditchling'
反転 reflexed	8	
その他 others	9	

花 flower	35. 向き orientation	ドーサルセパルの先端とラテラルセパルの先端を結んだ線が地表となす角度 angle of a line from the tip of dorsal sepal to the one of lateral sepals to the ground	観察 (図7) observation (fig.7)
	36. 横径 width	自然開張状態の最大幅 maximum width of the flower in its natural blooming state	実測 mm measurement
	37. 縦径 length	自然開張状態の最大長 maximum length of the flower in its natural blooming state	実測 mm measurement
	38. 花色 flower color	花がく片の色の概観 predominant color of sepals and petals	観察 observation
	39. 唇弁の色 color of lip	唇弁の色の概観 predominant color of lip	観察 observation

下向き 斜め下向き 正面向き 斜め上向き 上向き	directly downward obliquely downward at a right angle obliquely upward directly upward	1 3 5 7 9	Lyc. fimbriata 'Endoh' Lyc. Brugensis Lyc. cruenta Ang. clowesii
≤ 40 41 ~ 60 61 ~ 80 81 ~ 100 101 ~ 120 121 ~ 140 141 ~ 160 161 ~ 180 181 ≤		1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. campbellii Lyc. fimbriata 'Endoh' Lyc. aromatica Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona' Lyc. Wyuna 'Pale Beauty' Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. skinneri 'Mayumi'
≤ 30 31 ~ 45 46 ~ 60 61 ~ 75 76 ~ 90 91 ~ 105 106 ~ 120 121 ~ 135 136 ≤		1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. campbellii Lyc. tricolor Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona' Lyc. Wyuna 'Pale Beauty' Lyc. Balliae Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. Auburn 'Knowle Delight'
白 黄 緑 桃 赤 紫 茶 黒 複色	white yellow green pink red purple brown black mixed color	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. skinneri 'Mayumi' Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona' Lyc. locusta Lyc. Brugensis Lyc. Jackpot 'Dark Fire' Lyc. Island of Vulcorn Lyc. Aquila 'Detente' Lyc. Auburn 'Ditchling'
白 黄 緑 桃 赤 紫 茶 黒 複色	white yellow green pink red purple brown black mixed color	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Lyc. skinneri 'Mayumi' Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona' Lyc. locusta Lyc. tricolor Lyc. macrophylla Lyc. Jackpot 'Dark Fire' Lyc. Wyldfire 'Pink Sash'

ドーサルセ パル dorsal sepal	40. 正面の形 shape from the front	正面から見た形 shape as seen from the front	観察 (図8) observation (fig.8)
	41. 先端の形 shape of apex	先端部の形 shape of apex	観察 (図9) observation (fig.9)
	42. 横断面の形 shape of horizontal section	最大幅部の主脈に直角な切断面の形 shape of the section of the widest part taken at right angle to the midrib	観察 (図10) observation (fig.10)
	43. 縦断面の形 shape of ver- tical section	主脈に沿った切断面の形 shape of the section taken along the midrib	観察 (図11) observation (fig.11)
	44. 周縁の波打 ち undulation of margine	周縁部分の波打ちの程度 presence / degree of waving at the edges	観察 observation

広線	broad linear	1	Lyc. ciliata	
披針	lanceolate	2	Lyc. Auburn 'Greycriffe'	
倒披針	oblanceolate	3		
長楕円状披針	oblong lanceolate	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
長楕円	oblong	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
楕円	elliptical	6	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
卵状披針	ovate lanceolate	7	Lyc. locusta	
円	orbicular	8		
その他	others	9		
鋭先	acuminate	1	Lyc. cruenta	
鋭	acute	2	Lyc. aromatica	
突	cuspidate	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
微突	mucronate	4	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
鈍	obtuse	5		
円	rotundate	6		
切	truncate	7		
凹	emarginate	8		
その他	others	9		
I		1		
II		2	Lyc. aromatica	
III		3	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
IV		4	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
V		5	Lyc. campbellii	
VI		6	Ang. uniflora	
VII		7	Ang. clowesii	
VIII		8	Lyc. tricolor	
IX		9	Lyc. locusta	
I		1		
II		2	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
III		3	Angst. Olympus 'Los Osos'	
IV		4	Ang. uniflora	
V		5	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
VI		6	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	
VII		7	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
VIII		8	Lyc. tricolor	
IX		9		
無	absent	1	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
小	weak	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
中	medium	5	Ang. rueckeri	
大	strong	7	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	

ドーサルセ パル dorsal sepal	45. 幅 width	最大幅部の長さ maximum width	実測 mm measurement
	46. 長さ length	基部から先端までの長さ length from the base to the tip	実測 mm measurement
	47. 厚さ thickness	主脈部の厚さ thickness of the midrib part	観察 observation
	48. 内側の斑 variegation of inside	内側の斑の有無又は模様の型によ る区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色 の漸变的移行を表す) presence / type of variegation of the inside (‘gradated’ does’t mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	49. 内側の地 色 base color of inside	内側の地の主要な色 (地とは模様を除い た部分を指し、面積の大小にはこだわら ない) predominant base color of the in- side excluding variegation and ir- respective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャ ートによる measurement

≤ 10	1		
11 ~ 17	2	Lyc. aromatica	
18 ~ 24	3	Lyc. ciliata	
25 ~ 31	4	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	
32 ~ 38	5	Lyc. Aquila ‘Detente’	
39 ~ 45	6	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
46 ~ 52	7	Lyc. Macama ‘Jocelyn’	
53 ~ 59	8	Angst. Olympus ‘Los Osos’	
60 ≤	9		
≤ 20	1	Lyc. campbellii	
21 ~ 30	2	Lyc. aromatica	
31 ~ 40	3	Lyc. deppei	
41 ~ 50	4	Lyc. cruenta	
51 ~ 60	5	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	
61 ~ 70	6	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
71 ~ 80	7	Lyc. skinneri ‘Mayumi’	
81 ~ 90	8	Ang. rueckeri	
91 ≤	9		
薄い thin	2	Lyc. campbellii	
中程度 medium	4	Lyc. skinneri ‘Mayumi’	
厚い thick	6	Lyc. Jackpot ‘Dark Fire’	
無 absent	1	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	
点 spotted	2	Lyc. Auburn ‘Knowle Delight’	
爪 tipped	3	Lyc. Balliae	
切り separated	4		
楔 cuneated	5	Lyc. Jackpot ‘Dark Fire’	
覆輪 margined	6	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
縞 striped	7	Lyc. Koolena ‘Excellency’	
その他 others	8		
ぼかし gradated	9	Lyc. Aquila ‘Detente’	

ドーサルセ パル dorsal sepal	50. 内側の斑の 色 variegation color of in- side	内側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the inside	実測 カラーチャ ートによる measurement
	51. 外側の斑 variegation of outside	外側の斑の有無又は模様の型によ る区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色 の暫变的移行を表す) presence / type of variegation of the outside ('gradated' does't mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	52. 外側の地 色 base color of outside	外側の地の主要な色 (地とは模様を除い た部分を指し、面積の大小にはこだわら ない) predominant base color of the out- side excluding variegation and ir- respective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャ ートによる measurement
	53. 外側の斑の 色 variegation color of out- side	外側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the outside	実測 カラーチャ ートによる measurement
ラテラルセ パル lateral sepal	54. 正面の形 shape from front	正面から見た形 shape as seen from the front	観察 (図13) observation (fig.13)

無	absent	1	Lyc. cruenta
点	spotted	2	
爪	tipped	3	Lyc. Imschootiana 'Gion'
切り	separated	4	
楔	cuneated	5	Lyc. skinneri 'Mayumi'
覆輪	marginied	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'
縞	striped	7	Lyc. tricolor
その他	others	8	Lyc. Balliae
ぼかし	gradated	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'
広線	broad linear	1	Lyc. lasioglossa
長楕円状披針	oblong lanceolate	2	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
長楕円状倒披針	oblong oblanceolate	3	Lyc. Auburn 'Greycriffe'
長楕円	oblong	4	Lyc. Auburn 'Ditchling'
卵	ovate	5	Lyc. Koolena 'Excellency'
倒卵	obovate	6	Anbcst. Olympus 'Los Osos'
かま	drepaniform	7	Lyc. ciliata
不等ひし	unequal rhombate	8	Ang. clowesii
その他	others	9	Lyc. tricolor

砂 子

かま状広線

ラテラルセ パル lateral sepal	55. 先端の形 shape of apex	先端部の形 shape of apex	観察 (図9) observation (fig. 9)
	56. 横断面の形 shape of horizontal section	最大幅部の主脈に直角な切断面の形 shape of the section of the widest part taken at right angle to the midrib	観察 (図10) observation (fig. 10)
	57. 縦断面の形 shape of ver- tical section	主脈に沿った切断面の形 shape of the section taken along the midrib	観察 (図11) observation (fig. 11)
	58. 周縁の波打 ち undulation at margine	周縁部分の波打ちの程度 presence / degree of waving at the edges	観察 observation
	59. 幅 width	最大幅部の長さ maximum width	実測 mm measurement

鋭先	acuminate	1	
鋭	acute	2	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
突	cuspidate	3	Lyc. Macama 'Jocelyn'
微突	mucronate	4	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'
鈍	obtuse	5	Lyc. ciliata
円	rotundate	6	
切	truncate	7	
凹	emarginate	8	
その他	others	9	Lyc. cruenta
I		1	
II		2	
III		3	Lyc. Auburn 'Ditchling'
IV		4	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'
V		5	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
VI		6	Lyc. Balliae
VII		7	Angcst. Olympus 'Honey'
VIII		8	Lyc. tricolor
IX		9	Ang. rueckeri
I		1	Ang. rueckeri
II		2	
III		3	Angcst. Olympus 'Los Osos'
IV		4	Lyc. locusta
V		5	Lyc. aromatica
VI		6	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'
VII		7	Lyc. Auburn 'Ditchling'
VIII		8	Lyc. Balliae
IX		9	
無	absent	1	Lyc. Koolena 'Elva'
小	weak	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'
中	medium	5	Lyc. deppei
大	strong	7	Lyc. Balliae
≤ 10		1	Lyc. campbellii
11 ~ 17		2	Lyc. tricolor
18 ~ 24		3	Lyc. ciliata
25 ~ 31		4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
32 ~ 38		5	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'
39 ~ 45		6	Lyc. Auburn 'Ditchling'
46 ~ 52		7	Lyc. skinneri 'Mayumi'
53 ~ 59		8	Angcst. Olympus 'Los Osos'
60 ≤		9	

ラテラルセ パル lateral sepal	60. 長さ length	基部から先端までの長さ length from the base to the tip	実測 mm measurement
	61. 厚さ thickness	主脈部の厚さ thickness of the midrib part	観察 observation
	62. 内側の斑 variegation of inside	内側の斑の有無又は模様の型によ る区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色 の暫变的移行を表す) presence / type of variegation of the inside ('gradated' does't mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	63. 内側の地 色 base color of inside	内側の地の主要な色 (地とは模様を除い た部分を指し、面積の大小にはこだわら ない) predominant base color of the in- side excluding variegation and ir- respective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャ ートによる measurement
	64. 内側の斑の 色 variegation color of inside	内側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the inside	実測 カラーチャ ートによる measurement

≤ 20	1	Lyc. campbellii	
21 ~ 30	2		
31 ~ 40	3	Lyc. aromatica	
41 ~ 50	4	Lyc. tricolor	
51 ~ 60	5	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
61 ~ 70	6	Lyc. Wyuna 'Pale Beauty'	
71 ~ 80	7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
81 ~ 90	8	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
91 ≤	9		
薄い thin	2	Lyc. campbellii	
中程度 medium	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
厚い thick	6	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
無 absent	1	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
点 spotted	2	Lyc. Auburn 'Knowle Delight'	
爪 tipped	3	Lyc. Aquila 'Detente'	
切り separated	4		
楔 cuneated	5	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
覆輪 margined	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
縞 striped	7	Lyc. Koolena 'Excellency'	
その他 others	8		
ぼかし gradated	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'	

ラテラルセ バル lateral sepal	65. 外側の斑 variegation of outside	外側の斑の有無又は模様の型によ る区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色 の暫变的移行を表す) presence / type of variegation of the outside ('gradated' does't mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	66. 外側の地 色 base color of outside	外側の地の主要な色 (地とは模様を除 いた部分を指し、面積の大小にはこだわ らない) predominant base color of the out- side excluding variegation and ir- respective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャ ートによる measurement
	67. 外側の斑の 色 variegation color of out- side	外側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the outside	実測 カラーチャ ートによる measurement
ペタル petal	68. 正面の形 shape from front	正面から見た形 shape as seen from the front	観察 (図14) observation (fig.14)
	69. 先端の形 shape of apex	先端部の形 shape of apex	観察 (図9) observation (fig. 9)

無	absent	1	Lyc. cruenta	砂 子
点	spotted	2		
爪	tipped	3	Lyc. Imschootiana 'Gion'	
切り	separated	4		
楔	cuneated	5	Lyc. Aquila 'Detente'	
覆輪	marginied	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
縞	striped	7	Lyc. tricolor	
その他	others	8	Lyc. Balliae	
ぼかし	gradated	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
線状披針	linear lanceolate	1	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
広線	broad linear	2	Lyc. locusta	
長楕円状倒披針	oblong oblanceolate	3	Lyc. ciliata	
卵状披針	ovate lanceolate	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
長楕円	oblong	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
倒卵	obovate	6	Lyc. Koolena 'Excellency'	
楕円	elliptic	7	Angcst. Olympus 'Blush'	
ひし	rhombate	8	Ang. rueckeri	
その他	others	9		
鋭先	acuminate	1	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
鋭	acute	2	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	
突	cuspidate	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
微突	mucronate	4	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
鈍	obtuse	5	Lyc. ciliata	
円	rotundate	6	Lyc. macrophylla	
切	truncate	7		
凹	emarginate	8		
その他	others	9		

ペタル petal	70. 横断面の形 shape of horizontal section	最大幅部の主脈に直角な切断面の形 shape of the section of the widest part taken at a right angle to the midrib	観察 (図10) observation (fig.10)
	71. 縦断面の形 shape of vertical section	主脈に沿った切断面の形 shape of the section taken along the midrib	観察 (図11) observation (fig.11)
	72. 周縁の波打ち undulation of margine	周縁部分の波打ちの程度 presence / degree of waving at the edges	観察 observation
	73. 幅 width	最大幅部の長さ maximum width	実測 mm measurement
	74. 長さ length	基部から先端までの長さ length from the base to the tip	実測 mm measurement

I	1		
II	2		
III	3	Ang. uniflora	
IV	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
V	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
VI	6	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	
VII	7	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
VIII	8		
IX	9	Ang. rueckeri	
I	1		
II	2	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
III	3	Angst. Olympus 'Los Osos'	
IV	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
V	5	Lyc. locusta	
VI	6	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
VII	7	Lyc. Koolena 'Elva'	
VIII	8	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
IX	9	Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'	
無	1	Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'	
小	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
中	5	Lyc. Balliae	
大	7		
≤ 10	1		
11 ~ 15	2	Lyc. fimbriata 'Endoh'	
16 ~ 20	3	Lyc. cruenta	
21 ~ 25	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
26 ~ 30	5	Lyc. Aquila 'Detente'	
31 ~ 35	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
36 ~ 40	7	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
41 ~ 45	8	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
46 ≤	9	Ang. rueckeri	
≤ 10	1		
11 ~ 18	2		
19 ~ 26	3	Lyc. campbellii	
27 ~ 34	4	Lyc. aromatica	
35 ~ 42	5	Lyc. Auburn 'Greycriffe'	
43 ~ 50	6	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
51 ~ 58	7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
59 ~ 66	8	Angst. Olympus 'Los Osos'	
67 ≤	9		

ペタル petal	75. 厚さ thickness	主脈部の厚さ thickness of the midrib part	観察 observation
	76. 内側の斑 variegation of inside	内側の斑の有無又は模様の型による区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色の暫变的移行を表す) presence / type of variegation of the inside (‘gradated’ does’t mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	77. 内側の地色 base color of inside	内側の地の主要な色 (地とは模様を除いた部分を指し、面積の大小にはこだわらない) predominant base color of the inside excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャートによる measurement
	78. 内側の斑の色 variegation color of inside	内側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the inside	実測 カラーチャートによる measurement
	79. 外側の斑 variegation of outside	外側の斑の有無又は模様の型による区分 (ぼかしは模様の型ではなく、色の暫变的移行を表す) presence / type of variegation of the outside (‘gradated’ does’t mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)

薄い thin	2	Lyc. campbellii	
中程度 medium	4	Lyc. Koolena ‘Elva’	
厚い thick	6	Lyc. Brugensis	
無 absent	1	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	
点 spotted	2	Lyc. Auburn ‘Knowle Delight’	
爪 tipped	3	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
切り separated	4	Lyc. macrophylla	
楔 cuneated	5	Lyc. Macama ‘Jocelyn’	
覆輪 margined	6	Lyc. ciliata	
縞 striped	7	Lyc. Koolena ‘Excellency’	縞状の点
その他 others	8	Lyc. Koolena ‘Elva’	
ぼかし gradated	9	Lyc. Macama ‘Jocelyn’	
無 absent	1	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	
点 spotted	2	Lyc. brevispatha	
爪 tipped	3	Lyc. Koolena ‘Excellency’	
切り separated	4	Lyc. Auburn ‘Greycriffe’	
楔 cuneated	5	Lyc. Macama ‘Jocelyn’	
覆輪 margined	6	Lyc. Shoalhaven ‘Orchid Land’	
縞 striped	7		
その他 others	8		
ぼかし gradated	9	Lyc. Macama ‘Jocelyn’	

ペタル petal	80. 外側の地色 base color of outside	外側の地の主要な色（地とは模様を除いた部分を指し、面積の大小にはこだわらない） predominant base color of the outside excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャートによる measurement
	81. 外側の斑の色 variegation color of outside	外側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the outside	実測 カラーチャートによる measurement
リップ lip	82. 正面の形 shape from front	正面から見たリップ中央裂片の形（自然開張状態） shape of the mid-lobe of lip as seen from the front (natural blooming state)	観察（図15） observation (fig.15)
	83. 幅 width	正面から見たリップの最大幅部の長さ（自然開張状態） maximum width of lip as seen from the front in natural blooming state	実測 mm measurement
	84. 長さ length	正面から見たリップの縦径（自然開張状態） longitudinal length of lip as seen from the front in natural blooming state	実測 mm measurement

I	1	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
II	2	Lyc. Brugensis	
III	3	Lyc. Aquila 'Detente'	
IV	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
V	5	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	
VI	6	Lyc. Macama 'Jocelyn'	
VII	7		
VIII	8	Ang. clowesii	
その他	9		
≤ 5	1		
6 ~ 9	2	Lyc. campbellii	
10 ~ 13	3	Lyc. cruenta	
14 ~ 17	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
18 ~ 21	5	Lyc. Shoalhaven 'Orchid Land'	
22 ~ 25	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
26 ~ 29	7		
30 ~ 33	8		
34 ≤	9		
≤ 10	1	Lyc. campbellii	
11 ~ 14	2	Lyc. tricolor	
15 ~ 18	3	Lyc. aromatica	
19 ~ 22	4	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
23 ~ 26	5	Lyc. Aquila 'Detente'	
27 ~ 30	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
31 ~ 34	7	Lyc. Imschootiana 'Gion'	
35 ~ 38	8	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
39 ≤	9	Lyc. fimbriata 'Endoh'	

リップ lip	85. 付属物の有無 presence of appendages	リップ表面の付属物の有無及び種類 presence / type of the appendages on the lip	観察 observation
	86. 内側の斑 variegation of inside of lip	中央裂片を除くリップ内面の斑の型による区分(ぼかしは模様の型ではなく、色の暫變的移行を表す) presence / type of variegation of the inside of the lip excluding the mid-lobe (‘gradated’ does’t mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察(図12) observation (fig.12)
	87. 内側の地色 base color of inside	リップ内側の主な地色(地とは斑を除いた部分を指し、面積の大小にはこだわらない) predominant base color of the inside of the lip excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャートによる measurement
	88. 内側の斑の色 variegation color of inside	リップ内側の主たる斑の色 predominant variegation color of the inside of the lip	実測 カラーチャートによる measurement
	89. 外側の色 color of outside	リップ外側の主たる色 predominant color of the outside of the lip	実測 カラーチャートによる measurement
	90. 側裂片 side-lobe	側裂片の有無及び形成程度 presence / degree of side-lobe formation	観察 observation

無	absent	1		
隆起線	lamellas	2	Lyc. locusta	
平板状	flat callus	3	Lyc. Aquila ‘Detente’	
角状突起	corniform process	4	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
短毛	short-haired	5	Lyc. Jackpot ‘Dark Fire’	
長毛	long-haired	6	Lyc. skinneri ‘Mayumi’	
ビロード状毛	velutinous-haired	7	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
その他	others	9	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’	皿形
無	absent	1	Lyc. koolena ‘Excellency’	
点	spotted	2	Lyc. Jackpot ‘Dark Fire’	
爪	tipped	3	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
切り	separated	4		
楔	cuneated	5	Lyc. ciliata	
覆輪	marginated	6	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
縞	striped	7	Lyc. skinneri ‘Mayumi’	
その他	others	8	Ang. rueckeri	
ぼかし	gradated	9	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	
無	absent	1		
不明確	unclear	4	Lyc. Wyong ‘Cosmo Snow’	
明確	clear	7	Lyc. Auburn ‘Ditchling’	

リップ lip	91. 側裂片の 巻き込み curving inward of side-lobe	側裂片の最大巻き込み部分での巻き込み の程度 degree of curving inward at the most curved part of the side-lobe	観察 (図16) observation (fig.16)
	92. 先端の形 shape of apex	中央裂片の先端を押し広げた時の形 shape of apex of mid-lobe	観察 (図9) observation (fig. 9)
	93. 周縁の 切れ込み lobation of margin	中央裂片の周縁部の切れ込みの有無 presence of the lobation of margine of the mid-lobe	観察 observation
	94. 周縁の波 打ち undulation of margin	中央裂片の周縁部の波打ちの有無 presence of waving at the edges of the mid-lobe	観察 observation
	95. 中央裂片の 毛の有無 presence of hair of mid- lobe	中央裂片の毛の有無及び程度 presence / degree of hair of the mid-lobe	観察 observation

I	1		
II	2		
III	3		
IV	4	Lyc. Koolena 'Elva'	
V	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
VI	7	Ang. uniflora	
その他	9		
鋭先	acuminate	1	
鋭	acute	2	Ang. clowesii
突	cuspidate	3	
微突	mucronate	4	Angest. Olympus 'Los Osos'
鈍	obtuse	5	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
円	rotundate	6	Lyc. Auburn 'Ditchling'
切	truncate	7	Lyc. macrophylla
凹	emarginate	8	Lyc. Koolena 'Excellency'
その他	others	9	
無	absent	1	Ang. clowesii
浅い	shallow	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'
深い	deep	7	Lyc. ciliata
無	absent	1	Ang. clowesii
小	weak	3	Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'
中	medium	5	Lyc. Auburn 'Ditchling'
大	strong	7	
無	absent	1	Lyc. locusta
短疎毛	sparsely short-haired	2	
ビロード状毛	velutinous-haired	3	Lyc. Auburn 'Ditchling'
短密毛	densely short-haired	4	Ang. clowesii
長疎毛	sparsely long-haired	6	
長密毛	densely long-haired	8	Lyc. lasioglossa
その他	others	9	

リップ lip	96. 中央裂片 内側の斑 variegation of inside of mid- lobe	中央裂片内側の斑の有無又は模様の型による区分(ぼかしは模様の型ではなく、色の暫变的移行を表わす) presence / type of variegation of inside of the mid-lobe (‘gradated’ does’t mean a type of variegation, but gradual shift of color)	観察 (図12) observation (fig.12)
	97. 中央裂片 内側の地色 base color of inside of mid- lobe	中央裂片内側の地の主要な色(地とは模様を除いた部分を指し、面積の大小にはこだわらない) predominant base color of the inside of the mid-lobe excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation	実測 カラーチャートによる measurement
	98. 中央裂片 内側の斑の色 variegation color of inside of mid- lobe	内側の斑の主たる色 predominant color of variegation of the inside of the mid-lobe	実測 カラーチャートによる measurement
	99. 中央裂片 外側の色 color of out- side of mid- lobe	中央裂片外側の主たる色 predominant color of the outside of the mid-lobe	実測 カラーチャートによる measurement
	100. メンタム mentum	メンタムの有無及び形成程度 presence / degree of mentum formation	観察 observation
ずい柱 column	101. 側面の形 shape from side	右側面から見たずい柱の形 shape of column as seen from the right side	観察 (図17) observation (fig.17)

無	absent	1	Lyc. Auburn ‘Knowle Delight’
点	spotted	2	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’
爪	tipped	3	Angst. Olympus ‘Los Osos’
楔	cuneated	4	
覆輪	marginated	5	
切り	separated	6	Lyc. Koolena ‘Excellency’
縞	striped	7	Lyc. skinneri ‘Mayumi’
その他	others	8	Ang. rueckeri
ぼかし	gradated	9	Lyc. skinneri ‘Mayumi’
無	absent	1	Lyc. Imschootiana ‘Gion’
不明確	unclear	4	Lyc. Macama ‘Endoh’
明確	clear	7	Ang. rueckeri
I		1	Lyc. Mem. Bill Congleton ‘Corona’
II		3	Lyc. Auburn ‘Knowle Delight’
III		5	Lyc. Shoalhaven ‘Orchid Land’
IV		6	Lyc. locusta
V		7	Angst. Olympus ‘Los Osos’
VI		8	Ang. clowesii
その他		9	

ずい柱 column	102. 毛の有無 presence of hair	ずい柱表面の毛の有無および程度 presence/degree of hair on the surface of the column	観察 observation
	103. 色 color	ずい柱腹面の主たる色 predominant color of ventral side of column	実測 カラーチャ ートによる measurement
	104. 葯帽の色 color of anther cap	葯帽の主たる色 predominant color of anther cap	実測 カラーチャ ートによる measurement
花全体につ いての特記 事項 special character- istics of flower as whole	105. 花の香り flower fragrance	花の香りの有無及び程度 presence / degree of fragrance	
	106. 花色 flower color	花色についての特記事項の有無 presence of special color character- istics	
	107. 花被片強さ strength of tepal	花がく弁の擦り傷に対する強さ resistance to scratch of tepal	
生態的特記 事項 growth habits	108. 開花期 blooming season	通常の栽培条件下での開花期 blooming season under normal growing condition	

無	absent	1	Lyc. campbellii	
一部に短毛がある	short-haired on a partial surface	2	Angcst. Olympus 'Los Osos'	
一部に長毛がある	long-haired on a partial surface	4	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
ほぼ全体に短毛がある	short- haired on almost whole surface	6	Lyc. Aquila 'Detente'	
ほぼ全体に長毛がある	long- haired on almost whole surface	8	Lyc. aromatica	
その他	others	9		
無	absent	1	Lyc. campbellii	
弱	weak	3	Lyc. Aquila 'Detente'	
強	strong	7	Lyc. aromatica	
有	absent	1	Lyc. Island of Vulcorn	有の場合は 具体的に記 入
無	present	9	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
弱	low	3	Lyc. skinneri 'Mayumi'	
中	medium	5	Angcst. Olympus 'Los Osos'	
強	high	7	Lyc. Jackpot 'Dark Fire'	
夏	summer	1	Lyc. ciliata	
秋	autumn	2		
初冬	early winter	3	Lyc. Wyong 'Cosmo Snow'	
冬	winter	4	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
初春	early spring	5	Lyc. Brugensis	
春	spring	6	Angcst. Olympus 'Los Osos'	
初夏	early summer	7	Lyc. campbellii	
四季	perpetual	8		
不定期	irregular	9	Lyc. macrophylla	

生態的特記 事項 growth habits	109. 花命 flower life	一花の開花期間 blooming divation of single flower	日 day
	110. 開花期間 blooming period	花序全体における開花期間 duration of blooming of inflo- rescence as a whole	週間 week
	111. 耐寒性 resistance to cold		
	112. 耐暑性 resistance to heat		
	113. 耐日焼け 性 tolerance to light		
	114. 耐病性 resistance to disease		
	115. 害虫抵抗 性 resist- ance to pest		
	116. 分けつ性 multiplica- tion	新芽の発生数 number of new buds	

1 ~ 3 4 ~ 10 11 ~ 17 18 ~ 21 22 ≤	1 2 3 4 5	Lyc. ciliata Lyc. campbellii Lyc. aromatica Lyc. Auburn 'Ditchling'	
< 1 1 ~ 2 3 ~ 4 5 ~ 6 7 ~ 8 9 ≤	1 2 3 4 5 6	Lyc. ciliata Lyc. campbellii Lyc. aromatica Lyc. Brugensis Lyc. Auburn 'Ditchling'	
弱 low 中 medium 強 high	3 5 7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
弱 low 中 medium 強 high	3 5 7	Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. Mem. Bill Congleton 'Corona'	
弱 low 中 medium 強 high	3 5 7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
弱 low 中 medium 強 high	3 5 7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
弱 low 中 medium 強 high	3 5 7	Lyc. Auburn 'Ditchling'	
少 few 中 medium 多 many	3 5 7	Lyc. Auburn 'Greycriffe' Lyc. Auburn 'Ditchling' Lyc. aromatica	




図1. 正面から見たぎ球茎の形 (shape from the front of pseudobulb)




図2. ぎ球茎最大幅部の横断面の形 (shape of horizontal section of the widest part of pseudobulb)




図3. 最大葉の葉身の形 (shape of blade of the biggest leaf)




図4. 最大葉の先端の形 (shape of apex of the biggest leaf)




図5. 最大葉の基部から葉長の $1/3$ の部分と地表との角度
(angle of a third portion of the biggest leaf to the ground)




図6. 最大葉表面の模様による区分 (type of variegation on the surface of the biggest leaf)




図7. ドーサルセパルの先端とラテラルセパルの先端を結んだ線が地表となす角度 (angle of line from the tip of dorsal sepal to the one of lateral sepals to the ground)




図8. ドーサルセパルの正面の形 (shape from the front of dorsal sepal)




図9. セパル、ペタル、リップの先端部の形 (shape of apex of sepals, petals and a lip)




図10. セパル、ペタルの最大幅部の主脈に直角な切断面の形
(shape of the section of the widest part taken at right angle to the mid rib)




図12. セパル、ペタル、リップの斑 (variegation of sepals, petals and a lip)




図13. ラテラルセパルの正面から見た形 (shape from the front of lateral sepals)




図11. セパル、ペタルの主脈に沿った切断面の形 (shape of the section taken along the midrib)




図14. 正面から見た形 (shape from the front of petals)




図15. 正面から見たリップ中央裂片の形 (自然開張状態)
(shape from the front of mid-lobe of lip (natural blooming state))




図16. 側裂片の最大巻き込み部分での巻き込みの程度
(degree of curving inward at the most curved part of the side-lobe)




図17. 右側面から見たずい柱の形 (shape from the right side of column)