

### 水稻の作柄に関する委員会（令和元年度第 2 回）の意見

#### 1 気象の推移・予報等からみた作柄への影響

- (1) 気温・日照時間は、6 月までは平年を上回って推移し、7 月上中旬に低温・日照不足傾向となったものの、7 月下旬以降は天候が回復し、気温・日照時間ともに平年を上回って推移した。

また、台風・前線の影響により大雨や日照不足となった地域がある一方で、台風に伴うフェーン現象により高温となった地域もあった。

今後 1 か月程度の天候の見通しでは、気温については、平年並みから高い、日照時間については、平年並みか少ないと予想されている。

- (2) 本年の水稻は、早場地帯ではもみ数が平年以上に確保されると見込まれ、遅場地帯の生育は平年並みからやや不良で推移している中で、7 月上中旬の低温・日照不足による穂数・もみ数への影響、7 月下旬以降の高温のほか、8 月中旬以降が日照不足となった地域では、登熟、品質等へ与える影響が懸念される。

また、台風・集中豪雨・フェーン等による影響も懸念されるほか、いもち病、トビイロウンカ、斑点米カメムシ類等の発生が多いと予想されている地域もある。

#### 2 次回の調査に当たって留意すべき事項

- (1) 早場地帯においては、7 月上中旬の低温・日照不足によるもみ数への影響を見極めるとともに、出穂後の高温のほか、8 月中旬以降が日照不足となった地域では、登熟や品質に及ぼす影響について留意する必要がある。
- (2) 遅場地帯においては、7 月上中旬の低温・日照不足による穂数・もみ数への影響を見極めるとともに、7 月下旬以降の高温のほか、8 月中旬以降が日照不足となった地域では、登熟に及ぼす影響について留意する必要がある。
- (3) 台風や集中豪雨による冠水・倒伏等の被害、台風によるフェーンが発生した地域では、その影響を見極める必要があるとともに、今後の台風や集中豪雨等による作柄への影響にも留意する必要がある。
- (4) いもち病、トビイロウンカ、斑点米カメムシ類等の病虫害の発生が多いと予想される地域においては、その発生状況に留意する必要がある。

#### 3 次回のもみ数確定期調査の調査期日

本年の水稻の出穂状況は、一部で遅い地域もあるが、全般的にはおおむね平年並みと見込まれることから、次回のもみ数確定期調査は、例年どおり 9 月 15 日現在とすることが適当と考える。

#### 【参考】水稻の作柄に関する委員会委員

- (座長) 雨 宮 宏 司 農林水産・食品産業技術振興協会 理事長  
荒 井 裕見子 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構次世代作物開発研究センター  
稲研究領域稲栽培生理ユニット 主任研究員  
黒 田 栄 喜 国立大学法人岩手大学 名誉教授  
竹 川 元 章 気象庁地球環境・海洋部気候情報課 予報官  
平 澤 正 国立大学法人東京農工大学 名誉教授  
山 岸 順 子 国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科生産・環境生物学専攻作物学研究室  
教授  
吉 永 悟 志 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター  
生産体系研究領域 領域長