（資料４）

欧州で承認・使用されている鳥インフルエンザワクチン

EU の承認ワクチン

品名	製造販売業者	ワクチンタイプ	対象	用法用量	DIVA 性能
Nobilis Influenza H5N2	MSD Animal Health	不活化ワクチン（H5N2）	鶏	８日齢～14 日齢の場合は皮下接種、14 日齢以上の場合は皮下または筋肉内接種（初回接種４～６週後に２回目接種）	区別不可（野外株の N 抗原が N2 以外なら可）
Innovax-ND-H5 （2024.5 承認）	MSD Animal Health	七面鳥ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝ（ﾏﾚｯｸ、ND、H5 抗原発現）	鶏	発育鶏卵（18-19 日）卵内接種 又は１日齢の雛の頚部皮下に１回接種	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）
Vectormune HVT-AIV （2025.3 承認）	CEVA	七面鳥ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝ（ﾏﾚｯｸ、H5 抗原発現）	鶏	雛の皮下に１回接種	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）
Vaxxitek HVT-IBD-H5 （2025.11 例外的状況下の販売承認）	Boehringer Ingelheim	七面鳥ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽﾍﾞｸﾀｰﾜｸﾁﾝ（ﾏﾚｯｸ、IBD、H5 抗原発現）	鶏 七面鳥	発育鶏卵（18 日）卵内接種 又は１日齢の雛の皮下に１回接種	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）
Vaxxinact H5 （2025.12 承認）	Boehringer Ingelheim	HPAI H5 抗原の組換えﾀﾝﾊﾟｸ質ﾜｸﾁﾝ	鶏、七面鳥、あひる	（鶏の場合）10 日齢以上で頚部皮下に１回接種。HVT ﾜｸﾁﾝ後のﾌﾞｰｽﾀｰの場合 12 週後の接種を推奨。	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）

フランスの使用ワクチン

品名	製造販売業者	ワクチンタイプ	用法用量	DIVA 性能
Volvac B.E.S.T. AI+ND®	Boehringer Ingelheim	HPAI H5 抗原の組換えﾀﾝﾊﾟｸ質ﾜｸﾁﾝ（ﾆｭｰｶｯｽﾙ病との混合ﾜｸﾁﾝ）	頚部皮下に２回接種 ﾑﾗｰﾄﾞﾀﾞｯｸ、ﾊﾞﾘｹﾝについては 10 日齢及び 28 日齢。ﾍﾟｷﾝﾀﾞｯｸについては 1 日齢及び 19 日齢。	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）
CEVA RESPONS AI H5	CEVA	HPAI H5 mRNA ワクチン	筋肉内に２回接種 （1 日齢及び３～４週齢）	区別可能（接種家きんは NP ELISA 陰性）

オランダの使用ワクチン

品名	製造販売業者	ワクチンタイプ	用法用量	DIVA 性能
Vectormune HVT-AIV（野外で接種・ﾗﾎﾞで攻撃試験）	上記参照	上記参照	上記参照	上記参照
VAXXITEK HVT-IBD-H5（同上）	上記参照	上記参照	上記参照	上記参照
Volvac B.E.S.T. AI+ND®（同上）（VAXXITEK 接種後のブースター接種用として使用）	上記参照	上記参照	上記参照	上記参照
Innovax-ND-H5（野外での接種試験）	上記参照	上記参照	上記参照	上記参照

（参考）日本の承認ワクチン

品名	製造販売業者	ワクチンタイプ	用法用量	DIVA 性能
オイルバックス AI	KM バイオロジクス株式会社	不活化ワクチン（H5N1 or H7N7）	４週齢以上で脚部筋肉内接種	区別不可(野外株のN抗原に依存)
“京都微研„ﾎﾟｰﾙｾｰﾊﾞｰ AI	株式会社微生物化学研究所	不活化ワクチン（H5N1 or H7N7）	４週齢以上で脚部筋肉内接種	同上
ナバック AI	日生研株式会社	不活化ワクチン（H5N1 or H7N7）	４週齢以上で脚部筋肉内接種	同上
ノビリス AI inac	MSD アニマルヘルス株式会社	不活化ワクチン（H5N2）	８日齢以上で頚部皮下接種（採卵鶏、種鶏ではその後６～10 週目に追加接種）	同上