

果樹カメムシ類の越冬密度調査結果（令和7～8年）

2026.5.11時点

・都道府県が実施した果樹カメムシ類の越冬密度調査結果をとりまとめたものです。  
 ・下記の点にご注意ください。  
 ①調査手法・時期は県毎に異なるため、県間が比較できるデータではないことにご留意ください。  
 ②果樹カメムシ類の発生量は地域間差がありますので、調査結果に関わらず、ご自身の園地の発生には引き続きご注意ください。

県名	対象種	平年比	調査結果	平年値	昨年値（参考）
岩手県	クサギ	多	303.7頭 (3地点平均)	120.6頭 (3地点平均)	150.3頭 (3地点平均)
秋田県	クサギ	並	7.5頭/地点	7.4頭/地点	6.8頭/地点
山形県	クサギ	並	越冬前虫数：23 越冬後生存虫数：21	越冬前虫数：36.8 越冬後生存虫数：29.8	越冬前虫数：95 越冬後生存虫数：73
福島県	クサギ	やや多	28.1頭/ムシ口1枚	15.8頭/ムシ口1枚	24.9頭/ムシ口1枚
茨城県	チャバネ	並	2.1頭/落葉30L 越冬地点率55%	2.3頭/落葉30L 越冬地点率41%	0.05頭/落葉30L 越冬地点率5%
栃木県	チャバネ・ツヤアオ	－	・チャバネアオカメムシ 0.59頭/㎡ ・ツヤアオカメムシ 0.92頭/㎡	－	・チャバネアオカメムシ 0.03頭/㎡ ・ツヤアオカメムシ 0.03頭/㎡
群馬県	チャバネ	やや多	1.2頭/㎡	0.8頭/㎡	0.2頭/㎡
埼玉県	チャバネ・ツヤアオ・ クサギ・ミナミ	多	2.37頭/3㎡	1.09頭/3㎡	0.75頭/3㎡
千葉県	チャバネ	－	0.42頭/㎡	－	－
神奈川県	チャバネ	やや多	10.4頭/落ち葉200L	5.0頭/落ち葉200L	4.4頭/落ち葉200L
神奈川県	ツヤアオ	やや少	0.5頭/100枝	3.9頭/100枝	0.8頭/100枝
山梨県	チャバネ	－	0頭/100L (3地点平均)	－	1頭/100L (3地点平均)
長野県	チャバネ・クサギ	－	全地点 対象カメムシ種 0頭/㎡	－	0頭/㎡
静岡県	チャバネ	少	0.2頭/㎡	1.2頭/㎡	2.9頭/㎡
岐阜県	チャバネ	並	1.2頭/50L（平均）	1.3頭/50L（平均）	1.7頭/50L（平均）
愛知県	チャバネ	やや少	0.26頭/㎡	0.64頭/㎡	0.69頭/㎡
三重県	チャバネ・クサギ	多	・チャバネアオカメムシ 4.6頭/地点 ・クサギカメムシ 100頭/地点	・チャバネアオカメムシ 2.6頭/地点（3㎡） ・クサギカメムシ 34.4頭/地点（参考値）	・チャバネアオカメムシ 0.6頭/地点（3㎡） ・クサギカメムシ 0頭/地点（参考値）
滋賀県	チャバネ	多	8.13頭/50L	1.11頭/50L	0.88頭/50L
京都府	チャバネ	やや多	0.6頭/50L	0.5頭/50L	0.2頭/50L
大阪府	チャバネ・ツヤアオ	－	・チャバネアオカメムシ 0頭/㎡ ・ツヤアオカメムシ 1.5頭/㎡	－	・チャバネアオカメムシ 0頭/㎡ ・ツヤアオカメムシ 0.17頭/㎡
兵庫県	クサギ	－	平均17.6頭/トラップ当たり (0～72頭)	－	－
奈良県	チャバネ	やや多	10.6頭/地点	7.8頭/地点	0.6頭/地点

県名	対象種	平年比	調査結果	平年値	昨年度値（参考）
和歌山県	チャバネ	やや多	1.5頭/50L	0.6頭/50L	0.2頭/50L
鳥取県	クサギ	やや多	平均14.5頭/トラップ当たり	平均9.4頭/トラップ当たり (H28年～R6年の平均)	平均4.4頭/トラップ当たり
広島県	チャバネ・クサギ	多	・チャバネアオカメムシ 0.79頭/地点 ・クサギカメムシ 20.1頭/地点	・チャバネアオカメムシ 0.3頭/地点 ・クサギカメムシ 7.2頭/地点	・チャバネアオカメムシ 0.17頭/地点 ・クサギカメムシ 2.7頭/地点
山口県	クサギ	多	88.9頭/トラップ	30.2頭/トラップ	3.1頭/トラップ
徳島県	チャバネ	やや多	4.7頭/m <sup>2</sup>	3.1頭/m <sup>2</sup>	0.2頭/m <sup>2</sup>
香川県	チャバネ・クサギ	－	0頭/m <sup>2</sup> 0頭/トラップ	－	0頭/m <sup>2</sup> －
愛媛県	チャバネ	並	1.26頭/地点	0.96頭/地点	0.00頭/地点
福岡県	チャバネ	やや多	2.7頭/m <sup>2</sup>	1.7頭/m <sup>2</sup>	0.1頭/m <sup>2</sup>
佐賀県	チャバネ	多	2.51頭/m <sup>2</sup>	0.32頭/m <sup>2</sup>	0.14頭/m <sup>2</sup>
長崎県	チャバネ	やや多	0.75頭/m <sup>2</sup>	0.32頭/m <sup>2</sup>	0.08頭/m <sup>2</sup>
熊本県	チャバネ	多	45頭/3m <sup>2</sup> /16地区 (0.94頭/m <sup>2</sup> )	23.1頭/3m <sup>2</sup> /16地区 (0.48頭/m <sup>2</sup> )	2頭/3m <sup>2</sup> /16地区 (0.04頭/m <sup>2</sup> )
大分県	チャバネ	やや多	0.50頭/m <sup>2</sup>	0.26頭/m <sup>2</sup>	0.11頭/m <sup>2</sup>

(注釈)

- ・対象種：チャバネ：チャバネアオカメムシ、クサギ：クサギカメムシ、ツヤアオ：ツヤアオカメムシ、ミナミ：ミナミアオカメムシ
- ・平年比：多、やや多、並、やや少、少
- ・「－」：昨年度又は今年度から実施のため、平年比・昨年度値・平年値なし