

侵入警戒調査で発見されるミバエ類 (III)

前回の検索表で識別したミバエ各種を、分布地域、寄主植物などの生態的側面、あるいは検索表に現れなかった他の形態的特徴からもその種に間違いがないかを再度確認するため、それらを一覧表にまとめた。

なお、この表には前回の検索表に現れなかった野生植物のみに寄生する本邦産の *Dacus* 属ミバエ 4 種 (クスノキミバエ、ヤエヤマミバエ、テリハボクミバエ、オガサワラミバエ) も含まれている (以下次号に続く)。

種 名	分 布	主要寄主	誘引剤	形 態 的 特 徴		
				小楯板の斑	小楯板刺毛	黄縦帯は翅内刺毛を
チチュウカイミバエ	アフリカ州、南米、ハワイなど	多くの生果実	T	基部、先端に黒斑	2 対	(黄縦帯は無い)
ミカンコミバエ	東南アジア、ハワイなど	カンキツ類他	M	無	1 対	越える
ウリミバエ	東南アジア、ハワイ、南西諸島の一部	ウリ類他	C	無	1 対か 2 対	越える
クインスランドミバエ	オーストラリア、ソシエテ諸島など	カンキツ類他	C	無	1 対	越えない
オウトウハマダラミバエ	北海道、本州	オウトウ、ヤマザクラ	—	全体褐色	2 対	(黄縦帯は無い)
クロヒメハマダラミバエ	本州～奄美群島	不明	M	全体黒色	2 対	(黄縦帯は無い)
サタミバエ	本州、四国、九州	不明	C	基部に三日月黒斑	1 対	(ごく短い)
リュウキュウガキミバエ	八重山群島	リュウキュウガキ	M	基部に三日月黒斑	1 対	(黄縦帯は無い)
クスノキミバエ	本州～南西諸島	タブ、ヤブニッケイ	—	先端に褐色斑	1 対	越えない
カボチャミバエ	北海道～台湾	カボチャ、ユウガオ	—	無	2 対	越える
ミスジミバエ	本州～台湾 (宮古・八重山群島を除く)	ウリ類の雄花	C	先端に黒斑	2 対	越える
イシガキミバエ	八重山群島	ウリ類の雄花	C	先端に黒斑	2 対	越える
スズメウリミバエ	宮古・八重山群島	オキナワスズメウリ?	M	先端に褐色斑	2 対	越える
ミカンバエ	九州、奄美群島	カンキツ類	—	無	1 対	越える
ヤエヤマミバエ	南西諸島	フクギ	—	無	2 対	越えない
テリハボクミバエ	宮古・八重山群島	テリハボク	—	無	1 対	越える
オガサワラミバエ	小笠原諸島	シマモクセイ	—	基部、先端に黒斑	2 対	越えない

T : トリメドルア、M : メチルオイゲノール、C : キュウルア、— : T, M, C に誘引されない