

輸入種苗検疫要綱（昭和53年 9 月30日付け53農蚕第6963号農蚕園芸局長通達）の一部改正
新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後						現 行					
別表 2（第 8 関係） 2 次検査の方法						別表 2（第 8 関係） 2 次検査の方法					
種 苗 の 種 類	植 物 の 種 類	検 査 の 種 類	検 査 の 数 量	対 象 検 疫 有 害 動 植 物 等	検 査 の 方 法	種 苗 の 種 類	植 物 の 種 類	検 査 の 種 類	検 査 の 数 量	対 象 検 疫 有 害 動 植 物 等	検 査 の 方 法
草花、 野菜、 樹木、 牧草、 特用作 物等の 種子	(略)	(略)	3,000粒	(略)	(略)	草花、 野菜、 樹木、 牧草、 特用作 物等の 種子	(略)	(略)	3,000粒	(略)	(略)
	(4)ふだんそ う属	(略)		(略)	(略)		(略)	(略)			
	(5)とうもろ こし	(略)		(略)	(略)		(略)	(略)			
	(6)だいず、 とうもろこ し、えぞむ ぎ属、おお むぎ属、か もじぐさ属、 こむぎ属、 らいむぎ属	(略)		(略)	(略)		(略)	(略)			
	(7)あふりか ひげしば、 いね、えび すぐさ、オ ーチャード グラス、ギ ネアキビ、 バヒアグラ ス、きゅう り、くさよ	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)		

	し、ささげ、 すいか、チ モシー、て んさい、ゆ うがお、ふ じまめ、ら いむぎ、ら つかせい、 よし、 <i>Cymbopogon</i> <i>flexuosus</i>、 <i>Digitaria</i> <i>ciliaris</i>、 <i>Paspalum</i> <i>scrobiculatum</i>、 <i>Phleum</i> <i>phleoides</i>、 <i>Sesleria varia</i>、 いんげんま め属、うし のけぐさ属、 えのころぐ さ属、おお むぎ属、お ひしば属、 かぼちゃ属、 かもしぐさ 属、からす むぎ属、こ むぎ属、す げ属、たぬ きまめ属、 きとうもろ し属、もろ こし属、ぬ かぼ属、ぬ まがや属	
(8) えんばく、		
<u>Alternaria</u>	変色種	
し、ささげ、 すいか、チ モシー、て んさい、ゆ うがお、ふ じまめ、ら いむぎ、ら つかせい、 よし、 <i>Cymbopogon</i> <i>flexuosus</i>、 <i>Digitaria</i> <i>ciliaris</i>、 <i>Paspalum</i> <i>scrobiculatum</i>、 <i>Phleum</i> <i>phleoides</i>、 <i>Sesleria varia</i>、 いんげんま め属、うし のけぐさ属、 えのころぐ さ属、おお むぎ属、お ひしば属、 かぼちゃ属、 かもしぐさ 属、からす むぎ属、こ むぎ属、す げ属、たぬ きまめ属、 きとうもろ し属、もろ こし属、ぬ かぼ属、ぬ まがや属		
(8) えんばく、		
<u>Alternaria</u>	変色種	

おむぎ、 らいこむぎ、 らいむぎ、 いとすぎ属、 こむぎ属、 なでしこ属	
(9)いね、いんげんまめ、えんどう、とうがらし、とうもろこし、ピーマン	
(10)きゅうり、メロン、かぼちゃ属	(略)
(11)おかにつり、おのおすずめのおてっぼう、オーチャードグラス、なぎなたがや、くしがや、しらげがや、チモシー、ぬかすき、ひ	(略)

<u>dianthicola</u>、 <u>Alternaria</u> <u>tritricina</u>、 <u>Seiridium</u> <u>cardinale</u>	子選 出し、 これに 加えて 無作為 に出 した400 粒につ いてブ タロッ ー検査 を実施 するこ と。
(略)	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)

おむぎ、 らいこむぎ、 らいむぎ、 こむぎ属	
(9)いね、いんげんまめ、えんどう、とうがらし、とうもろこし、ピーマン	
(10)きゅうり、メロン、かぼちゃ属	(略)
(11)おかにつり、おのおすずめのおてっぼう、オーチャードグラス、なぎなたがや、くしがや、しらげがや、チモシー、ぬかすき、ひ	(略)

tritricina	子選 出し、 これに 加えて 無作為 に出 した400 粒につ いてブ タロッ ー検査 を実施 するこ と。
(略)	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)

	げがや、らいむぎ、 <i>Agropyron cristatum</i> 、 <i>Alopecurus geniculatus</i> 、 <i>Calamagrostis boladeri</i> 、 <i>Danthonia californica</i> 、 <i>Deschampsia cespitosa</i> 、 <i>Glyceria borealis</i> 、 <i>Psathyrostachys juncea</i> 、 <i>Pseudoroegneria spicata</i> 、 <i>Thinopyrum intermedium</i> 、 いちごつなぎ属、うしのけぐさ属、 えぞむぎ属、おおむぎ属、 すずめのちやひき属、 どくむぎ属、ぬかぼ属	
(12) らいまめ	(略)	
(13) らいこむぎ、こむぎ属	(略)	
(14) すいしゃせとがや、とうじんびえ、 <i>Andropogon</i>		

(略)	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)

	げがや、らいむぎ、 <i>Agropyron cristatum</i> 、 <i>Alopecurus geniculatus</i> 、 <i>Calamagrostis boladeri</i> 、 <i>Danthonia californica</i> 、 <i>Deschampsia cespitosa</i> 、 <i>Glyceria borealis</i> 、 <i>Psathyrostachys juncea</i> 、 <i>Pseudoroegneria spicata</i> 、 <i>Thinopyrum intermedium</i> 、 いちごつなぎ属、うしのけぐさ属、 えぞむぎ属、おおむぎ属、 すずめのちやひき属、 どくむぎ属、ぬかぼ属	
(12) らいまめ	(略)	
(13) らいこむぎ、こむぎ属	(略)	
(14) すいしゃせとがや、とうじんびえ、 <i>Andropogon</i>		

(略)	(略)
(略)	(略)
(略)	(略)

<i>sorghi</i> 、とうもろこし属、もろこし属				
(15) きゅうり、すいか、せいやうかぼちゃ、とうがん、にほんかぼちゃ、ペポかぼちゃ、メロン、ゆうがお	エライザ法検査、遺伝子診断法検査	1,000粒	スイカ果実汚斑細菌病	エライザ法検査又は遺伝子検査を実施すること。
(16) ひよこまめ	外観検査、培養検査	3,000粒	<i>Didymella rabiei</i>	り病種子を選出すること。必要に応じ、培養検査を実施すること。
(17) アメリカカラマツ、ヒマラヤスギ、とうひ属			<i>Sirococcus conigenus</i>	種鱗が付いていない場合、無作為に選出した400粒について培養検査を実施すること。種鱗が付いている場合、必要に応じ、培養検査を実施すること。

<i>sorghi</i> 、とうもろこし属、もろこし属				
(15) すいか、とうがん、メロン	エライザ法検査、遺伝子診断法検査	1,000粒	スイカ果実汚斑細菌病	エライザ法検査又は遺伝子検査を実施すること。
(新設)	(新設)	(新設)	(新設)	(新設)
(新設)			(新設)	(新設)

(18) <u>らっかせい</u>	<u>外観検査、ベルマン法検査</u>		<u><i>Aphelenchoides arachidis</i>、<i>Ditylenchus africanus</i></u>	<u>変色種子を選出し、これに加えて無作為に選出した400粒についてベルマン法検査を実施すること。</u>
(19) えんどう、がらすまめ、きばなのはうちわまめ、スイートピー、だいず、はうちわまめ、ひよこまめ、ひらまめ、むらさきうまごやし、そらまめ属	(略)	(略)	(略)	(略)
(20) <u>あかざ</u> 属、あぶらな属、だいこん属、ふだんそう属、ほうれんそう属			(略)	
(21) <u>あわ</u> 、いね、えんばく、おおむぎ、こむぎ、スーダングラス、			(略)	

(新設)	(新設)		(新設)	(新設)
(16) えんどう、がらすまめ、きばなのはうちわまめ、スイートピー、だいず、はうちわまめ、ひよこまめ、ひらまめ、むらさきうまごやし、そらまめ属	(略)	(略)	(略)	(略)
(17) <u>あかざ</u> 属、あぶらな属、だいこん属、ふだんそう属、ほうれんそう属			(略)	
(18) <u>あわ</u> 、いね、えんばく、おおむぎ、こむぎ、スーダングラス、			(略)	

テオシント、 とうもろこし、もろこし				
(22) にんじ ん属、やぶじ らみ属			(略)	
(23) にんじ ん (輸出国にお いて、遺伝子 診断法検査若 しくは50℃20 分の温湯浸漬 若しくは50℃ 72時間の乾熱 処理が行われ、当該病菌 が付着してい ない旨の記載 がない旨の記載 がある場合又 は輸入者若し くは管理者か ら要望があ り、第8の2 の1次検査の 後、輸入者、 管理者若しく は植物防疫官 により50℃20 分の温湯浸漬 若しくは50℃ 72時間の乾熱 処理が行われ る場合を除 く。)	(略)	(略)	(略)	(略)
(24) おおう	(略)	(略)	(略)	(略)

テオシント、 とうもろこし、もろこし				
(19) にんじ ん属、やぶじ らみ属			(略)	
(20) にんじ ん (輸出国にお いて、遺伝子 診断法検査若 しくは50℃20 分の温湯浸漬 若しくは50℃ 72時間の乾熱 処理が行われ、当該病菌 が付着してい ない旨の記載 がない旨の記載 がある場合又 は輸入者若し くは管理者か ら要望があ り、第8の2 の1次検査の 後、輸入者、 管理者若しく は植物防疫官 により50℃20 分の温湯浸漬 若しくは50℃ 72時間の乾熱 処理が行われ る場合を除 く。)	(略)	(略)	(略)	(略)
(21) おおう	(略)	(略)	(略)	(略)

	しのけぐさ、 おにうしのけ ぐさ、なぎな たがや、どく むぎ属				
	(25) 上記 (2) から (2 4) 以外の種 子	(略)	(略)	(略)	(略)
	(26) からま つ、しらびそ、 すぎ、つげ、 ひのき、ばら 属及びまめ科 の牧草種子	透視検 査、破 砕検査	30g	アルファルフ ァタネコバチ、 カラマツタネ コバチ、バラ ノミオナガコ バチ等の検疫 有害動物	軟エック ス線透視 装置を用 いて、供 試種子10 gを3回 に分けて 検査する こと。又 は、破砕 検査を行 うこと。
(削 る。)	(削る。)	(削 る。)		(削る。)	(削る。)

(注) (略)

	しのけぐさ、 おにうしのけ ぐさ、なぎな たがや、どく むぎ属				
	(22) 上記 (2) から (2 1) 以外の種 子	(略)	(略)	(略)	(略)
	(23) からま つ、しらびそ、 すぎ、つげ、 ひのき、ばら 属及びまめ科 の牧草種子	透視検 査、破 砕検査	30g	アルファルフ ァタネコバチ、 カラマツタネ コバチ、バラ ノミオナガコ バチ等の検疫 有害動物	軟エック ス線透視 装置を用 いて、供 試種子10 gを3回 に分けて 検査する こと。又 は、破砕 検査を行 うこと。
果樹、 森林植 物、観 賞用植 物等の 苗木類 (部分、 接穂等 を含む。	セロリー、 にんじん (輸出国に おいて、遺 伝子診断法 検査が行わ れ、当該病 菌が付着し ていない旨 の記載が検 査証明書に ある場合を 除く。)	遺伝子 診断法 検査		<u>Candidatus</u> <u>Liberibacter</u> <u>solanacearum</u>	遺伝子 診断法 検査を 実施す ること。

(注) (略)

